

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

<36622231630019

<36622231630019

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google

Digitized by Google

Der Naturfreund

oder

praktisch-gemeinnützige

Naturgeschichte des In- und Auslandes

durch eine

möglichst vollständige Sammlung mit größter Sorgfalt ausgeführter, von vorzüglichen Künstlern gezeichneter und in Kupfer und Stahl gestochener

treuer Naturgemälde

erläutert,

für gebildete Leser aller Stände, so wie für Schulen bearbeitet und herausgegeben von

H. G. Ludwig Reichenbach,

Königl. Sächs. Hofrathe,

Doctor der Philosophie, Medicin und Chirurgie, Vorsteher des königl. Sächsisch. Naturalienkabinets, Professor der Naturgeschichte und Director des botanischen Gartens, an der königl. medic. chirurg. Akademie in Dresden, der kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher, der kaiserl. Russ. Societät der Naturforscher zu Moskau, der Accad. Trientina zu Ascoli, der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig, Halle, Görlitz, Frankfurt und Paris, der des Osterlandes, der wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg, der physiographischen Gesellschaft zu Lund, der königl. baier. botanischen Gesellschaft zu Regensburg, der großherzogl. weimar. mineralog. Gesellschaft zu Jena, des königl. baier. pharmaceutischen Vereins, des Apothekervereins im nördl. Deutschland, der Wernerschen naturhist. Societät in Edinburg, der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde so wie der Gesellschaften für Botanik und Gartenbau in Dresden, Braunschweig, London u. s. w. Mitgliede oder Ehrenmitgliede.

Erste Lieferung.

Subscriptionspreis à Lieferg. schwarz 8 Gr. oder 10 Sgr. oder — fl. 36 Kr. Rhein.
" " " colorirt 16 " " 20 " " 1 " 12 " "

Leipzig,

Verlag der Expedition des Naturfreundes.

1834.

Digitized by Google

Plan des Werkes.

Die praktisch-gemeinnützige Naturgeschichte besteht aus Text und dazu gehörigen Abbildungen.

Der Text erscheint mit den Abbildungen in derselben Folge, als deren Erläuterung, zuerst über die Arten der Thiere und Pflanzen selbst sich verbreitend. Er enthält:

1) den Ziffern der Abbildungen entsprechend, die wissenschaftlichen und systematischen Namen, dann die populären Benennungen, welche die aufgeführten Gegenstände in ihren Vaterländern führen.

2) eigentliche Beschreibung durch Angabe der Größe nach pariser Fuß und Zoll (wo nicht anderes Maas genannt ist), Gestalt, Farbe u. s. w. nebst Abänderungen und Farbenwechsel.

3) Vaterland und Lebensweise.

4) Jagd und Fang, oder Einsammlungsweise bei den Pflanzen.

5) Nutzen und Schaden. Hierbei alles was in den Handel, in Künste und Gewerbe, den Landbau, die Forstwissenschaft und Arzneikunde einschlägt.

Nachdem dann die Arten in Familien so zusammengestellt, wie eben dem Verf. die Materialien dazu möglichst vollständig zur Hand sind, abgehandelt worden, folgt das Systematische am Schlusse einer jeden Classe, also die Unterscheidungsmerkmale der Classe selbst, ihrer Ordnungen, Familien und Gattungen, alles die auch hierzu vorhandenen besonderen Abbildungen erläuternd.

Diese systematische Abtheilung kann, wenn sie zweckmäßig seyn soll, bei der Erscheinung nicht vorausgehen, dies wäre der Bildungsweise des Menschen entgegen. Wir lernen ursprünglich erst einzelne Gegenstände kennen, bevor wir uns zur Anschauung ihrer Verwandschaften zu erheben im Stande sind. Eine systematische Einleitung voraus zu senden, könnte nur den Leser ermüden, und würde ihn über deren eigentliche Bedeutung gänzlich im Dunkel lassen, wenn er von den vielen Gegenständen über welche sich dieselbe verbreitet, noch keinen Begriff hat. Erst nach vollendeter Darstellung der Arten kann sie Reiz für ihn gewinnen, er kann erst dann sich in den Stand gesetzt sehen, vom Einzelnen auf das Ganze zu schließen. Es bietet sich dann zugleich der Vortheil dar, die im Werke aufgeführten Arten in dem systematischen Theile alle an ihren Orten übersichtlich zusammenstellen und namentlich aufführen zu können, was voraus nicht möglich wäre, da bei dem lebhaften Verkehr des Verfassers, während der Herausgabe fortwährend neue Materialien dazu kommen.

Die Abbildungen werden nach neuen und noch unbenutzten Originalen der berühmtesten Thier- und Pflanzenmaler, größtentheils nach dem Leben gezeichnet, oft in Gruppen zusammengestellt, auch in ihren natürlichen landschaftlichen Umgebungen, in den ihre Lebensweise am meisten characterisirenden Stellungen und Bewegungen aufgefaßt, von aus-

Digitized by Google

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS

Katzengeschlecht. Felis.

Katzen, katzenähnliche Thiere. *)

1. Der Löwe. Felis leo Linnee. — Weibchen: Löwin.

Griechisch: ὁ λέων, ἡ λέαινα. — Lateinisch: leo und leaena. — Italiänisch: leone. — Französisch: le lion, la lionne: die Löwin, les lionceaux: die jungen Löwen. — Spanisch: leon. — Englisch: the lion, the lioness. — Schwedisch: leyon. — Arabisch: Asad. — Persisch: Sjir, Gehad.

Kennzeichen der Art: Schwanz mit Endquaste.

Beschreibung. Die Länge des Löwen beträgt von der Nasenspitze bis zum Ursprunge des Schwanzes gewöhnlich 5 Fuß, ausgezeichnet große Exemplare erreichen auch eine Länge von 6—7 Fuß, ja die dunkelfarbige Abänderung am Vorgebirge der guten Hoffnung gelangt sogar zu der noch bedeutenderen Länge von 8 Fuß. Bei der Mittelgröße von 5 Fuß 2 Zoll betrug am männlichen Löwen aus der Barbarei die Länge des Kopfs 1 Fuß 2 Zoll, des Schwanzes 2 Fuß 2 Zoll, die Höhe über den Schultern so wie über den Hüften 2 Fuß 9 Zoll. — Gewicht 2—3 Centner. — Die Löwin ist mit einem männlichen Löwen von gleichem Alter und gleicher Race verglichen, meist um den vierten Theil kleiner.

Bei der allgemeinen aber höchst kräftig und muskulös ausgeprägten Katzenform zeichnet sich der Löwe ganz allein unter allen Arten der Gattung durch die Schwanzquaste aus, welche also zu Unterscheidung der Art in beiden Geschlechtern dienen kann. Der männliche Löwe hat noch in der bedeutendern Größe seines fast viereckigen Kopfes und in seiner Mähne etwas eigenthümliches, was also nicht als Unterscheidungskennzeichen der Art, sondern nur des Männchens betrachtet werden kann, da der Kopf des Weibchens bedeutend kleiner und runder und so wie der Hals ohne oder nur im Alter mit einer sehr kurzen Mähne bewachsen und der Körper im Allgemeinen schlanker gebaut ist. Die Behaarung selbst ist über den ganzen Körper hin (wo nicht Mähne befindlich) in beiden Geschlechtern kurz, dicht und anliegend, die Farbe des Haares nach den Racen verschieden, im allgemeinen ein bräunliches Ockergelb mit schwarzen Haarspitzen melirt. Der Rumpf verschmächtigt sich von der sehr

*) Man vergleiche den „Plan des Werkes," dem zufolge alles Systematische, folglich auch was über die Gattungen oder Geschlechter im Allgemeinen zu sagen ist, am Schlusse einer Classe erläutert und übersichtlich zusammengestellt werden soll.

Digitized by Google

starken Brust aus nach hinten sehr sichtlich und deutlicher bei dem Männchen, beide Geschlechter haben sehr kräftig gebaute Beine, an denen wie bei allen Katzenthieren, der Unterfuß nur mit dem geballten Zehen auftritt, welche die sichelförmig gebogenen, hornfarbigen, zolllangen Nägel oder Klauen, im Zustande der Ruhe in ihre Scheiden zurückgezogen, verborgen halten. Der kräftige Schwanz nimmt von seinem Ursprunge an ab und verdünnt sich bis zum Ende, welches mit einer Stachelspitze in beiden Geschlechtern versehen ist. Gegen diese Spitze hin folgt der übrigens sehr kurzen Behaarung jener quastenartig sich zusammenneigende Büschel aus längeren Haaren, denen der Mähnenhaare des Männchens vergleichbar. Die Pupille im Auge ist rund, das äußere Ohr abgerundet und aufrecht. Das Weibchen ist mit zwei Paar Saugwarzen versehen.

Die neugebornen Löwen kommen mit offnen Augen zur Welt, sind 8 Zoll lang, der Schwanz noch 5 Zoll 6 Lin. Der Kopf 3 Zoll 6 Linien, die Höhe über Schultern und Hüften beträgt 5 Zoll 6 Linien. Sie haben das Ansehen kleiner Katzen und müssen von dieser Form hinauf erst zu der des Löwen sich entwickeln, denn sie haben noch keine Schwanzquaste und eben so ist keine Spur von Mähne vorhanden. Die Ohren halten sich nicht aufrecht, die Spitze derselben ist schlaff auf die Seite hängend. Erst nach zwei Monaten werden sie aufrecht getragen. Die Farbe ist graulichgelb und vom Rücken laufen zahlreiche schwarzgraue Parallelstreifen herab. Diese verlieren sich im ersten Jahre und nur der Kopf, die Schenkel und Hüften, so wie die Beine bleiben noch in den nächsten Jahren braungefleckt. Die Mähne und die Schwanzquaste entwickeln sich im dritten Jahre, das Wachsthum und die Ausbildung dieser Zierden dauert aber bis über das fünfte Jahr fort, so daß die Löwen erst vom sechsten Jahre an in ihrer größten Vollkommenheit und Schönheit erscheinen.

Man hat noch außer diesen allgemeinen Verhältnissen in Größe, Gestalt und Farbe des Löwen folgende Verschiedenheiten zu beachten, welche durch die Raçen oder klimatischen Abänderungen bedingt werden.

a) Der Löwe der Barbarei als der Typus der Art ist die stärkste Raçe, das Männchen hat den verhältnißmäßig größten Kopf und die reichste Mähne, welche über die Brust auf der Unterseite längs des ganzen Bauches und über die Hinterschenkel fortsetzt. Die Mähne sowohl als die Behaarung überhaupt, diese auch bei dem Weibchen, am meisten mit ganz schwarzen Haaren gemischt, während an den bräunlichgelben Haaren der untere Theil schwarz ist. Derselben Raçe scheint der sogenannte schwarze Löwe am Vorgebirge der guten Hoffnung anzugehören.

b) Der Löwe am Senegal ist weniger groß, lebhaft röthlichgelb, die Mähne minder reich und nicht unterhalb der Brust fortlaufend, mehr gleichfarbig, wenig mit schwarz gemischt. Auch diese Abänderung findet sich zugleich am Vorgebirge der guten Hoffnung und heißt dort der blasse oder fahle Löwe.

c) Der Löwe in Persien ist noch kleiner, der Kopf auch verhältnißmäßig zum Körper minder groß, über den ganzen Leib fahlgelb, die Mähne mittelmäßig aber sehr schwarz.

Bastarde oder Mittelschläge zwischen Löwen und Tiger hat man in der Gefangenschaft dieser Thiere entstehen sehen, vielleicht noch niemals in der freien Natur. Deren Beschreibung folgt am Schlusse der Naturgeschichte des Tigers.

Digitized by Google

Das Vaterland des Löwen ist vorzugsweise Afrika, in welchem Welttheile die kräftigste Race auch gegenwärtig noch einzeln in den ausgedehnten Landstrichen von Mauritanien, Numidien u. s. w. gefunden wird. Am Senegal findet sich die zweite Race und beide dehnen ihre Heimath bis nach Süden in die von den Cap-Colonieen entlegeneren Districte aus; die dritte lebt in Asien, in einigen Gegenden von Arabien und zwischen dem Indus und Persien, Bengalen; überall aber ziemlich vereinzelt.

Ganz anders war das Zahlenverhältniß der Löwen auf der Erde in der alten, klassischen Zeit. Sie waren damals nicht nur in den Gegenden, welche sie heut zu Tage noch bewohnen, weit häufiger, sondern auch noch viel weiter verbreitet. Der Geschichtschreiber Herodot erzählt uns (im VII. Buche), daß die Löwen auch in Griechenland, namentlich in Macedonien, Thracien und Akarnanien häufig gewesen sind, und Aristoteles bestätigt dieß (im VI. und VII. Buche) für seine spätere Zeit. Pausanias nennt als ihr Vaterland den Olymp, Macedonien und Thessalien. Asien war vormals von Syrien aus bis zum Ganges und Oxus mit Löwen reichlich bevölkert, sie fanden sich in Palästina, in Cilicien, Armenien und im Lande der Parther, unzählig waren diese Thiere über Afrika verbreitet. Von hieraus bezogen sie die Römer für ihre Kampfspiele, wofür Q. Scävola (nach **Plin. hist. n. VIII. 20.**) als Aedil, sie zuerst gebrauchte, und nur aus dem überaus häufigen Vorkommen derselben in Afrika wird es erklärbar, wie Sylla als Prätor nach der Erzählung von Plinius (lib. VIII. cap. 16.) hundert männliche Löwen auf einmal vom König Bochus aus Mauritanien erhalten und im Cirkus kämpfen lassen konnte. Pompejus führte sechshundert Stück auf, darunter dreihundert und funfzehn Männchen, Julius Cäsar als Dictator brachte deren Zahl auf vierhundert. Heut zu Tage glauben die Beherrscher Afrika's ein höchst werthvolles Geschenk zu machen, wenn sie im Stande sind, einen einzigen Löwen nach Europa zu senden. Unter Mark-Aurel (vom J. 161—180 nach Ch.) wurde schon die Verminderung der Löwen bemerkbar und obwohl unter Probus (in der Mitte des dritten Jahrhunderts) noch einmal hundert Löwen und hundert Löwinnen mit einer Unzahl anderer wilder Thiere zusammen kämpften, so wurde dennoch aus Furcht, daß es künftig an hinlänglichen Candidaten für diese das Volk belustigenden Kampfspiele fehlen möchte, die Jagd auf dieselben den Privatleuten durch ein Gesetz verboten. Die Zurücknahme dieses Gesetzes unter Honorius führte auch, so wie später vorzüglich der Gebrauch der Feuergewehre, wirklich eine fast gänzliche Ausrottung der Löwen herbei, wenigstens flüchteten sich die wenigen übriggebliebenen in die unbewohnten Wüsten, in denen sie sich noch in sehr geringer Anzahl erhalten.

Ueber die Lebensweise und Eigenheiten des Löwen ist schon vieles geschrieben worden, wir begnügen uns, das wichtigste davon kurz zusammen zu fassen. Es ist allgemein bekannt, daß bereits im Alterthume die Gestalt und das Benehmen des Löwen eine Art von Achtung einflößte und die Schriftsteller von da bis in die neueste Zeit sich in der Schilderung seiner Majestät und Großmuth, im Lobe seiner Kraft und Klugheit oder in Erzählungen von Beweisen seiner Dankbarkeit erschöpften. Einer der neueren Reisenden in Afrika, Mr. Burchell, bemüht sich uns dieß schöne Bild vom Löwen zu verdunkeln, er schildert ihn als eine furchtsame, tückische Katze. Beide Ansichten sind dennoch vereinbar, und auch hier liegt wohl

Digitized by Google

die Wahrheit mehr in der Mitte als in den Extremen. Denken wir uns den Löwen als den Repräsentanten einer auf die höchst mögliche Stufe ausgebildeten und veredelten Katzennatur, so gelangen wir wahrscheinlich zu einer Anschauung des richtigsten Bildes von ihm. Unwiederruflich steht der Löwe da, als das schon durch sein Aeußeres am meisten imponirende, und wenn wir dieß von einem Thiere überhaupt sagen wollen, Achtung gebietende Thier. Es ist die Ehrfurcht vor dem Schöpfer eines solchen Geschöpfes, welche bei dem Anblicke desselben in uns kräftig sich regt. Es giebt kein anderes Thier, welches in der Bildung seines Gesichts und seines ganzen Körpers so viel Kraft und Klugheit, so viel würdigen Anstand, mit einem Worte so viel Ueberlegenheit über alle Charactere der übrigen Thiere auszudrücken vermöchte. Warum wollen wir also die Alten tadeln, wenn sie den Löwen den König der Thiere nannten, so lange wir nicht im Stande sind, irgend ein anderes Thier würdiger oder nur mit gleichem Rechte so zu nennen? Der katzenähnliche Bau des Körpers ist ganz dazu geeignet, auf dieser Stufe der Ausbildung alle die Zwecke mit der größten Leichtigkeit erreichen zu lassen, deren Erreichung für die Erhaltung des Lebens nothwendig ist. Das Gesicht des Löwen verräth keineswegs jene heimtückische Mordlust, welche der eignen Schwäche sich bewußt, nur mit List und Verschlagenheit gepaart zu dem Ziele ihres Strebens gelangt, es ist vielmehr das Bewußtseyn einer Kraft, welche jedem andern Thiere sich entgegenzustellen vermag, und dieß mit fester, wenn auch bisweilen getäuschter Hoffnung auf günstigen Ausgang, mit dem Stolze der Ueberlegenheit wirklich zu thun pflegt. Die Größe des Kopfs ist, sobald das richtige Verhältniß des Gehirns zu ihm statt findet, allerdings auch ein redender Zeuge von den geistigen Anlagen des Löwen und seine hohe Stirn verleiht ihm fast ein menschliches Antlitz. Das ernste Auge, die imponirende Mähne, alles trägt dazu bei, ein Thier auszuzeichnen, welches in der Natur bestimmt zu seyn scheint, Vorzüge vor allen Thieren zu haben. Wir müssen also nach genauerer Ueberlegung und nach Vergleichung der Erscheinungen, welche wir im Character des Löwen wahrnehmen können, weit entfernt seyn, ihn mit einigen Schriftstellern der letzteren Jahre darum der Feigheit zu beschuldigen, weil er den Menschen flieht und der feste Blick eines kräftigen Mannes hinreichen soll, ihn zum Stillstand und zur Flucht zu veranlassen. Wir glauben vielmehr, daß eben hierin der Beweis für die höhere geistige Entwickelung des Löwen sich deutlich verkündet. Es ist jene von Gott allgemein in der Natur ausgesprochene Superiorität des Menschen, welche der Löwe in solchem Momente anerkennt und überlegend zieht er die Flucht einem Angriffe vor, welcher nicht als ein Beweis von Muth, sondern mehr von Tollkühnheit erscheinen würde, und welchen er deßhalb auch nur dann ausübt, wenn er durch unbändigen Nahrungstrieb oder in der Unmöglichkeit zu entfliehen, des freien Gebrauches seiner Fähigkeiten und der Möglichkeit seiner Ueberlegung zu folgen, beraubt ist. Nur dann, wenn der Mensch einen Beweis von Feigheit durch die Flucht giebt, glaubt der Löwe ihn nicht achten zu müssen und bemächtigt sich seiner. Selbst daß der Löwe die Thiere, deren er sich bemächtigen will, nicht von vorn angreift, sondern von hinten auf sie springt, möchte noch nicht als Beweis für Feigheit genommen werden können, denn was hätte er wohl im Kampfe mit schwachen Antilopen, mit Schaafen und Ziegen zu fürchten? Sicherlich thut er dieß wohl nur, um seines Opfers sicher zu seyn und dasselbe sich nicht entkommen zu lassen.

Digitized by Google

Auch in unsern Menagerieen ist der Löwe gewöhnlich ein Gegenstand von sehr allgemeinem Interesse, und erscheint darin wieder öfter, seitdem es gelungen ist, diese Thiere in Europa fortpflanzen zu lassen und zu zähmen. Jene würdige Selbstbeherrschung, welche der Löwe im Zustande seiner Ruhe wahrnehmen läßt, seine Gleichgültigkeit bei leichten Neckereien, sein dumpfes Grollen bei den plumperen Mißhandlungen seiner Wärter oder bei der Aufreizung durch die schaulustige Menge, sein ungeduldiges Brüllen vor Empfang seines täglichen Mahles, und dann die entsetzliche Begierde, wenn er nun die erhaltene Mahlzeit verzehrt — dieß sind Züge seines Characters, welche wir leicht beobachten können und davon Kunde geben, daß das edle Thier nur dann seinen Character zu der niedern Katzennatur herabstimmt, wenn es gilt den unbesiegbaren Trieben seiner Erhaltung zu folgen. Auch der Löwe in der Freiheit dürfte heut zu Tage ganz anders zu beurtheilen seyn, als der Löwe der alten classischen Zeit, welcher vielleicht im Bewußtseyn vereinter Kraft sich mächtiger fühlend, furchtloser war, wenn Pfeile und Spieße gegen ihn andrangen, dankbarer gegen Menschen, welche ihn zähmten, um sich von ihm begleiten zu lassen oder in prachtvollen Aufzügen den Wagen des Triumphators zu ziehen, als die Löwen unserer Zeit, welche mit Feuergewehren, denen keine Kraft zu widerstehen vermag, bis in die fernste Wüste verfolgt, oder wenn sie lebendig gefangen worden, im Käfig bei magerer Kost und harter Behandlung für immer der freien Bewegung ihrer Glieder beraubt werden. Bildet sich doch das Pferd in unendlich verschiedenen Characteren bei verschiedener Erziehung und verschiedener Behandlung. — Doch, betrachten wir die Lebensweise unserer heutigen Löwen in ihrer völligen Freiheit, im sichern Asyle der Wildniß, wie besonders Reisende am Vorgebirge der guten Hoffnung darüber am besten und vorurtheilsfreiesten berichten. Auch hierbei stimmen alle darin überein, daß die Löwen in den Wüsten weit furchtbarer und unternehmender sind als diejenigen, welche sich etwa in der Nähe menschlicher Wohnungen noch aufhalten und die Wirkung des Feuergewehres oder die Ueberlegenheit des Menschen überhaupt vielleicht schon aus Erfahrung erkannt haben. Dergleichen Reisen vom Cap aus in das Innere des Landes geschehen theils zu Fuß, theils im Wagen, mit 8—10 Ochsen bespannt. Die Bedeckung bildet eine Anzahl tüchtiger Hottentotten, welche mit den zu bereisenden Gegenden hinlänglich bekannt sind und die Fährten (Spur) der wilden Thiere ganz genau unterscheiden. Immer weiter und weiter rollt man über die Grenzen der Civilisation der Deutschen und Engländer hinaus und sieht sich endlich umgeben von den Horden der Buschmänner und Caffern, welche roh aber zufrieden von ihren Heerden und der Jagd leben und kaum irgend Etwas durch Cultur ihren dürren Wüsten abzugewinnen wissen. Solche gänzlich unbebaute Gegenden sind es aber, in welche sich die Löwen zurückgezogen haben, in denen man sie also, so wie andere reißende Thiere, heut zu Tage nur noch allein vorfindet, hier wird auch der Löwe für die wenigen und zerstreuten Bewohner noch ein Gegenstand des Schreckens, denn wenn die Fußtritte eines Löwen bemerkt werden, so reichen diese hin, alles mit Furcht zu erfüllen. Allerdings wird dieser Umstand durch die nicht zu widerlegende Erfahrung begründet, daß die Löwen den Hottentotten weit öfter anfallen als den Europäer. Haben nun die Hottentotten die Spur aufgefunden, so bemächtigt sich ihrer immer jene Furcht, sie haben dann sogleich einige schauerliche Geschichten in Bereitschaft und erzählen dem Reisenden alle Abentheuer, die ihnen jemals

Digitized by Google

von Kämpfen mit Löwen bekannt geworden sind. Während diesem, die zum erstenmale gesehenen Fußtapfen des Löwen, welcher da gekreuzt hat, nicht aus dem Sinne kommen, so rühmen diese wieder, ihn zu ermuthigen, ihre Erfahrung bei Verfolgung der Spur, den kühnen Räuber in seinem Lager zu entdecken. Der Hottentott besitzt auch in der That eine so instinctartig untrügliche Fähigkeit, ein Wild nach seiner Spur zu verfolgen, daß Barrow behauptet, es würde einer nicht nur den Wolf und den Hund an der Fährte erkennen, sondern auch die Fußtapfen eines seiner Cameraden aus tausenden herausfinden. Sie üben von erster Jugend an dieses ihnen so nützliche Talent. Einst war Mr. Burchell beschäftigt, mit einem Hottentotten zu der Stelle zu gelangen, wo sie ein Nilpferd erschossen hatten. Sie arbeiteten sich eben durch ein Weidengebüsch hindurch, als plötzlich der Hottentott sichtlich bewegt ausruft: „seht hierher Herr!" Mr. Burchell richtete darnach seine Augen auf den bezeichneten Platz und erblickt die frischen Fußtapfen eines Löwen, welcher vielleicht erst in dieser Stunde daselbst gewesen zu seyn schien, um aus dem Flusse zu trinken. Diese Erscheinung lenkte nun plötzlich das Gespräch vom Hippopotamus ab und mit leiserer Stimme richtete sich dasselbe nun ernster und einzig allein auf den wahrscheinlich in der Nähe verborgenen Löwen und auf die Gefahr, an einem so bewachsenen Orte allein mit ihm zu seyn. Wenn auch in diesem Falle die unmittelbare Gefahr nicht eintrat, so verkündete sie doch auf ähnliche Weise sich öfter. Ein trüber Abend brach herein, Gewitterwolken bedeckten nach allen Seiten hin den Himmel und alles überzog mit schwarzem Dunkel die Nacht. Bald zuckten wieder belebende Blitze durch die Schwärze des Himmels und Güsse von Regen stürzten strömend unter tosendem Donner herab. Das Vieh wurde unruhig und die Hottentotten waren bemüht, ihr Kochfeuer zu Abwehrung wilder Thiere zu erhalten. Solche Nächte sind es nämlich, welche vorzüglich der Löwe benutzt, sich Beute zu holen. Die Wuth der Elemente rüttelt ihn auf aus seiner gewöhnlichen Ruhe. So schleicht er dann herbei, mit weniger Vorsicht als er sonst thut, und weder das Bellen der Hunde noch das Knallen der Gewehre ist dann hinreichend, ihn zu vertreiben. Die Ochsen der Carawane scheinen die Annäherung ihres furchtbaren Feindes zu empfinden, in der größten Unruhe zerarbeiten sie sich, um von dem Wagen sich loszureißen und der Gefahr entfliehen zu können. Das fortgesetzte Losschießen der Gewehre wird in solchen Fällen durchaus nothwendig, nicht nur um den Löwen von der Wachsamkeit der Bedrohten zu überzeugen, sondern auch um das Vieh zu beruhigen. An solche Nächte werden die Reisenden in Afrika gewöhnt, da sie nicht selten vorkommen. Kommt es zum Angriffe, so pflegt er gewöhnlich die ersten sich ihm nähernden Hunde auf einen Schlag mit der Tatze niederzustrecken und vertheidigt sich dann wüthend gegen die, welche in der Mehrzahl über ihn herfallen, nach und nach muß er jedoch ihnen und den Wunden, welche zu gleicher Zeit die Gewehre ihm beibringen, unterliegen.

Auf den Ebenen Südafrika's weiden oft tausende von grasfressenden Thieren, wie bei uns die gezähmten, in Ruhe. So das Guagga, der Springbock und andere Antilopen. Diese harmlosen Thiere sind die gewöhnliche Beute des Löwen. Sie zu erlangen pflegt er ihren Zügen zu folgen, sich dann in der Ferne niederzulegen und von da aus in weiten Sprüngen sie zu erhaschen. Doch richtet er sein Blutbad unter ihnen gewöhnlich zur Nachtzeit an, wo er ihre Lager beschleicht.

Digitized by Google

In vollem Laufe ist er im Stande, ein so schweres Thier, ja sogar einen Büffel stundenweit mit sich zu tragen. Um des Büffels sich zu bemächtigen, legt er sich gewöhnlich in einen Hinterhalt und wartet ab, bis er auf ihn springen kann, schlägt ihm die Klauen in die Kehle und setzt ihm die andern Tatzen ins Gesicht, auf diese Weise flicht er sich gleichsam um seinen Kopf herum und hält ihn in dieser Stellung, bis er vor Blutverlust abstirbt. Die Giraffe läuft oft meilenweit, um Wasser aufzufinden, und während sie endlich sich niederbückt, am langersehnten Trunke sich zu laben, springt ihr ein Löwe auf den Nacken und sie bietet seinem Durste ihr eigenes Blut. Außerdem nährt er sich auch von mehreren gezähmten Thieren, Rindern, Pferden, Schaafen und Ziegen, gewöhnlicher von den genannten wilden Thieren und von wilden Schweinen, Civetten und Affen. Die Affen entwischen ihm leicht auf Bäume, auf welchen der Löwe wegen der Schwere seines Körpers nicht zu klettern vermag. Immer soll der Löwe sein Opfer erst tödten, dann erst auffressen.

Ueberhaupt hat man den Löwen nicht bloß zur Nachtzeit zu fürchten, die runde Pupille seines Auges verkündet, daß er ursprünglich kein nächtliches Thier ist. Er liegt zwar dessenungeachtet am Tage während des Hitze verbreitenden Sonnenscheins gewöhnlich ruhig im kühlen Gebüsch, wo er sein Lager hat, und steht, sobald ihn nicht Hunger treibt, ungern von demselben auf, um sich auf die Straßen zu begeben, wo Wagen und Vieh vorbeipassiren. Bisweilen weckt ihn jedoch aus dem Schlummer das unaufhörlich weitschallende Gebell der Hunde, welche stets die Caravanen begleiten. So erzählt Mr. Burchell auch einen hierher gehörigen Fall. „Es war ein heiterer Tag und keine Wolke am Himmel zu sehen. Es ging eine oder ein paar Meilen weit hin am Ufer eines Flusses, mit hohen Matten-Binsen bewachsen. Die Hunde gefielen sich darin, das Schilf zu durchspüren, und untersuchten jedes neue Plätzchen auf das genaueste, bis sie mit einander ein ganz eigenthümliches heftiges und bestimmtes Bellen erhoben. Wir forschten der Ursache dieses Bellens mit aller Vorsicht nach, und wurden bald überzeugt, daß es die Ansicht eines Löwen gewesen, welche ihren Ton so plötzlich umgestimmt hatte. Wir trieben sie an, ihn aufzujagen und sie zeigten sich sehr thätig, so daß wir bald den vollen Anblick eines großen, mit schwarzer Mähne behangenen Löwen und einer Löwin genossen. Die letzte erblickten wir indessen kaum eine Minute lang, als sie zwischen den Binsen verschwand. Der Löwe dagegen kam festen Schrittes vorwärts, stand dann still und faßte uns in's Auge. In diesem Augenblicke fühlten wir wohl, daß unsere Lage nicht ohne Gefahr war, denn das Thier schien einen Sprung auf uns vorzubereiten und wir standen am Ufer nur einige Fuß weit von ihm entfernt, die meisten von uns zu Fuß und ohne Waffen, ohne die geringste Aussicht zu entkommen. Ich selbst hatte mein Pferd an die Jäger abgegeben, und war also auch zu Fuß, indessen war es hier nicht Zeit zur Furcht, und die Nothwendigkeit verlangte einen Angriff, um ihm zu entgehen. Ich war wohl auf meiner Hut, hielt meine Pistolen in der Hand, den Finger auf dem Drücker, und eben so vorbereitet hielten sich andere, welche mit Flinten versehen waren. Allein gar bald begannen die Hunde sich zwischen uns und dem Löwen zu stellen, sie umzingelten ihn, und unterhielten ein heftiges Bellen, ihm den Angriff zu verkünden. Der Muth dieser braven Thiere war wahrhaft bewundernswerth, immer näher und näher rückten sie von der Seite auf das gewaltige Thier und droheten ihm dann in's Gesicht mit heftigem Bellen, ohne die geringste

Digitized by Google

Spur von Furcht zu verrathen. Der Löwe dagegen, seines Uebergewichts sich bewußt, stand still und unbeweglich bei diesen lärmenden Näckereien und wendete sein Auge nur gegen uns. Mit einemmale waren die Hunde bis nahe an seine Füße heran und schienen nun aus allen Kräften den Angriff wagen zu wollen, als die ersten Angreifer für ihre Unklugheit theuer büßen mußten. Der Löwe nämlich blieb ruhig in seiner majestätischen Stellung beharrend, machte nur eine kleine Bewegung mit der Tatze und im Augenblicke lagen von deren Schlage zwei seiner Angreifer todt zu seinen Füßen. Es geschah dieß so ohne alle Anstrengung, daß man den Erfolg davon kaum zu begreifen im Stande war. Während dieses Vorspiels mit den Hunden verloren wir keinen Augenblick. Es wurde nun auf ihn gefeiert, eine Kugel traf ihn in die Seite, unter den kurzen Rippen, und unmittelbar darauf quoll das Blut aus der Wunde. Der Löwe blieb dessenungeachtet in derselben Stellung, wie vorher. Nun aber hatten wir Ursache zu vermuthen, daß er einen Sprung auf uns thun würde und alle Gewehre wurden wieder geladen. Doch wir hatten uns geirrt, der Löwe ging ruhig von dannen.

Im Zorn sträubt der Löwe die Mähnen, brüllt fürchterlich gegen die Erde und schlägt mit dem Schwanze kräftig um sich herum. Schon die Alten pflegten zu sagen, er besäße dazu den eigenthümlichen, hornartigen Stachel an der Spitze des Schwanzes, um damit sich in die Seiten zu stechen, um sich selbst anzureizen, gleichsam sich den Sporn zu geben, damit er nicht im Zorne ermüde.

So heftigen Zornes und so gewaltiger Kraftäußerung auch der Löwe fähig ist, in so großer Sanftmuth giebt sich auch wieder sein Naturell unter anderen Umständen zu erkennen. Wir finden schon in den Erzählungen der Alten Beispiele von Unterwerfung einiger Löwen unter den Willen von Menschen. Die allbekannte Geschichte, welche Gellius vom römischen Sclaven Androclus erzählt, welcher in einer Höhle mit einem Löwen zusammentraf, diesem einen Dorn aus dem Fuße zog und den Fuß heilte, sagt uns, daß dieser Löwe aus Dankbarkeit dafür, seinem Arzte sich gänzlich unterworfen und von ihm in den Straßen Roms herumgeführt worden sey. Eben so soll Ritter Gottfried de la Tour auf dem ersten Kreuzzuge einen Löwen von einer Schlange befreiet haben und dieser ihm wie ein treuer Hund dankbar gefolgt, bei der Seefahrt auf der Rückkehr, als ihn der Herr nicht habe in das Schiff aufnehmen wollen, sogar im Meere nachgeschwommen und dabei ertrunken seyn. Beide Erzählungen, vorzüglich die letztere lassen manchen Zweifel zu. Campagnon fand am Senegal einen sehr kranken jungen Löwen, den er pflegte und mit Milch wieder herstellte. Der Löwe schmiegte sich an seinen Wohlthäter, fraß ihm aus der Hand und folgte ihm an einer Leine, wie ein Hund. Antonius fuhr mit der Eitheride in einem mit zwei Löwen bespannten Wagen in den Straßen von Rom und Nero erschreckte seine Gäste bei Tafel durch zahme Löwen, die auf seinen Befehl in die Säle hereintraten. — Archer erzog einen jungen Löwen, dieser wurde dann von ihm getrennt, wurde nach Frankreich und später nach England in die Menagerie am Tower gebracht. Hierher kam einst ein Diener von Archer, den jener Löwe sogleich wieder erkannte, und nachdem derselbe die Erlaubniß erhielt, zu ihm hinein zu gehen, an ihm emporsprang, ihn leckte und mit Liebkosungen überhäufte, nach seinem Abschiede traurig wurde und fast vier Tage lang nicht fraß. Ein anderer Löwe der Herzogin von Hamilton, welcher sonst nicht eben

Digitized by Google

sanft war, erkannte einen Soldaten wieder, der ihm drei Jahre vorher bei der Ueberfahrt von Gibraltar nach England Wärter gewesen, und liebkos'te ihn auf ähnliche Weise. Solche und ähnliche Fälle erklären sich aus dem sehr treuen Gedächtniß, welches der Löwe hat. — In der Menagerie am Jardin du Roi in Paris gab es öfters Beispiele von Zahmheit der Löwen. Der Thierwärter Felix Casal erfreute sich so großer Anhänglichkeit seiner Löwen, daß der männliche Löwe während dessen durch Krankheit nothwendig gewordenen Abwesenheit trauerte und von seinem einstweiligen Wärter keine Nahrung annahm, bis der endlich genesende Felix wieder herbeischlich und durch seine Rückkehr seinem Löwen die volle Heiterkeit und Eßlust von neuem verschaffte. Auch der Löwe vom Senegal in der Pariser Menagerie lebte mit seinem Wärter auf dem vertrautesten Fuße. Nicht leicht kann man sich ein Thier denken, welches ein unbedingteres Zutrauen und einen unbegrenzteren Gehorsam gegen einen Menschen bei humaner Behandlung bewiese, als dieser Löwe, welcher nur dann in Zorn gerieth, wenn er sich Gewalt entgegentreten sah. Er war jung eingefangen worden. Andere Individuen können dagegen nur durch Gewalt gezähmt werden. Hunger und Schläge finden dann auch hier ihre Anwendung, um Unterwürfigkeit unter den Willen des Menschen zu fördern. Bisweilen sieht man, daß die Wärter sich die Hand lecken lassen, die Zunge des Löwen ist aber wie die aller Katzenarten, mit spitzigen härtlichen Wärzchen besetzt und leckt daher leicht die Haut los, so daß es blutet, das Blut reizt dann den Appetit des Löwen und der Spaß wird höchst gefährlich.

In neuerer Zeit hat man es nun auch gewagt, diese Thiere in der Gefangenschaft zur Paarung kommen zu lassen, und nicht ohne den großen Vortheil, sie durch Befriedigung natürlicher Triebe gesund zu erhalten, sondern auch die Zahl dieser kostbaren Thiere zu vermehren. Es scheint indessen, daß vielleicht in Neapel zum erstenmale Löwen in Europa geboren wurden, wie D. Willugby in Ray's schon im J. 1683 erschienener synopsis animalium quadrupedum p. 165 erzählt. Dann wurden in den Menagerieen in Paris und in London mehr als einmal Löwen geboren. Die berühmte Löwenfamilie der Herren Martin und van Aken gebar in Hamburg, Dresden, *) Berlin u. a. O., und alle diese in Europa gebärenden und gebornen Löwen zeichneten sich durch einen hohen Grad von Zahmheit und Anhänglichkeit an ihren Wärter aus. Ein Individuum derselben war auch zu wiederholtenmalen in London im Covent-Garden-Theater in der Oper Alexander und Darius auf der Bühne erschienen. Gewöhnlich sieht man kleinere Thiere, besonders Hunde mit Löwen zusammengesperrt und deutet es als Beweis für die Großmuth des Löwen, daß er diesen schwächeren Thieren kein Leid zufügt, sondern mit ihnen in so großer Freundschaft lebt, daß er oft sie eher ihre Nahrung verzehren läßt, als er selbst sich deren bedient. In älterer Zeit machte diese uns gewöhnliche Erscheinung noch mehr Aufsehen und man hat die vorzüglichsten Beispiele davon aufgezeichnet, so erzählt Jean Macquet unter Regierung Heinrich IV. von Frankreich, wie er zu Marokko einen Hund im Schutze mehrer Löwen gesehen, und St. Pierre schildert gar anmuthig die Freundschaft, welche im J. 1793 zwischen dem Löwen in Versailles und einem Hunde bestand.

*) Die hier im kalten Winter 1824 gebornen Junaen befinden sich im Königl. Naturalien-Cabinet ausgestopft und deren Skelet und weichen Theile im zootomischen Museum der Königl. Thierarzneischule.

Digitized by Google

Die Löwen leben zur Paarungszeit paarweise beisammen, auch in den Menagerieen steigt ihre Wildheit bei Eintritt dieser Zeit, welche in der Gefangenschaft etwa 8 Tage dauert, auf den höchsten Grad. Sie folgen dann nur ihren wilden Trieben und verschmähen die Nahrung. Die Begattung selbst geschieht wie bei den Katzen und das Weibchen trägt 108, bei kälterer Witterung wohl auch 110 Tage, gebiert dann 2—3, selten 4 Junge, man will auch Beispiele von 5 Jungen gesehen haben und auch in dem obenerwähnten Falle in Neapel sollen 5 Junge zur Welt gebracht worden seyn. Aeltere Schriftsteller behaupteten, die Löwin werfe zum erstenmale 5, zum zweitenmale 4, zum drittenmale 3, zum viertenmale 3 und zum fünftenmale nur 1 Junges. Indessen bestätigen neuere Erfahrungen nur die von uns oben angegebene Anzahl, ohne bestimmte Zu- oder Abnahme, und schon Ray findet es unwahrscheinlich, daß die Löwin, während sie nur 4 Zitzen habe, 5 Junge gebären könne. Ausnahmweise kommt indessen auch bei andern Thieren dieser Fall vor. Die Löwin behandelt ihre Jungen mit der allergrößten Zärtlichkeit und vertheidigt sie so wüthend und rücksichtslos, daß sie in dieser Zeit sogar ihrem Wärter nicht traut. Doch gaben die Löwinnen in der Martin-Akenschen Menagerie auch hier noch Beweise von Anhänglichkeit an den Wärter, den sie mitten unter ihren Jungen litten und liebkos'ten. Die Löwin pflegt auch nach Katzenart die Jungen im Maule herumzutragen und an andere Orte zu bringen, sobald es ihr deren Sicherheit zu erheischen scheint. Sie säugt sie 5 bis 6 Monate lang, nach deren Verlauf die Neigung zur Paarung wieder eintritt. Aussehen und Veränderung der jungen Löwen während des Wachsthums wurden oben beschrieben. Die Eckzähne brechen hervor, sobald sie ein Jahr alt sind. In dieser Periode sterben viele junge Löwen in Menagerieen. Die in der Gefangenschaft erzogenen Löwen fallen nach Maßgabe der Art und Weise ihrer Erziehung und nach Maßgabe ihrer individuellen Constitution verschieden aus. Nicht selten werden uns verkümmerte, durch Hunger und Schläge verwahrlos'te Löwen vorgeführt, welche bei schlechtem Aussehen und gesenktem Haupte den Druck zu erkennen geben, unter dem sie erwuchsen, weit entfernt, uns den Begriff, den wir gewöhnlich mit dem Namen des Löwen verbinden, zu rechtfertigen. Daß indessen auch gezähmte Löwen zu dem vollkommnen Wachsthum und dem allerdings majestätisch kräftigen Ansehen des freien Löwen gelangen können, zeigt uns das Beispiel der durch die Herren Martin und van Aken erzogenen Löwen, unter denen der von denselben sogenannte Riesenlöwe an Schönheit und Größe alle übertraf, die wir irgendwo jemals gesehen. Die menschenfreundliche Behandlung begünstigt auch hier, wie bei dem Pferde und allen dem Willen des Menschen unterworfenen Thieren, die Entwickelung des Geistes und Körpers dieser Geschöpfe. Die Nahrung, deren der Löwe bedarf, ist wie bei allen fleischfressenden Thieren verhältnißmäßig nicht beträchtlich, denn es gedeiht das ausgewachsene Thier bei 8—12 Pfund Fleisch in 24 Stunden, kann aber auch lange Hunger aushalten. Der Löwe tödtet das Thier, welches er lebendig bekommt, durch das Zerbeißen der Gurgel, öffnet mit einem Schlage der Klaue den Leib und frißt zuerst die edleren Eingeweide, die übrigen Theile nach und nach nebst den zermalmten Knochen. Hundeähnliche Thiere, also auch Füchse und Wölfe frißt er nicht. Junge Kameele und junge Elephanten scheinen ihm Leckerbissen zu seyn. Zum unmittelbaren Umgange mit Menschen ist aber der Löwe durchaus nicht geschaffen, und wenn er auch die größte Anhänglichkeit

Digitized by Google

und Treue gegen Einzelne beweis't, so kann es schon um der Gefahr willen, welche andern ihm unbekannten von ihm droht, niemals versucht werden, ihn als freies Hausthier zu halten. — Die Löwen leiden, wie schon oben gesagt, viel bei der Zahnung; ein anderes Uebel, dem sie in der Gefangenschaft häufig ausgesetzt werden, ist die Blindheit durch Verdunkelung der Crystalllinse, der graue Staar, wahrscheinlich durch die Feuchtigkeit, deren die Thiere bei der gewöhnlichen Bauart der Behälter ausgesetzt sind. —

Das Alter mag sich bei den Löwen gewöhnlich auf 25 bis 40 Jahre erstrecken, man will auch Beispiele von 70 Jahren kennen. —

Jagd und Fang. Die Alten erzählen uns schon, daß sie die Löwen in Gruben gefangen haben, diese bedeckte man mit dünnen Baumstämmen und Reißig und band in den Mittelpunkt dieser hohl liegenden Bedeckung ein Stück Wild oder ein zahmes Thier fest. Sobald der Löwe seinen gewaltigen Sprung, zu welchem er nicht selten 24 bis 36 Fuß weit ausholt, auf diese Stelle richtete, brach er ein und wurde in der Grube entweder getödtet oder lebendig gefangen. Ein afrikanischer Hirte soll die Römer eine leichtere Weise gelehrt haben, sich der Löwen zu bemächtigen, nämlich mit einem Mantel, den man dem Thiere während seines Angriffs über den Kopf würfe. So würden sie durch Bedeckung der Augen wehrlos gemacht und ließen sich geduldig gefangen nehmen. Auch bei den römischen Kampfspielen soll dieß Experiment mit Erfolg wiederholt worden seyn, es findet sich auch eine Abbildung davon in Jo. Stradani venationes ferarum etc. fol. tab. 11. Eine andere Weise ihn zu fangen, geschieht durch starke Netze oder vielmehr Schlingen. Die Afrikaner treiben ihn mit Fackeln hinein, wobei sie Schilder vor dem Gesicht haben. S. Stradani tab. 10.

Die Löwenjagd hat nun wohl durch Anwendung der Feuergewehre eine größere Sicherheit erlangt, dessenungeachtet bleibt sie gewöhnlich mit großer Gefahr verbunden. Nur in seltnen Fällen geschieht es, daß der Löwe am Tage in die bewohnten Plätze kommt, wovon Lichtenstein ein Beispiel erzählt. „Ein afrikanischer Colonist, van Wyk, war vor seinem Hause mit Ausbesserung eines Wagens beschäftigt. Im Hause neben der Thüre saß seine Frau und die Kinder spielten neben ihr. Plötzlich am hellen Tage erschien ein großer Löwe und legte sich ruhig auf die Thürschwelle in den Schatten. Die Frau vor Schrecken erstarrt, bleibt auf ihrem Platze, die Kinder flohen in ihren Schooß. Ihr Geschrei macht den Vater aufmerksam, er eilt nach der Thür und bemerkt dort den Löwen, der ihn nicht sah. Fast unwillkührlich bewegte sich Wyk nach der Seite des Hauses und dem Fenster des Zimmers, wo sein geladenes Gewehr stand. Glücklicherweise stand das Fenster offen und eben so die Thüre des Zimmers, so daß er die ganze drohende Scene übersah. Er konnte die Flinte erhaschen, legte ohne langes Besinnen auf den Löwen an, der eben eine Bewegung, vielleicht zum Sprunge machte, rief leise der Mutter Trost zu und schoß, hart an den Locken seines Knaben vorbei, dem Löwen in die Stirn, so daß dieser sich nicht mehr regte.“ Schon oben bei Betrachtung der Lebensweise lernten wir den eigentlichen Aufenthalt des Löwen kennen und die Art seines Angriffes. In jenen großen Ebenen mit Gebüschen und ausgedehnten mit hohen Binsen und mit Schilf bewachsenen Plätzen an den Ufern der Flüsse, finden wir das Lager fast aller großer katzenartiger Raubthiere. Hat man einmal aus der Fährte oder den Eindrü-

Digitized by Google

cken seiner Fußtritte im sandigen Boden die Spur des Löwen gefunden, so dauert es gewöhnlich nicht lange, bis die Hottentotten und deren eingeübte Hunde den Löwen selbst entdecken und aufjagen. Wie er sich dann benimmt, ist oben geschildert worden. Es bleibt hier Regel, daß man nicht vor ihm fliehe, sonst ist man verloren. Entschlossen fest zu stehen und ihn steif ansehen ist hier das einzige Mittel ihn zu fesseln, er steht dann selbst still oder duckt sich nieder, um den großen Sprung zu wagen. Geschieht dieß so ist es Zeit, auf ihn zu schießen, wenn er so nahe ist, daß man ihn nicht zu fehlen fürchten muß. Wenn man unbewaffnet ist, wird es doppelt nöthig die Fassung nicht zu verlieren, denn das einzige Mittel zur Rettung besteht auch hier nur darin, daß man fest und still steht, unverwandten Blickes ihn anstarrend. In diesem Falle soll man sich sogar nicht irren lassen, wenn er sich niederduckt, denn er wagt den Sprung nicht, so lange man Muth genug hat, unbeweglich zu stehen und mit den Augen ihn scharf zu fixiren. Jede Bewegung dagegen scheint er als Zeichen der Feigheit oder als Einladung zum Angriff zu deuten und bricht dann blitzesschnell auf den Gegner los. Hat dieß gegenseitige Anschauen eine Zeit lang gedauert, so dreht sich der Löwe um und geht langsam seitwärts, blickt noch einigemal zurück, bewegt sich wieder langsam fort, bis er endlich aus dem Gesichtskreise des Menschen zu seyn glaubt, wo er im vollen Laufe entrinnt, von seinem eigenen Schrecke, der erhabenen Gestalt des Herrn der Erde begegnet zu seyn, sich zu erholen. Barrow erzählt dagegen, wie einst ein Hottentott vier und zwanzig Stunden lang auf einem Aloestrauche blieb, weil ein Löwe sich ihm zu Füßen gelegt hatte, der ihm erst gefolgt war, als er seine Heerde zur Tränke getrieben hatte. Der Löwe wurde endlich selbst durstig und ging zum Wasser, der Mann benutzte diesen Zeitpunkt und eilt eine Meile weit nach Hause. Der Löwe kehrt indessen zurück zu dem Strauche, vermißt den Mann und folgt seiner Spur auf dreihundert Schritte nach dem Hause. Sowohl die 12 — 15 starken Hunde, als die Pferde, deren man zur Jagd bedarf, müssen auf die Löwenjagd besonders dressirt werden, außerdem wagen sie selten den Angriff. Die Buschmänner wissen, daß der Löwe seine Mahlzeit gewohnter Weise früh Morgens bei Sonnenaufgang hält und dann auch wohl Abends bei Sonnenuntergang. Sie begeben sich nun um Sonnenaufgang dahin, wo sie wissen, daß Heerden von Antilopen grasen und beobachten diese. Sehen sie irgend wo in der Heerde eine Unruhe, ein Durcheinanderlaufen vor Schrecken, so geben sie genau Achtung auf die Stelle, woher die Veranlassung dazu kam, und etwa eine Stunde vor Mittag, wenn die Sonne schon ihre höchste Gewalt übt, kehren sie dahin zurück und durchsuchen die Stelle genau, weil sie aus Erfahrung wissen, daß der Löwe jetzt von seinem Mahle ausruht und in gemächlicher Ruhe wohl eingeschlafen ist. Hier finden sie ihn und senden vergiftete Pfeile in seine Brust. Der Löwe erwacht vom Schrecke, springt vom Lager auf und sucht noch durch einen Sprung sich zu retten, allein der Pfeil verfehlte nicht, seine Wirkung zu äußern und der Buschmann weiß sicher, daß er nach wenigen Stunden ihn entweder todt oder mit dem Tode kämpfend wieder antrifft.

Mr. Pringle, dem sich die Gelegenheit darbot, die Sitten der Eingebornen in Südafrika gründlich zu studiren und ihre Berührungen mit den wilden Thieren des dortigen Landes kennen zu lernen, giebt auch eine gute Beschreibung von einer Löwenjagd, an welcher er und mehrere andere zum erstenmale Theil nahmen. Er

Digitized by Google

war ein Bewohner der östlichen Grenze der Cap-Colonie und im Jahr 1822 lag sein Pachtgut am Bavian's River. Er erzählt folgendermaßen. Ein Löwe, welcher seit kurzem einige Schaafe aus meinem Grundstücke geraubt hatte, kam eines Nachts und tödtete mir mein Reitpferd, nur etwa hundert Schritte weit vom Thore meines Hauses. Ich wußte daß der Löwe, sobald er seine Beute nicht fortschleppt, sich in der Nähe aufhält und einen passenden Augenblick ablauscht, dieselbe leichteren Spieles zu erlangen. Ich beschloß nun gegen ihn ohne Aufschub und ohne Barmherzigkeit zu verfahren. Ich sendete einen Boten in die Umgegend und ließ alle einladen, welche Lust hatten, an der Jagd Antheil zu nehmen, sich sobald als möglich auf dem zur Zusammenkunft bezeichneten Platze einzufinden. In einer Stunde waren die Männer der sämmtlichen Umgegend, mit Ausnahme zweier feigen Wichte, welche vorzogen bei den Weibern zu bleiben, wohlberitten und bewaffnet zur Stelle. Wir hatten auch etwa ein Dutzend Bastard- oder Mulatten-Hottentotten zusammengebracht, welche zu der Zeit in unserm Bezirk sich aufhielten, es sind dieß thätige und unternehmende, obwohl nicht eben zuverlässige Leute. Unsere Freunde, die Tarka-boors, unter denen es tüchtige Löwenjäger giebt, waren leider zu weit von uns entfernt, um Antheil zu nehmen, denn diese unsre nächsten Nachbarn wohnten zwanzig Meilen weit von der Besitzung. So waren wir bei eigenem Mangel an Erfahrung genöthigt, durch die Hottentotten die Jagd leiten zu lassen.

Zuerst mußte nun der Löwe nach seiner Fährte aufgesucht werden. Einige Hottentotten zu Fuß übernahmen dieß Geschäft, gingen von dem Platze aus, auf welchem das Pferd getödtet worden war und wußten die Fußtapfen wieder zu finden und ihnen zu folgen, ungeachtet sie durch Gras, Kies und Buschwerk hindurchgingen. Die bewundernswürdige Ausdauer und Geschicklichkeit, mit welcher sie dieß Geschäft verfolgten, führte sie endlich in ein großes Dickicht aus Gestrüpp und immergrünen Bäumen, etwa eine Meile weit vom Hofe. Nun kam es darauf an den Löwen aufzutreiben, um ihn in geschlossenen Reihen möglichst klug und erfolgreich anzugreifen. Die bewährte Weise ist in solchen Fällen die, daß man ihn durch Hunde beunruhigt, bis er sein Lager verläßt und sich in's offne Feld begiebt. Die ganze Jagdgesellschaft drang dabei immer vorwärts und feuerte wohlüberlegt immer einer um den andern. Da er davon nicht so schnell fallen konnte, sondern es ihn nur immer mehr entrüsten mußte und vorauszusehen war, daß er sich dadurch veranlaßt sehen würde, auf seine Feinde loszugehen, so mußten wir uns immer in geschloßnem Kreise halten und unsere Pferde blieben mit dem Hintertheile auswärts gekehrt. Einige hielten die Pferde fest am Zügel, während die andern knieeten und unverwandten Auges bereit blieben, nach dem Löwen zu zielen, so wie er sich sehen lassen würde, da es bisweilen sich trifft, daß er sich ganz nahe bei den Füßen der Pferde befindet. Dann ist der Augenblick, ihm einen Schuß in den Kopf oder sonst eine tödtliche Wunde beizubringen. Verwundet man ihn ohne Erfolg, so wächst seine Wuth. Es geschieht auch wohl, daß die Pferde bei seinem Erscheinen und seinem Brüllen sich entsetzen, sich bäumen und losreißen, dann bekommt freilich die Sache ein sehr ernstes Ansehen, und nimmt wohl auch ein unglückliches Ende, besonders dann, wenn nicht auf jedem Platze muthige und entschlossene, in der Sache erfahrene Männer stehen. Die Grenzbauern sind indessen meist so vortreffliche Schützen und dabei so ruhig und überlegend, daß sie selten fehlen, und aus einer irgend günstigen Entfernung ihn meist tödtlich verwunden.

Digitized by Google

In gegenwärtigem Falle konnte man die Führung der Sache nicht eigentlich loben. Die Bastards hatten uns alle diese und andere weisen Vorsichten bei der Löwenjagd weitläufig erzählt und doch waren sie die ersten, welche sie nicht befolgten. Als sie sahen, daß die etlichen unbedeutenden Jagdhunde wenig Eindruck auf den Feind gemacht hatten, so theilten sie sich in zwei bis drei Abtheilungen, ritten um die Stelle herum, welche die Hunde umbellten, und feuerten auf dieselbe, doch ohne Erfolg. So vergingen einige Stunden und in einigen meiner Landsleute fing das schottische Blut an über diese Saumseligkeit unruhig zu werden, ihrer drei erklärten ihren Entschluß, dem Löwen selbst vor sein Lager zu rücken, drei von den Bastards, welche als die besten Schützen bekannt waren, möchten ihnen folgen, um mit ihnen den Angriff auf das Thier zu unternehmen. So wurde verabredet, obwohl einige der ruhigern Theilnehmer unter uns es widerriethen. Etwa funfzehn bis zwanzig Schritte von dem Platze lag das Thier wirklich, es hatte sich über die Wurzeln eines großen immergrünen Baumes ausgestreckt, auf der einen Seite war ein kleines freies Plätzchen, und bei der Annäherung glaubten sie ganz genau zu sehen, wie es unter den Blättern hervor einen fürchterlichen Blick auf sie schoß. Indem nun die Bastards befehligt wurden, fest und unverrückt zu stehen, um ihr Ziel nicht zu verfehlen, so rückten die schottischen Helden muthig hervor, doch nicht gegen den Löwen, sondern — gegen einen großen Block röthlichen Gesteins, in dessen Nähe jedoch auch der Löwe wirklich lag. Ob ihn jetzt ein Streifschuß getroffen, war ungewiß, jedoch sprang er pfeilschnell unter furchtbarem Gebrüll aus dem Gebüsche. Die feigen Bastards, anstatt nunmehr mit einer tüchtigen Salve ihm entgegen zu kommen, drehten sich um, ergriffen über Hals und Kopf die Flucht und überließen nun den Schotten das Vergnügen allein. Diese, mit abgeschoßnen Gewehren, taumelten in ihrer Eile, den Klauen des reißenden Thieres zu entkommen, durch- und übereinander. Wie ein Blitz war auch der Löwe bei ihnen und mit einer kleinen Bewegung seiner Tatze schlug er den nächsten zu Boden. Die Scene wurde nun schrecklich. Da stand der Löwe, den Fuß auf dem erschlagenen Manne, im Bewußtseyn seiner Kraft blickte er mit Stolz auf die Rotte seiner Verfolger, und zeigte dabei einen so edlen und imponirenden Anstand, als man nur irgend sich vorstellen kann. Ich habe nie eine großartigere Scene gesehen. Leider war die klägliche Lage unserer Freunde nicht geeignet, uns deren Anschauung in Ruhe genießen zu lassen und erzeugte in unseren Gefühlen ein Gemisch von sehr verschiedener Stimmung. Wir mußten jeden Augenblick erwarten, einen oder den andern von ihnen in Stücke zerreißen zu sehen. Denn obwohl der übrige Theil der Gesellschaft funfzig Schritte weit mit ihren gezogenen und angelegten Gewehren stand, durften wir doch nicht mit ihnen feuern, denn einer von uns lag unter der Klaue des Löwen und die andern wankten vor uns im Wege herum, so daß wir sie gewiß würden erschossen haben. Dieß alles ging aber schneller vor sich, als ich es beschreiben konnte. Glücklicherweise schien der Löwe, nachdem er uns unverwendeten Blickes einige Sekunden lang beobachtet hatte, sich nicht weiter mit uns einlassen zu wollen, und mit sehr erwünschter Mäßigung wendete er sich ruhig um, trieb die schnüffelnden Hunde wie Ratten vor seinen Füßen hin und schritt über das nahe Dickicht mit derselben Ruhe, wie die Katze über ein Fußbänkchen, lichtete Büsche und Gesträuche von zwölf bis funfzehn Fuß Höhe, als ob es Grashalme wären, und zog sich dann gegen die Berge zurück.

Digitized by Google

Als wir nun die Lage unseres befreiten Kameraden, welcher glücklicherweise nichts als eine leichte Kratzwunde auf dem Rücken und einige Rippenbrüche davon getragen, untersucht hatten, erneuerten wir sogleich die Jagd mit den Hottentotten und Hunden gemeinschaftlich mit lautem Geschrei. Sehr bald stießen wir wieder auf unsern Feind und fanden ihn, wie er an der Seite eines Bergstroms, des Douglas-Water, unter einer alten Mimosa stand. Die Hunde bellten um ihn herum, fürchteten sich aber doch ihm nahe zu kommen, denn er erhob ein gewaltiges Gebrüll und schlug mit dem Schwanze um sich herum, so daß man seine üble Stimmung erkannte. Die Hottentotten stellten sich zwischen ihn und den Berg, und nahmen einen Vorsprung vom Felsen ein, von wo aus sie den Platz, wo der Löwe stand, bequem übersehen konnten. Eine andere Abtheilung von uns nahm ihren Stand auf einer andern Seite des Thales und brachte so den kräftigen Räuber zwischen zwei Feuer, welche seine Aufmerksamkeit irre leiteten und seinen Rückzug abschnitten. So wurde nun auf ihn geschossen bis er fiel, von mehreren Wunden durchbohrt. Es war ein ausgewachsener Löwe von der gelben Race, etwa 5—6 Jahr alt. Er maß von der Nasenspitze bis zum Schwanzende ziemlich zwölf Fuß. Seine Vorderbeine waren am Knie so dick, daß ich sie mit beiden Händen nicht umspannen konnte, und sein Nacken, seine Brust und Schenkel schienen nach Oeffnung der Haut aus lauter tüchtigen Sehnen zu bestehen.

Wäre der Löwe feig, so würde er in solchen Kämpfen nicht stehen bleiben, aber eben da wo er Gewalt gegen sich gerichtet sieht, zeigt er sich am standhaftesten und beweis't, daß er dann selbst dem Menschen sich entgegenzustellen vermag, wenn er durch Auftreibung von seinem Lager oder durch offenbaren Angriff bestimmt herausgefordert worden.

Zum Verscheuchen der Löwen, sagt man, trüge auch der Hahnenschrei bei, n er entflöhe, was aber keineswegs bestätigt wird. Bei den Bivouaks der Caran bedient man sich nächtlicher Feuer, um überhaupt wilde Thiere zu scheuchen, en erzählt Poiret in seiner Reise in die Barbarei, daß der Löwe in Numisich durch nichts abhalten lasse, daß er ungeachtet der lodernden Feuer mitten in bischen Horden dringe, um sich seine Beute zu verschaffen, den Menschen aber ir in Ermangelung anderer Nahrung im Heißhunger anfalle.

Nutzen und Schaden. Man kann nicht sagen, daß die große Menge von welche es in der Vorzeit gegeben, auf die Cultur der Menschheit einen nachn Einfluß geübt habe, denn Afrika war in jener Zeit überaus bevölkert und aner befanden sich fast auf einer höheren Stufe der Bildung als irgend ein Volk, sie erfreuten sich einer Cultur, welche den heutigen Bewohnern jener edehnten Districte gänzlich fremd ist. Das Vorhandenseyn jener großen senden Thiere muß überhaupt nicht als gegen das Menschengeschlecht unmitzerichtet angesehen werden. Im gewöhnlichen Leben nimmt man wohl den für die Hauptsachen und sieht jene Verminderung der großen Raubthiere auf e Erde als ein vortheilhaftes Ereigniß an, für das Fortbestehen des Menschenechts und der mit ihm lebenden Thiere. Weiß man dagegen, daß wahrscheinnehr Menschen durch die sanften pflanzenfressenden Thiere, durch den Hufschlag Pferde oder durch den Stoß der Rinder zum Tode gefördert werden als durch eischfressende Thiere, daß auch ferner nicht bloß diese wilden Fleischfresser, sondern

Digitized by Google

auch jene sanften von vegetabilischer Kost sich ernährenden Thiere in ihren Riesenformen vom Erdkreise verschwunden sind und fortwährend sich verringern, so mögen wohl andere Gründe dafür aufgesucht werden müssen. Azara beobachtete in Südamerika und andere wahrheitsliebende Reisende in Asien und Afrika, daß selbst die gefährlichsten reißenden Thiere, eben die großen Katzenarten, so wie der Löwe selbst, niemals aus andern Gründen als um ihrer Selbstvertheidigung willen, nach einem auf sie geschehenen Angriff, sich dem Menschen entgegenstellen, und — wie schon erwähnt — vielleicht nur im höchsten Grade des peinlichsten Hungers einmal eine Ausnahme machen, überhaupt aber auch unter den Thieren, welche ihre gewöhnliche Nahrung ausmachen, niemals mehr tödten als sie zu ihrer Nahrung bedürfen. In dieser Mäßigung im Morden spricht sich sogar eine gewisse Sicherheit für den Menschen und für die übrigen Thiere aus. Dessenungeachtet sind immer die Löwen verfolgt worden und Polybius und Scipio Aemilianus's erzählen sogar, daß sie in Afrika an das Kreuz geschlagene Löwen gesehen haben, die man aus Strafe dafür, daß sie Menschen gefressen und zur Warnung für andere Löwen gekreuzigt hatte. Man behauptet auch noch immer, daß Löwen, welche einmal Menschenfleisch genossen, dann öfter dem Menschen nachstellten, wahrscheinlich nicht sowohl um des Fleischgeschmacks willen, als darum, weil sie die Scheu vor ihrem Beherrscher verloren haben. — Es ist wohl auch ferner einleuchtend, daß mit einer geregelten Forstwirthschaft, wie wir diese in Europa haben, die Hegung großer Raubthiere nicht bestehen könnte.

Unmittelbaren Nutzen gewährt der Löwe vorzüglich im Besitz derer, welche ihn der schaulustigen Menge vorführen. In der schon bezeichneten Zeit der Römer erhöhte er die Pracht der Triumpfe und Kampfspiele. Als Zugthier ihn zu benutzen, dürfte ein gefährliches Spiel seyn, und die Abrichtung der Löwen zur Jagd möchte wohl auch nur selten geschehen, und deren Zweck durch den bald zu betrachtenden Guepard oder Chetah (unsre Nr. 17.) sichrer erreicht werden. In Afrika pflegt man das Fleisch der Löwen zu essen, es soll einen dem des Kalbfleisches ähnlichen Geschmack haben. Eine Löwenhaut trug schon Herkules und so wurde sie das Kleid der Helden. Die Neger bedienen sich deren als Lagerdecken, auch in Europa sieht man sie hier und da als Pferde- und Schlittendecken, doch stehen sie nicht in bedeutendem Preiße. Sattler und Riemer benutzen das Leder. Die Löwenballen, Haarkugeln, welche man wie bei andern Raubthieren im Magen findet, gelten noch bei den vorzüglich in der Medicin abergläubischen Bewohnern des südlichen Europa als arzneiliche Substanzen, von denen sie wichtige Kräfte erwarten. Dasselbe gilt bei den Afrikanern noch von fast allen Eingeweiden des Löwen, besonders von dessen Herz, auch von seinem Blute und Fette. Letzteres ist allerdings erweichend, wie das Fett vieler anderer Thiere.

Zweifelhafte dem Löwen ähnliche Thiere sind bei den Schriftstellern manche erwähnt worden, als 1) Löwen ohne Mähne bei Solinus und Oppianus. — 2) Löwen mit wenig Mähne in Thracien, an der Grenze von Arabien, um Bagdad, nach Olivier. — 3) Löwen mit krauser Mähne, nach denen viele Antiken gemacht zu seyn scheinen, im Fall diese nicht als licentia poëtica des Bildhauers erklärt werden müssen, erwähnt Aristoteles IX. 69. als eine furchtsame Race. — 4) Schwarze und struppige Löwen Indiens, welche zur Jagd abgerichtet werden, bei Aelian lib. XVII. —

Digitized by Google

Abbildungen von Löwen dürften in der That unzählige existiren, dennoch gehört die gute Darstellung eines Löwen unter die allerschwierigsten Aufgaben eines Künstlers und selbst unser trefflicher deutscher Thiermaler Ridinger hat keinen Löwen gezeichnet, den man nur leidlich nennen könnte. Viele der übrigen Abbildungen sind gänzlich verfehlt und wahre Carricaturen oder Pasquille auf die Löwennatur zu nennen. Selbst die Bildwerke der Alten sind entweder nicht frei von dem Vorwurfe des Manierirten oder die Löwen welche ihnen zum Vorbilde dienten, waren von anderer Raçe als unsere heutigen sind. Unsere Darstellungen sind nach Vergleichung unzähliger Bildwerke der an Kunstschätzen so reichen sächsischen Residenz, nach den Originalen der geistreichsten jetzt lebenden Thiermaler, eines Thomas Landseer und William Harvey gefertigt worden. Wir denken wie einer der Beschauer: „das sind endlich Löwen!" —

Fig. 1. ein Löwe und eine Löwin der Hauptraçe aus der Berberei. 2. Eine Löwin nebst ihren Jungen, beide nach dem Leben in der Menagerie am Tower gezeichnet.

3. Der Tiger, Königstiger. Felis tigris Linn. — Weibchen: Tigrin.

Griechisch: ὁ und ἡ τίγρις (medischen Ursprungs, bedeutet: ein Pfeil.) — Altlateinisch: tigris, mittel- oder neulateinisch fälschlich: tygris. — Italiänisch: il tigri. — Französisch: le tigre royal, la tigresse. — Englisch: the tiger, the tigress. — Persisch: paleng. — Russisch: Babr. — Tartarisch: Julbars. — Mongolisch: Barr. — Kalmukkisch: Charkulla. — Indisch: Bahgghae. — Tunguisch: Morerija-hajun. — Tanqutisch: Wali. — Sinesisch: Lou-chu, Lau-hu, Hu. — Chinesisch auf Java: Hari-mou. — Malayisch auf Java: Radja-utang.

Kennzeichen der Art: rothgelbbraun, unten weiß, Kopf, Leib und Füße vom Rücken aus schwarz quergestreift.

Beschreibung. Der Tiger steht dem Löwen in Größe nicht nach, im Gegentheile lesen wir oft er werde noch größer. Bei dergleichen Angaben ist indessen immer an relative Verhältnisse zwischen einzelnen Individuen zu denken und viele meiner Leser dürften die ausgezeichneten Exemplare beider Thierarten noch in Erinnerung bewahren, welche Hr. van Aken vor einigen Jahren in seiner Menagerie unter der Bezeichnung eines Riesenlöwen und Riesentiegers vorzeigte. Auch der Tiger erscheint meist in einer Länge von 5—6 Fuß und die völlig ausgewachsenen Individuen von 7 Fuß bekommen wir in Menagerien höchst selten zu sehen; der Schwanz mißt dann noch 3 Fuß. Die Höhe des Thieres beträgt 3—4 Fuß.

Die Gestalt des Tigers ist noch weit bestimmter die unserer Katzen, indem sein Kopf in ein ähnliches Verhältniß zum Körper gestellt ist. Auch der Leib ist mehr als bei dem Löwen in die Länge gestreckt, die Stärke der Brust geringer und der ganze Leib ist schmaler. Der Hals des männlichen Tigers erscheint ebenfalls im Alter mit einer wenigstens kurzen Mähne geziert, welche das ganze Gesicht mit umgiebt. Unter diesen Umständen dürfen wir den Tiger in seiner äußeren Gestaltung mehr mit der Löwin als mit dem Löwen vergleichen, doch ist der Kopf noch kürzer und runder als bei dieser. Die Behaarung verbreitet sich über den größten Theil des Körpers und über den sich allmälig verdünnenden quastenlosen Schwanz, glatt anliegend. Nur unterseits von der Kehle an aufwärts an den Ohren und unterwärts über den Leib hin ist das Haar länger und schlaffer, fast zottig. Ein schönes Braungelb zieht sich über den ganzen obern Theil des Thieres über die Seiten und Füße herab, das reine Weiß beginnt an den Lippen, zieht sich über die Wangen nach den Seiten des Halses über die ganze Bauchseite und über die Innenseite der Füße, auch über jedem Auge findet sich ein mehr oder

Digitized by Google

weniger ausgedehnter weißer Fleck, so wie die Innenseite der Ohren ebenfalls weiß ist. Die Zeichnung auf dem glatten Felle besteht aus schwarzen Streifen, welche von der Rückenlinie ausgehen und schon an der Nasenwurzel beginnen, endlich den Schwanz als Ringe umgeben, wie dies alles treulich die Abbildung darstellt, die Pupille im Auge ist rund, und dessen Iris grünlich oder bräunlichgelb, die Ohren abgerundet und das Weibchen ist außer durch die Anwesenheit von zwei Paar Saugwarzen, nicht wesentlich verschieden.

Neugeborne Tiger sind auch ungefähr so groß als die neugebornen Löwen, haben einen etwas plumperen Umriß ihres Körpers als die alten, auch ihre Farben sind minder lebhaft, besonders das Weiße ist matter und weniger deutlich gesondert. Die Zahl der Jungen beläuft sich auf zwei bis vier, man spricht auch von fünf. Auch in England haben sich Tiger gepaart und ein einzelnes Junges zur Welt gebracht. Die Tragzeit dauerte vierthalb Monat.

Besondere Raçen des Tigers hat man nicht zu unterscheiden, seitdem der Begriff der Art sich genauer bestimmt hat. Abänderungen dürften nur individuell seyn und in mehr oder minder hohem Colorit des Felles bestehen, oder auf mehr oder minder zahlreichen, breitern oder schmalern Streifen beruhen.

Das Vaterland des eigentlichen Tigers ist Bengalen, Siam, Tunkin und Sumatra so wie Java; überhaupt die Halbinsel des Ganges bis Cochinchina. Schon Pallas *) berichtet indessen, daß auch russische, nördlicher gelegene Provinzen von ihm besucht und bewohnt werden, er sagt: der Tiger erscheint zuweilen um Dalai-noor und am Flusse Argun, kommt aber in der ganzen Steppe zwischen Sibirien, China und Indien vor, eben so auf dem altaischen Gebirgszuge außerhalb der russischen Grenzen und um den Aral-See. Nach Fischer geht er bis zu den Flüßen Ischim und Irtisch, selbst bis zum Ob. Auch Ehrenberg erfuhr, daß er dort bis in die Breiten von Paris und Berlin herabkäme.

Aeltere Schriftsteller bezeichneten ohne Unterschied die großen gefleckten Katzenarten mit dem unbestimmten Namen des Tigers, so daß selbst der in das gewöhnliche Leben übergegangene Ausdruck „getiegert" meistens nur für „gefleckt" gebraucht wird. Bei sorgfältiger Sonderung des eigentlichen Tigers finden wir dessen Erwähnung bei Plinius und Oppianus und es scheint, daß zuerst Augustus durch seine Gesandten in Indien ächte Tiger nach Rom brachte. Unter dem Consulate des Quintus Tubero und Fabius Maximus ließ er am 4. Mai bei feierlicher Einweihung des marcelliniſchen Theaters einen gezähmten Tiger sehen. Claudius brachte dann deren vier und eine treue Mosaik, welche man neuerlich bei dem Arkus des Gallienus auffand, bezieht sich hierauf. Heliogabalus fuhr bei einem bacchantischen Triumphzuge mit einem Gespann von zwei Tigern. Gordianus III. besaß deren zehn.

In den europäischen Menagerien unserer Zeit gehören die Königstieger immer unter die seltensten und kostbarsten Thiere, und die durch Herrn van Aken vor einigen Jahren gesehene Versammlung von vier prächtigen Exemplaren derselben, darf für den Continent fast unerhört genannt werden.

Die Naturforscher der spätern Zeit, welche den Tiger genauer unterschieden, begannen seinen Character so zu schildern, daß er zum Bilde der Grausamkeit und der

*) Zoogr. ruthen. asiat. I. 115.

Digitized by Google

Mordlust wurde. Buffon sagt von ihm er solle unablässig würgen ohne der Beute zu bedürfen, das Schlachtopfer lebendig verzehren und in unersättlichem Blutdurste sich gefallen. Ruhige Betrachtung dürfte ein solches Scheußal in der lebendigen Natur keineswegs antreffen und jene Schilderung in der Erfahrung keine Rechtfertigung finden. Bei einem Rückblicke auf die Erklärung des Löwencharacters mag eine ähnliche Ansicht uns hier leiten. Das gewaltige Thier ist und bleibt eine Katze, es ist folglich derselben Sanftmuth und Schmeichelei nicht unfähig welche wir an dieser erkennen, es erscheint aber auch, wenn die Herrschaft der niederen Triebe die edleren Regungen verdrängt als grausam blutdürstiges Wesen und um so furchtbarer, je größer die Kraft ist, welche dem athletischen Körper inwohnt. Man verschrie den Tiger vielleicht darum als vorzugsweise blutdürstig, weil er in bewohnteren Gegenden lebt, folglich weit mehr Hausthiere raubt und weil aus demselben Grunde die Fälle seines Zusammentreffens mit Menschen und die Veranlassung zu seiner Selbstvertheidigung weit häufiger vorkommen als bei dem Löwen, welcher die Wüsten bewohnt. Aber auch der Tiger fällt den Menschen nicht unbedingt an. Im gesättigten Zustande ist er träge und feig, flieht dann sogar vor dem Menschen und pflegt gleich ähnlichen Thieren nach eingenommenen Mahle, wenn es angeht, in Ruhe zu verdauen und sich dem Schlafe zu überlassen. Johnson traf einst auf einer Hasenjagd auf einen Tiger, der sich in diesem Zustande befunden haben mochte, der Tiger erhob sich und ging langsam und unwillig an ihm und an den Dienern, welche mit dem Bepacken der Pferde beschäftigt waren, vorbei. Der Tiger kehrt auch in manchen Fällrn leicht von seinem Anfalle zurück, wenn er erschreckt wird. Eine heitere Gesellschaft fuhr in einer Gondel auf dem Ganges in der Nähe von Calcutta, als ein Tiger aus dem Dickicht am Ufer hervortritt und zum tödtlichen Sprunge auf die erblickten Menschen bereit ist. Eine Dame breitet ihren, nach der Sitte des Landes großen Sonnenschirm aus, um sich damit zu bedecken, und bei dessen Anblick wendet sich der Tiger um und entflieht. Ein andermal stürzt bei einer Tigerjagd ein Engländer von einem Elephanten herab und fällt auf den Tiger, dieser drüber gleichfalls erschrocken, entflieht. Auch das entschlossene Standhalten soll ihn, eben so wie den Löwen vertreiben. Einem unbewehrten Offizier gelang es durch stundenlang fortgesetztes, muthiges aber ruhiges Entgegentreten, einen Tiger zur Flucht zu bewegen. Hungrige Tiger fallen Menschen ohne Unterschied an, ohne Furcht vor der Menge oder der benachbarten Feuer, wofür noch Beispiele weiter unten.

Von gezähmten Tigern lesen wir bereits in der Geschichte römischen Kaiser und auch späterhin kommen Beispiele vor. Schon Pallas sah einen im kaiserlichen Jägerhofe in St. Petersburg, den Bucharen jung dahin gebracht hatten. Er sollte ziemlich langsam gewachsen seyn, war aber bei der größten Wildheit die er in einzelnen Momenten verrieth, dennoch so zahm, daß sein Wärter zu ihm in den Käfig ging, sich in Gegenwart von Zuschauern von ihm die Hand lecken ließ und ihm die Faust in seinen Rachen steckte. Die kräftige Stimme des Wärters und ein leichtes Bespritzen mit kalten Wasser war hinreichend seine Wuth zu zähmen, wenn sie während dieser Zeit in ihm wieder erwachte. Auf ähnliche Weise und wahrscheinlich immer durch dieselben Mittel gezähmte Tiger, sind späterhin mehrmals in England und in Frankreich vorhanden gewesen und in Deutschland gezeigt worden. Auch kleine Hunde sieht man bei den gezähmten Tigern wie bei den Löwen und sie haben für einzelne dieser Thiere bisweilen besondere Neigung. So wird erzählt, daß Capitän White in Cambodia einer Tigerin

Digitized by Google

mehrere Hunde nach und nach vorwarf und dieselbe endlich einen, welcher sie muthig oder verzweifelnd anfiel und ihr die Nase blutig biß, durch ihre Aufmerksamkeit auszeichnete und ihn ruhig mit der Pfote von sich abwehrte, bis das kleine Thier in seiner unnützen Wuth ermüdete und von dem gefürchteten Wesen zärtliche Liebkosungen erfuhr, welche endlich ein Vertrauen erweckten, das von beiden Seiten zunahm. Sonst pflegt der Tiger bei Vorwerfung eines dergleichen schwachen Thieres mit ihm, wie die Katze mit den Mäusen anfangs zu spielen, endlich funkeln seine Augen, er bewegt den Schwanz hin und her und ergreift mit den Zähnen das Thier am Nacken. Die furchtbaren Eckzähne zertrennen schnell die Schlagadern am Halse, er läuft jetzt mit der Beute im Rachen im Käfig herum oder drückt sie mit der Tatze zur Erde und saugt ihr das Blut aus.

In der Lebensweise hat der Tiger überhaupt viel mit dem Löwen gemein. Sein Aufenthalt sind die weitausgedehnten Wälder seines heißen Vaterlandes, er liegt daselbst den Tag über in Felshöhlen oder im Dickicht, oft nahe bei den Wohnungen der Menschen, vorzugsweise in dem Gestrüpp der großen bis zwanzig Fuß hohen schilfartigen Bambusen, welche die Ufer der colossalen Flüsse bekleiden. Dies Dickicht oder Röhricht nennen die Engländer jungle, daher man wohl auch in deutschen Schriften von einem „Jungle" zu lesen bekömmt. Er lauscht hier nach Art der Katzen auf seine Beute, mit dem Schwanze wedelnd kriecht er näher herzu, tief mit dem Leibe zur Erde gedrückt, und sobald er die Beute sicher zu erlangen glaubt, hebt er sich zu dem gewaltigen Sprunge, stürzt sich auf sie, packt sie im Nacken, schlägt ihr die Klauen in die Kehle und bringt sie an einen sichern Ort. Mit Leichtigkeit trägt der Tiger auf diese Weise im schnellsten Laufe einen Menschen, ein Pferd, Maulthier oder einen Büffel, welche letztere alle seine gewöhnliche Nahrung ausmachen, im Rachen davon. Wenn er seine mächtigen Sätze auf die Beute vergeblich gethan und diese ihm entgeht, so zieht er sich beschämt zurück und hört auf ihr zu folgen. Sein Gebrüll (lateinisch: rancare), hört man sehr weit, in der Stille der Nacht durchtönt es in furchtbar schnaubendem „haub! haub!" die ruhenden Wälder. Sonst ist sein Brüllen im Zorn dem des Löwen nicht unähnlich; nur brüllt er nicht so wie jener in dem Momente wo er seiner Beute sich nähert. Wenn er sehr heißhungrig ist, so klingt seine Stimme mehr wie ein gräßliches Geschrei oder Gekreisch; bei Besorgniß um die geraubten Jungen durchschallt ein furchtbares Geheul der Mutter die weite Umgebung. Seine Fortbewegung geschieht kriechend oder schleichend oder in weiten gallopirenden Sätzen. Das Traben ist ihm fremd, daher er die Maulthiere und Pferde im geraden Laufe niemals verfolgt. Diese selbst sollen indessen bei seinem Anblicke meist so sehr erschrecken, daß sie nicht einmal im Stande sind, freiwillig zu fliehen. Ein Schlag mit der Tatze vom Tiger ist hinreichend einem Pferde, Kameele oder Büffel die Beine zu brechen.

Die Tigerin ist mit derselben Mutterliebe für ihre Jungen besorgt, wie die Löwin, nicht so der Tiger, welcher sich nicht um sie kümmern, sie sogar auffressen soll wenn er ihrer ansichtig wird. Von dem Löwen erzählt man so etwas nicht, indessen kommt auch bei den Hauskatzen dieser Fall nicht selten vor. Auch die Tigerin soll dies bisweilen selbst thun und auch dafür fehlen bei den Hauskatzen die Beispiele nicht. Redi (de generatione insectorum) erzählt einen Fall, daß eine Tigerin welche mit ihrem Jungen nach Florenz gebracht wurde, daselbst eines Tages das letztere, ob im Spaß oder im Ernst, war nicht zu unterscheiden, mit den Zähnen faßt, ihm die Beine zerbricht und

Digitized by Google

losreißt und nachdem sie die Glieder vom Leibe entfernt hat, diesen auffrißt, ungeachtet im Käfig Ueberfluß von anderem Fleische vorhanden war. Indessen beweisen zahlreichere andere Fälle die Zärtlichkeit der Mutter für ihre Jungen, und man darf sich um so weniger allgemein bei der Bestimmung des Characters einer Thierart aussprechen, als diese Geschöpfe sowol im wilden als vorzüglich im gezähmten Zustande doch auch individuell in den Aeußerungen ihrer Instincte abweichen und sich selbst überlassen, immer unfähig sind, plötzlichen Aufregungen der niedern Triebe der Wuth und des Zornes zu widerstehen. Capitän Williamson erhielt zwei junge Tiger während er in Ramghur in Garnison stand. Sie waren mit noch zwei andern in Abwesenheit der alten Tigerin aufgefunden worden. Man brachte sie in einen Stall wo sie mehrere Nächte hindurch so heftig lärmten, daß die Tigerin endlich herbei kam, sie zu befreien und deren Geschrei mit dem fürchterlichen Geheul beantwortete. Man sah sich endlich aus Furcht vor Gefahr genöthigt die Jungen frei zu lassen und früh am andern Morgen ergab sich, daß sie dieselben in das benachbarte Gebüsch entführt hatte. — Im engen Passe von Kutkumsandy lag eine Tigerin mit zwei Jungen und würgte mehrere Monate lang täglich einen oder zwei Menschen, unter denen nach und nach etwa ein Dutzend Postbothen ihr zum Opfer wurden. Diese Tigerin hatte dadurch alle Verbindung der obern Provinzen mit der Präsidentschaft fast gänzlich unterbrochen und die Regierung fühlte sich endlich veranlaßt einzuschreiten, indem sie einen Preis aussetzte. Ein Gentleman wurde auf seinem Palankin auf dieser Straße getragen, seine acht Träger erblickten die Tigerin und machten Halt, er wollte sie zwar veranlassen vorwärts zu bringen, man verständigte sich aber nicht und die Träger liefen davon, der Engländer selbst rettete sich auch noch. Ein Lieutenant mit 40 Mann kam die Straße entlang, erblickte die Tigerin, hatte aber nicht speciellen Befehl zu schießen, marschirte daher nach dem vorigen Posten zurück, um Meldung zu thun und Ordre zu holen. Er erhielt die Ordre zu schießen, machte den Weg noch einmal, traf aber die Tigerin nicht mehr an, sie hatte sich wieder verborgen und setzte ihre Räubereien fort, bis endlich eine Treibjagd des Raja dem Unwesen ein Ende machte und die Straße von jenem bösen Gaste befreiete. Auch die bekannte Erzählung von Frank und Lincolm (bereits im Carlsruher Unterhaltungsblatte 1828 aufgenommen, dann 1834 im Sonntags-Magazin u. a. wieder abgedruckt und deshalb hier nicht wiederholt) spricht für die Mutterliebe der Tigerin.

Die europäische Cultur hat auch in Indien sehr vortheilhaft auf die Ausrottung wilder Thiere gewirkt, und vorzüglich ist diese furchtbare Landplage der Tiger dadurch sehr vermindert worden. Die Hindus sind so wenig muthig, daß sie auch zu einer Jagd auf den Tiger sich nicht leicht freiwillig entschließen. Der Tiger wird unter diesen Umständen desto kühner und streift in die Höfe und Häuser wo er die Hausthiere raubt, ja selbst die Menschen mit sich fortnimmt, so daß sogar ganze Dörfer welche sich in der Nähe der Bambusenwälder befinden, durch Tiger entvölkert, leer stehen. Nach einem amtlichen Berichte welcher von der ostindischen Compagnie im J. 1819 gegeben wurde, waren in einem einzigen kleinen Distrikte das Jahr vorher nicht weniger als vier und achtzig Einwohner durch Tiger, welche in dem benachbarten Walde hausten, gefressen worden. In den Sunderbunds (niedrige sumpfige Inseln am Ausflusse des Ganges, an der Nordküste von Bengalen) wird alljährlich eine Anzahl von den Arbeitern in den dortigen Salzwerken die Beute dieser kühnen Räuber. Sie stürzen sich sogar in die See und schwimmen von einer Insel zur andern um ihre Beute zu suchen.

Digitized by Google

Die Kaste der Shekarrier kennt man als geschickte Jäger, doch ist ihre Zahl zu gering um die Länder von diesen Thieren zu befreien. Indische Fürsten stellen bisweilen mehr zur Belustigung Tigerjagden an und bieten Armeen von 20—60,000 Mann, Infanterie und Cavallerie dazu auf. Man umstellt die Tiger mit starken und hohen Netzen, man baut auf Bäumen und hohen Pfählen Schießhäuser, steckt Wald und Buschwerk ringsum in Brand und rückt auf Elephanten heran, wobei nun das fürchterlich lärmende Treibjagen jener vielen Tausende beginnt, welches dem Parforcejagen vergleichbar ist, indessen wird der Tiger vom bequemen Schießhause oder Haudah (howdah, einem Sattelsessel) erschossen, sobald er den Elephanten angreift, was aber nicht früher geschieht bis er sich gänzlich umstellt sieht. Der sich leichter bethätigende Muth der Europäer ist es eigentlich, dem jene Distrikte erst ernste Maasregeln zur Säuberung von diesen Erbfeinden der Einwohner verdanken. So wurde die Insel Cossimbuzar fast gänzlich durch einen Deutschen, Namens Paul, von Tigern gereinigt, welche derselbe mit ausgezeichneter Muskelkraft und mit unerschütterlichen Muthe verfolgte. Man sagt, er habe bis zu fünf Tiger an einem Tage erschossen. Sein Gewehr fehlte niemals und der Erfolg seiner Bemühungen, das Land von dieser Geisel zu befreien, war so groß, daß ungeachtet der unglaublich zugenommenen Verwüstungen welche man diesen Thieren, ohne ihnen den geringsten Widerstand entgegen zu setzen, zugelassen hatte, man dennoch bald alles in fruchtbares Ackerland verwandelt sah. Ein anderer Privatmann Heinrich Ramus, Richter des Distrikts Ruhar, hatte nach und nach nicht weniger als dreihundert und sechzig Tiger allein erlegt. Die ostindische Compagnie setzte anfangs zehn Rupien (etwa zwanzig Schilling, gegen sieben Thaler) für jeden in ihren Provinzen getödteten Tiger als Preis aus.

Wie bisweilen der Tiger die Menschen flieht, hat man auch vor einigen Jahren in England erlebt. Die Postpferde aus Salisbury Plain wurden von einer Tigerin angefallen, welche aus einer reisenden Menagerie entkommen war. Sie folgte ganz ihrem natürlichen Instinkte, lagerte sich in der Nähe der Landstraße und sprang von da aus auf die Vorbeipassirenden los. Die Wachen wollten sie hier erschießen, allein ihre Wärter trieben sie fort und sie entfloh zu einem Heuschober, unter welchen sie kroch und mit wenig Mühe hervorgezogen wurde. In den engen Pässen von Hindostan werden die Reisenden oft von Tigern angefallen und gewöhnlich wird dann ein Ochs, Kameel oder Pferd ihre Beute. Bei der Jagd ist es wegen der Furcht der Pferde höchst gefährlich, sich derselben zu bedienen. Der Elephant wird hierbei gewöhnlicher gebraucht. Obwol er bei dem Anblicke des Tigers heftig bewegt wird, so steht er doch fester, so daß sein Reiter im Stande ist dem entscheidenden Sprunge des Tigers durch einen kräftigen Schuß zuvorzukommen, wodurch dieser meistens zu Boden gestreckt wird. Es gehört zu den Eigenheiten des Tigers, daß er sich bestrebt nach dem Wasser zu entkommen, wenn er verfolgt wird oder wenn er der Beute nachgeht, und sodann nach dem andern Ufer entflieht.

Man erzählt auch eine eigene Weise, wie man sich des Tigers in den nördlichen Provinzen Ostindiens bemächtigt. Nach Auffindung der Spur eines Tigers gesellen sich die Bewohner zusammen und pflücken die Blätter eines Baumes den sie Prauß nennen, einem wilden Feigenbaume ähnlich aber nicht hinlänglich systematisch bestimmt, und bestreichen dieselben auf einer Seite mit einer Art Vogelleim den sie durch das Zerquetschen einer dort häufigen Beerenart bereiten. Diese Blätter werden dann auf

Digitized by Google

dem Wechsel (Weg zum Hin- und Hergange) des Tigers so auf den Boden gestreut, daß die klebrige Seite oben liegt. Sobald der Tiger auf eines dieser Blätter tritt, so beginnt er seine Bemühungen es wieder zu entfernen, er bewegt sich immer heftiger, erst mit den Füßen, dann mit dem ganzen Körper und bedeckt sich dadurch immer mehr mit den übrigen Blättern, bis er sich wüthend niederwirft und sich wälzt, wobei er sich aber immer mehr einhüllt und Augen, Ohren und Nase verklebt, so daß er in diesem Zustande fürchterlich brüllt und durch die hierauf herbeieilenden Bauern leicht erschossen wird. Auch durch Selbstschüsse mit vergifteten Pfeilen pflegt man dem Tiger zu begegnen. Wo man weiß, daß der Tiger ein Thier hingeschleppt und nur zum Theil aufgefressen hat, errichtet man in der Schnelligkeit ein Schießhaus und erwartet bei einbrechender Nachtzeit seine Rückkehr, wobei er oft von einzelnen, kühnen Schützen erlegt wird. Ist es ein menschlicher Leichnam den er geholt halt, so wagen wenigstens die Eingeborenen aus religiöser Furcht nicht hinzugehen. Wo an einer Straße ein Mensch von einem Tiger angefallen worden ist, errichtet man Warnungszeichen, eine Stange mit einem farbigen Tuch und erbaut dabei eine Hütte. Alle Reisende welche die Straße kommen, versammeln sich hier zum Gebet, wird aber dann noch einer vom Tiger getödtet, so halten sie dessen Tod für ein Gottesgericht.

Eine mißlungene Tigerjagd beschreibt auch der Bischof Heber in seinem Tagebuche so umständlich, daß man sich dadurch leicht in das Getümmel versetzt sieht. Er erzählt so: „zu Kulleanpoor machte einmal der junge Raja Gourman Singh gesprächsweise die Bemerkung, daß daselbst ein Tiger sich aufhalte welcher bereits viel Unheil angerichtet habe; er selbst wäre mehrmals nach ihn ausgegangen, ohne auf ihn zu treffen, sey aber nicht übel willens mit Mr. Boulderson, dem Einnehmer der Gegend und mit mir eine Streiferei gegen ihn zu machen. Ich antwortete ihm, daß ich die Hazardspiele nicht liebe, aber Mr. Boulderson's Augen traten in's Feuer als nur der Name Tiger genannt wurde, und er drückte nur Besorgniß aus schon diesen Nachmittag an dem Orte einzutreffen. Ich bezeugte keine Lust ihm sein Spiel zu beneiden und beschloß mich damit zu begnügen, einen Zuschauer abzugeben. Mr. Boulderson rieth mir indessen doch meine Pistolen für den Fall einer nöthigen Selbstvertheidigung geladen in Bereitschaft zu halten und bot mir auch eine schöne Doppelflinte für denselben Zweck dar. Wir setzten uns jetzt auf drei unserer Elephanten, jeder hatte hinter seinem Sattelsitze seinen Diener. Der Raja stellte sich in der Ungeduld seines Eifers an die Spitze des Zuges. Eine große Anzahl Volks zu Fuß und zu Pferd hatte sich aus unsern und aus den benachbarten Dörfern zusammengefunden und aus allen sprach sich dieselbe Theilnahme an der Jagdlust aus, welche man in England bei dergleichen Parthien zu sehen gewohnt ist. Der Raja saß auf einem kleinen weiblichen Elephanten, kaum größer als die Durhamer Ochsen und etwas pudelartig zottig, eine eigene Race aus der Nachbarschaft, welche gewöhnlich kleiner ist als die in Bengalen und Chittagong. Er saß auf dem niedrigen Sattelsessel mit zwei oder drei geladenen Gewehren. Mr. Boulderson hatte den Kopf seines Treibers mit einem tüchtigen Arsenal von Büchsen und Vogelflinten beladen. Wir ritten gegen zwei Meilen weit durch eine Ebene welche mit hohem Gras und Röhricht bedeckt war, so wie dies in diesen Gegenden gewöhnlich vorkömmt. Unzählige Wachteln und anderes wildes Geflügel flatterte da aus dem Grase empor und zierliche Gazellen weideten hier und entflohen nach allen Gegenden des heiteren Himmels. Der Erzähler schildert nun weiter die man-

Digitized by Google

nigfaltigen Stimmen welche das Röhricht belebend, aus ihm ertönten, und erwähnt wie auch zwei dem Elen ähnliche Hirsche (wahrscheinlich meint er hier den Roßhirsch, Cervus equinus oder das Rusa-Thier der Malayen), von den Einwohnern auch „Mohr" genannt, aus dem Gebüsche herausstürzten, und wie nun die Angst unter dem Jagdvölkchen immer mehr wuchs. Dann fährt er so fort: endlich gelangten die Elephanten mit ihrem Körper in's Freie, begannen zu brüllen und stampften heftig mit den Füßen. Der kleine Elephant des Raja drehte sich kurz herum und bei dem Widerwillen aller Treiber mochte dieser bitten oder drohen, der Elephant nahm seine Stellung zum großen Verdruß des Raja dicht hinter Mr. Boulderson. Die andern drei — auch von meinen Elephanten war noch einer hinzugekommen, dessen Treiber aber unbewaffnet, — bewegten sich träge von dannen, bald nachher aber erhoben sie mit einemmale ihren Vorderleib, breiteten ihre Ohren aus und blinzelten mit ihren kleinen verständigen Augen gerade vorwärts. Dies ist das Zeichen, wenn der Elephant den Tiger ausgewittert hat. „Wir sind ihm nun auf der Spur" sagte Mr. Boulderson, wir wollen dahin feuern, wo wir eine Bewegung im hohen Grase bemerken." In demselben Augenblicke stampfte mein Elephant wieder heftig mit dem Fuße und dessen Treiber schrie „hier, hier sehe ich den Kopf!" Ein kurzes Brüllen oder Grollen folgte dieser Scene und ich bemerkte unmittelbar vor dem Kopfe meines Elephanten im Grase die Bewegung eines großen Thieres, welches sich darin verborgen hielt. Ich feuerte in dieser Richtung und nach dem Schusse bemerkte ich ganz deutlich eine heftigere Bewegung und feuerte noch einmal. Abermals folgte ein kurzes Brüllen und die Bewegnng war dieß zweitemal noch lebhafter und verlor sich weiterhin in entferntere Gebüsche. Mr. Boulderson war darüber ungeduldig und meinte jetzt müsse man ihn nun wie eine Ratte heraustreiben und er wollte ihm schon den Garaus machen. Wirklich machte sich nun alles zu Fuß und zu Pferd auf die Beine und durchstreifte nach allen Richtungen das Röhricht. Auch wir begaben uns nach dem Platze wo wir die Bewegung des Thieres zuletzt gesehen hatten, allein alles blieb ein blinder Lärm, denn bei zu wiederholtenmalen erneuter Durchstreifung des Distriktes, konnten wir vom Tiger nichts wieder entdecken.

Auf unserer Rückkehr fragte ich Mr. Boulderson ob die Tigerjagd gewöhnlich so abliefe, und konnte mir nicht anders helfen, wenn ich sie mit den kleinen Abentheuern verglich welche in England auf der Fischotterjagd vorkommen. Er erwiederte mir, daß allerdings in solchen Gegenden welche mit Röhricht und hohem Grase bewachsen sind, ein verwundeter Tiger sich immer verbirgt und so lange als nur möglich ganz ruhig verhält. Hat er dagegen sein Versteck durchbrochen, oder findet er sich überhaupt in einer bequemen Lage sich entgegen zu stellen, so beginnt nun das ernstere Spiel, er greift seine Feinde an und unterliegt im Kampfe. Der Tiger stirbt, wie überhaupt fleischfressende Thiere in heißen Climaten, leicht an seinen Wunden, deren Ausgang, wenn sie auch nicht sogleich tödtlich sind, doch leicht bösartig werden. Der Löwe, nicht so groß und nicht so behende als der Tiger, benimmt sich doch bei solchen Angriffen kräftiger und muthiger, denn der Tiger reißt aus wenn er verfolgt wird und verbirgt sich. Der Löwe dagegen tritt seinen herannahenden Feinden fest entgegen, springt auf sie zu und begiebt sich mit offenem Rachen in die freie Ebene hinaus, gleich dem verwegensten Jagdhunde auf den offenen Kampfplatz. Er wird dann allerdings ohne große Umstände geschossen, und nur wenn man ihn öfter verfehlt wird er ein furchtbarer Feind. Denn so wenig behende er ist, so springt er doch mit desto größerer

Digitized by Google

Kraft und Heftigkeit und sein großer Kopf, seine gewaltigen Tatzen und die bedeutende Stärke seiner Brust befähigen ihn auf den höchsten Elephanten zu springen und ihn mit dem Reiter und allem was noch auf ihm ist, zu Boden zu werfen. Wenn dagegen ein Tiger auf den Elephanten springt, so gelingt es diesem gewöhnlich bald seinen Feind unter die Füße zu bringen, wo er ihn dann jämmerlich zurichtet. Der Elephant kniet auf ihn und zertritt ihn zugleich, oder versetzt ihm einen Hieb, wodurch er ihm die Rippen zerbricht, und schleudert ihn dann mit dem Rüssel bis auf zwanzig Schritte weit fort. Indessen sind auch die Elephanten in diesem Kampfe bisweilen heftig bedroht, denn ein alter und großer Tiger klammert sich so fest an, daß er oft den Elephanten überwältigt, so daß dieser niederstürzt und alles was auf ihm ist durch Feind und Freund in große Gefahr kömmt, da nicht selten bei diesem Sturze einer oder der andere der Reiter erdrückt wird. In seltenen Fällen gelingt es ihm sogar den Elephanten durch Abreißen des Rüssels tödlich zu verstümmeln. Wie die Büffel mit ihm verfahren erläutert folgende Geschichte.

Johnson erzählt in seinem Buche über die Volksspiele der Indier, daß ein paar Biparier, welche einige beladene Ochsen von Chittrah nach Palamow trieben, als sie sich noch einige Meilen von letzterem Orte befanden, von einem Tiger angegriffen wurden, welcher auf einen ihrer Leute sprang. Ein Guallah oder Hirt, war Zeuge von dem Vorfalle, er sprang zur Rettung herbei und versetzte dem Tiger einen tüchtigen Hieb. Dies veranlaßte jedoch nur, daß der Tiger den Biparier losließ und den Hirten selbst packte. Die Büffel von seiner Heerde stürzten nun auf den Tiger, ihren armen Hirten zu befreien und schleuderten sich einer nach dem andern auf ihren Hörnern den mattgewordenen Räuber zu, bis er starb. Der Biparier kam davon, der unglückliche Hirte mußte dagegen sein Mitleid mit dem Leben bezahlen.

Die Wunden von Tigerklauen erklärte man für giftig, wahrscheinlich in demselben Sinne wie man von den Wunden welche die Katzen verursachen, dasselbe zu sagen pflegt. Jene Volksmeinung hat nur in so weit Grund, als dieselben sehr gefährlich sind und sogar mit den Zehen bis zu einer Tiefe von fünf Zoll eindringen sollen. Man hat Beispiele genug, daß Menschen von Tigern heftig verwundet, dennoch vollkommen genaßen. So hatte einst bei einer dieser Jagden eine ungeheure Tigerin unerschrocken einen Elephanten angegriffen, der noch Neuling im gefährlichen Spiel war. Er drehte sich um und floh. Ungeachtet aller Bemühung des Treibers den Elephanten vorwärts zu bringen, gelang dies nicht und die Tigerin sprang auf dessen Rücken, packte den im Sattelsessel sitzenden Europäer bei dem Schenkel, schleuderte sich denselben über den Rücken und entrann so mit ihm in größter Leichtigkeit noch in vollem Laufe zum nächsten Dickicht. Alle Gewehre waren zwar auf das Thier gerichtet, aber Niemand wagte zu schießen, aus Furcht den Unglücklichen selbst zu treffen. So entkam das Thier, ohne daß die plumpen Elephanten ihm nachzukommen vermochten und nur zu Fuße konnte man die blutige Spur noch verfolgen, in der Hoffnung wenigstens den Leichnam des Freundes noch zu erlangen. Immer mehr verminderten sich die blutigen Zeichen und tief im Schilfe schien auch die letzte Hoffnung zu schwinden. Desto überraschender war der Anblick des verfolgten Thieres, welches man hier todt zur Erde gestreckt fand, den geraubten Menschen im krampfhaft geschlossenen Rachen noch festhaltend. Man schnitt den Rachen auf und löste die Beute heraus, indem man die furchtbaren Zähne des Thieres aus den Wunden wie aus Scheiden herauszog. Einem Wundarzte von der

Digitized by Google

Gesellschaft gelang es den Lebenshauch des Scheintodten wieder zu erwecken und alles athmete freier und dankte Gott für dies noch unerklärte Wunder der Rettung. Bei sorgsamer Pflege in einem benachbarten Hause kam der Leidende gänzlich wieder zu sich und erzählte den Hergang der Sache. Durch den Sturz vom Elephanten seiner Besinnung beraubt, erwachte er wieder auf dem Rücken der Tigrin, als diese mit ihm durch das Dickicht enteilte und Dorngebüsche und bestachelte Kräuter ihm Gesicht und Hände zerfleischten. Er erkannte seine Lage, hatte soviel Besinnung an die Pistolen in seinem Gürtel zu denken, aber lange Anstrengung kostete ihm die kleine Bewegung, um die Mordgewehre zu erlangen, da der Verlust des aus der Wunde über den Rachen der Tigrin herabströmenden Blutes ihn so bedeutend geschwächt hatte, daß er nur durch wiederholtes Bestreben, erzeugt durch die Kraft des ernstesten Entschlusses, wie die Nothwendigkeit ihn herbeiführte, sich endlich in den Stand gesetzt sah, einen Schuß auf den Kopf des Thieres loszubrennen. Der Erfolg davon war leider nur der, daß der Tiger mit den Kiefern einen tüchtigen Ruck that, noch tiefer in die Wunde hineinbiß und seine Sprünge beschleunigte. Seine Besinnungslosigkeit kehrte wieder da er sich selbst verloren gab, nach einigen Minuten siegte indessen die wiederdämmernde Hoffnung über die gesunkenen Kräfte, er ermannte sich so weit um das zweite Pistol zu erlangen, setzte dies dem Thiere unter dem Schulterblatt auf, und versuchte so dessen Herz zu treffen. Der Schuß hatte kräftige Wirkung, das Thier stürzte sogleich nieder und er verfiel von neuem in Ohnmacht. So hatten ihn die Freunde gefunden und bei fortgesetzter Pflege genas er, nur mit einem lahmen Beine die seltene Erfahrung und Rettung aus so großer Lebensgefahr verbüßend.

Johnson erzählt einen andern, unglücklich abgelaufenen Fall. Ein alter muhamedanischer Priester befand sich einige Meilen von Cittrah um Mittag auf einer Reise zu Pferde und sein Sohn ging ihm zur Seite zu Fuß. Bald hörten sie in ihrer Nähe das Gebrüll eines Tigers und als der Sohn den Vater erinnerte schärfer zu traben, fährt der alte Mann fort ruhig im Schritte zu reiten und bemerkt mit aller einem guten Muselmanne eigenthümlichen Ruhe: „ich sehe da keine Gefahr, uns wird der Tiger nichts thun" er sagte nun seine Gebete her und rufte den Allah an. Indessen schon während dieser Andacht kam der Tiger heran, riß ihn vom Pferde herab und schleppte ihn in eiligen Sprüngen über die Straße davon. Der Sohn lief so schnell er konnte hinterher und hieb das Thier mit dem Säbel. Der Tiger ließ hierauf den Vater los, packte den Sohn an und lief mit diesem davon, ohne daß man jemals wieder etwas von ihm gehört hat. Den Priester brachte man nach Chittrah zur Verpflegung, indessen starb er noch denselben Tag an seinen Wunden.

Auch bei den Märschen der englischen Cavallerie sind Beispiele vorgekommen, daß plötzlich hervorspringende Tiger einen einzelnen Mann aus den Reihen heraus vom Pferde gerissen und mit ihm davon geeilt sind. Daß auch das Feuer den hungrigen Tiger nicht abhält, beweist das bekannte Schicksal von Monro. Derselbe befand sich im Jahre 1792, auf der Insel Sangor im Ganges auf der Jagd in Gesellschaft mehrerer Freunde. Sie saßen im Schatten eines Gebüsches um ein Feuer. Plötzlich hört man das Brüllen eines Tigers, der auch in demselben Momente schon herbeispringt, Monro packt und aus der Gesellschaft seiner Freunde vom Feuer wegschleppt. Alle schießen nach dem Thiere und nach kurzer Zeit kommt auch Monro wieder zurück, da das Thier erlegt worden, indessen starb ersterer noch denselben Tag an seinen Wunden. Auch John-

Digitized by Google

son's eigner Diener, Namens Dilder wurde auf einer Jagdreise durch einen plötzlich hervorbrechenden Tiger bei dem Schenkel gefaßt und den Kopf auf der Erde schleifend über eine englische Meile weit fortgeschleift, wo man ihn endlich halb aufgefressen fand. Der Tiger scheint sich zur gewöhnlichen Portion der Hälfte eines Menschen oder eines großen Thieres zu bedienen, denn die andere Hälfte findet man gewöhnlich bei dem gesättigten Thiere.

Der Schakal folgt auch dem Tiger so wie dem Löwen nach, um an solchen Ueberbleibseln des Mahles sich zu laben, gewiß nicht um ihn zu bewachen, zu warnen oder zu schützen, wie wohl die Fabel gesagt hat. Doch sollen Schakals sich vereinen, ihm den Raub zuzutreiben, das heißt wohl, was sie für sich jagten, mußten sie dem stärkeren Tiger überlassen, und warten dann ab, bis er sich gesättigt hat, um ihren Lohn sich zu holen.

Das Alter des Tigers scheint sich auf zwanzig und einige Jahre zu belaufen. Die Indier glauben nach ihren Grundsätzen einer Seelenwanderung, daß die Seelen der bösesten Menschen in ihn gebannt werden. In der Gefangenschaft ist er denselben Krankheiten unterworfen wie der Löwe.

Der Schaden, den der Tiger anrichtet, ergiebt sich aus obigem, daher man immer darauf bedacht ist, vor ihm sich zu schützen oder ihn zu verfolgen. Die Bewohner der Thibetanischen Gebirge sollen den Tiger durch den Geruch des Knoblauchs vertreiben, indem sie Zwiebeln dieses Gewächses zerquetscht in Beuteln an ihren Häusern aufhängen. So erzählte man Pallas. Lebendig fängt man ihn in Gruben und Schlingen wie den Löwen, vorzüglich sucht man sich der Jungen zu bemächtigen, während die Mutter auf Raub ausgehend, die Höhle verlassen. Die Jagden der Tiger wurden schon oben geschildert.

Der Nutzen des Tigers ist im Verhältniß zu seinem Schaden sehr gering. Felle von den großen Tigern von Sumatra und vom Continente Ostindiens gehören allerdings unter die schönsten Thierhäute welche es giebt und machen in den Häusern der wohlhabenden Chinesen eine gewöhnliche Zierde aus. Die Bucharen bringen sie auch häufig nach Rußland, indessen scheinen die europäischen Kürschner die Felle der Unzen, Panther und Leoparden höher zu schätzen. Bei den Kirgisen wird eine schöne Tigerhaut einem guten Pferde gleichgeachtet. Sie überziehen damit ihren Brustharnisch, der aus Ringen zusammengesetzt ist. Gewöhnlicher bedient man sich der Häute in Europa zu Pferde- und Schlittendecken. Zu ersterem Zwecke werden sie auch häufig in Persien verbraucht, in China überzieht man damit Polster, Sänften und Wagen, in Polen geben sie ein Pelzfutter für Kleider ab. — Das Fleisch wird nach der Versicherung von Saar (ostindischer Kriegsdienst S. 18) bisweilen gegessen.

Abbildung. Viele existirende, mit dem Namen Tiger bezeichnete Abbildungen, gehören zu folgenden Arten, die des wahren Tigers sind nicht zahlreich und die älteren, auch neuere, sind sehr schlecht. Unter den wenigen besseren neueren findet sich leider sogar eine mit falschen Katzenaugen, mit langer Pupille. Die Zeichnung für die unsrige ist von dem berühmten Thomas Landseer in London gearbeitet und stellt zwei Tiger dar, wie sie im höchsten Affect begriffen, einander die Beute (ein Schmalthier vom ostindischen Hirsch) streitig zu machen bereit sind. Ein höchst gelungenes, überaus naturgetreues Bild.

Digitized by Google

4. Der Löwen-Tiger-Bastard. Felis leo × tigris.

Französisch: métis de lion et de tigresse. — Englisch: lion-tiger cubs.

Kennzeichen der Bastarde vertheilen sich zwischen die der Aeltern und sind vergleichsweise mit diesen zu bestimmen. Gegenwärtige haben vom Löwen: den etwas plumpen Bau und großen Kopf, auch ziemlich die Grundfarbe; vom Tiger: den Mangel der Schwanzquaste und Mähne, die wenigstens theilweise bleibenden schwärzlichen Streifen des Felles.

Griffiths sagt in seinem Werke über das Thierreich (Animal Kingdom. II. 1827) folgendes über diese Mittelgeschöpfe.

„Der junge Löwe kann den unerfahrenen Beobachter in Hinsicht seiner Bestimmung täuschen, denn er kömmt mit einem quergestreiften Felle zur Welt und jener wird eher geneigt seyn, ihn für einen jungen Tiger zu halten. In dieser Beziehung kommen unsere jungen Bastarde den Jungen des Löwen sehr nahe. Bei dem jungen Löwen verschwinden aber diese Streifen sehr bald gänzlich, bei unsern Thieren sind sie auch späterhin (wenigstens zum Theil) bleibend, so daß sie in dieser Hinsicht dem Tiger ähnlicher werden. Die Mähne fehlt unsern Bastards, ebenso die Schwanzquaste gänzlich. Ihr Pelz ist mehr schlaff wollig, das äußere Ohr hängt anfangs auch etwas, indem seine Spitze umgebogen ist. Die Klauen sind beständig ausgestreckt, nicht wie bei den Alten in die Scheide zurückgezogen, ebenso ist es auch bei neugeborenen Löwen. Die Farbe ist schmuziggelb oder wollweißlich, von der Nase aus, vom Oberkopfe, vom Rücken und der Oberseite des Schwanzes verläuft eine dunklere Färbung und an diesen Stellen befinden sich die stärkeren, schwärzlichen Querstreifen, der Vorderkopf hat dunkle Fleckchen, deren auch verloschene hier und da auf dem Körper vorkommen. Der Umriß des Kopfes gleicht mehr dem des Löwen, die übrige Oberfläche des Leibes und alles übrige scheint mehr nach dem Bilde der Tigrin geschaffen."

Es dürfte die Paarung zwischen Löwen und Tigrinnen schon früherhin in England statt gefunden haben, indessen fehlt es an sorgfältigen Aufzeichnungen darüber, so wie an Abbildungen jener Bastarde, welche vielleicht nur kurze Zeit lebten. Erst in der neuesten Zeit beachtete man diese Umstände genauer. Der berühmte Thierbändiger Atkins erzog einen schönen Löwen, den wir auf unserer Vignette im Hintergrunde schlafend erblicken. Es ist wichtig zu bemerken, daß die eigenthümliche Wildheit, welche wir bei dergleichen Thieren als erblich anzusehen geneigt sind, bei diesem Löwen durch eine außerordentliche Sanftmuth und Gelehrigkeit vertreten wurde, welche mit der Schönheit seines Aeußeren übereinstimmte. Er war eben vier Jahre alt, als Mr. Atkins eine ebenfalls sehr schöne Tigrin von gleichem Alter erhielt, die sich so wie der Löwe durch einen edlen Anstand so wie durch Milde im Betragen auszeichnete. Sie schien gleichfalls sehr jung eingefangen und bei guter Behandlung aufgezogen worden zu seyn. Beide Thiere wurden in einem und demselben Gemach zusammenlogirt und als Resultat dieser Vereinigung gebar die Tigrin am 17. October 1824 zu Windsor drei junge Bastarde. Sie gab von der Stunde der Geburt an die heftigsten und entschiedensten Zeichen eines schmerzhaften Zustandes zu erkennen, weshalb man die Jungen unmittelbar nach der Geburt von ihr entfernte und dieselben anfangs durch einige Hündinnen und durch eine Ziege ernährte. Sie gediehen vortrefflich und der Berichterstatter sah sie in einem Alter von vier oder fünf Jahren bei bester Gesundheit.

Digitized by Google

Am 31. Deember 1828 erfolgte eine abermalige Geburt von zwei ähnlichen Bastards welche dann in London gezeigt wurden. Von einer späteren Geburt kam auch ein Thier dieser Art während der Ostermesse dieses Jahres (1834) nach Leipzig. Dies Exemplar bewies den Umstand, daß Bastarde von gleichen Aeltern unter sich selbst weniger gleich sind, sondern in dem Grade der Hinneigung zu einem der beiden Aeltern von einander abweichen. Das dortige Exemplar hatte eine graugelbliche Löwenfarbe, Nase und Wangen zogen so wie der Rücken ins Bräunliche, die Stirne hatte kleine dunkle Fleckchen, nur die Hinterbeine waren mit einigen schwarzen Halbringen umgeben und der Schwanz hatte von der Mitte aus sieben schwärzliche Ringe und eine dunklere schwarze Spitze.

Unsere Darstellung bietet ein treues Bild des friedlichen Besammenseins dieser merkwürdigen Thiere. Im Hintergrunde schlummert der Löwe mit ausgestreckten Gliedern, die Gruppe des Familienbildes nach beiden Enden begrenzend, den Mittelraum erfüllt die Tigrin, in der Sanftmuth einer zärtlichen Mutterliebe dem Spiele mit einem ihrer jetzt drei Monate alten Jungen ergeben, welches muthwillig an den Kopf der schönen Mutter sich anschmiegt, während ein zweites auf seine Ernährung bedacht scheint und das dritte halb unter dem Leibe der Aeltern verborgen, den vordern Körper emporhebt, einem entfernten Geräusche, wie es scheint, seine Aufmerksamkeit zuwendend. In ihm ist unverkennbar die Physiognomie des Vaters wieder zu finden und schließt diese herrliche Gruppe durch eine Harmonie in welcher sie das hohe Kunstgefühl des gediegensten Meisters beurkundet. Das Ganze zeigt überhaupt wie es uns scheint, eine höchst reine und edle Auffassung der Natur und — mögen wir dabei die schlummernde Gewalt des alten Löwen, das Bewußtseyn seiner Kraft welches ihn auch im Schlafe nicht verließ, oder die mütterliche Hingebung der Tigrin, oder endlich die verschiedenen Triebe der Jungen, das Verlangen nach Muttermilch, das katzenähnliche Schmeicheln oder die sich entwickelnde Kraft und den aufwachenden Muth noch weiter verfolgen — so liegt in der Darstellung eine Mimik verborgen, welche das Nachdenken auf das angenehmste beschäftigt und an die Leistungen der alten Griechen erinnert.

Nachträglich mag hier noch erwähnt werden, daß der S. 16 unten erwähnte

Löwe ohne Mähne

auch nach neueren Nachrichten wirklich zu existiren scheint. Olivier sah auf seiner Reise im Orient zu Bagdad ein Thier dieser Gattung, welches jene Eigenthümlichkeit hatte, und aus Arabien dorthin gebracht war. In einer der letzten Sitzungen der zoologischen Gesellschaft zu London zeigte der Kapitän Walter Smee die Häute eines Löwen und einer Löwin aus Guzarat, von denen das Männchen sich durch den Mangel der Mähne auszeichnete. Zwischen dem Halse und Rücken zeigten sich nur wenige längere Haare wie bei dem Cheetah oder der Felis jubata (unser Nro. 17), und an Backen, so wie zwischen den Vorderschenkeln, ein langes, wenig dichtes, seidenartiges Haar. Es ist dieß wenigstens eine Varietät, die Herr Smee Felis leo var. Guzaratensis zu nennen vorschlägt. Das Männchen hatte, mit Inbegriff des Schwanzes eine Länge von 8 Fuß 9 ½ Zoll engl. Maaß, und wog ohne die Eingeweide, 225 Kilogrammen. Dieser Löwe bewohnt Guzarat in einer Ausdehnung von 40 Meilen, wo er, wegen seiner Farbe, unter dem Namen Onthiu bacca (gelber Tiger) bekannt ist. In der heißen Jahreszeit findet er sich in den kleinen Gebüschen und bewaldeten Ebenen, welche die

Digitized by Google

Flüsse Gombermutty und Bhartar begrenzen, von Ahmedabad bis zu den Grenzen von Cutsch. Er thut den Heerden großen Schaden, fällt aber den Menschen nicht an. Wird er durch eine Kugel verwundet, so zeigt er sehr viel Muth, und ist bereit Jedem Widerstand zu leisten, der ihn angreift, oder er zieht sich langsam und mit Würde zurück. Sein Schweif ist kürzer als der des gemeinen Löwen; aber der Haarbüschel am Ende desselben ist schwarz und weit stärker. Nach der Aussage eines englischen Offiziers in persischen Diensten giebt es auch in Persien Löwen ohne Mähne, welche die Wälder von Mazanderan und Ghilan bewohnen, und denen gleichen, welche auf den Ruinen von Istachr, die man gewöhnlich für die Ruinen von Persepolis hält, vorgestellt sind. Ihrer Eigenthümlichkeit wegen hat man sie für Thiere einer andern Gattung genommen. Die Nähe von Persien, Guzurat und Arabien läßt vermuthen, daß der mähnenlose Löwe dieser drei Länder die nemliche Varietät ist. Es bleibt noch zu untersuchen, ob, nach den Vermuthungen des Kapitän Hamilton Smith, eine neue Spezies des Katzengeschlechts, die größer als der ungemähnte Löwe, deren Haut und Kinnladen durch Professor Kretscher aus Nubien sollen eingesandt worden seyn, einerlei mit dem Löwen ohne Mähne sey, der auf den egyptischen Monumenten vorkommt, oder ob sich dieses merkwürdige Thier noch an einem vierten Orte findet.

5. Der Jaguar, amerikanische Unze. Felis Onça Linn.

Französisch: le Jaguar, l'Onçe d' Amérique. — Brasil. portugiesisch: Onça pintada. — Brasilisch: Jaguara Marcon. Yaguaréte Azara. — Botokudisch: Oupa, rack-gipakiü, d. h. große Katze. — Malaisch: Jö. — Maconisch: Cumang. — Camaconisch: Jackederé. — Wird auch brasilianischer Tiger, brasilianischer Panther und von den Rauchhändlern großer Panther genannt.

Kennzeichen der Art. Das Fell ist rothgelbbraun mit schwarzen Ringen, deren an jeder Seite nur etwa vier Längsreihen stehen, unterseits weiß, schwarz gefleckt.

Beschreibung. Der Jaguar ist nächst dem Tiger die größte bekannte Katzenart, ja nach den Aussagen der in dessen Vaterlande Reisenden, sollen vollkommen ausgewachsene Individuen dem Königstiger an Größe nicht nachstehen. Die gewöhnliche Länge beträgt 3—4 Fuß, der Schwanz hat kaum zwei Fuß Länge, ist im Vergleich mit den benachbarten Arten kürzer, denn er hat noch nicht die halbe Länge des Leibes. Prinz Maximilian Neuwied beschreibt eine Jaguarhaut von 4 Fuß 10½ Zoll und sagt, daß diese noch nicht zu den größten gehöre, der Schwanz an derselben war 2 Fuß lang. Farbe und Zeichnung geben dem Thiere ein überaus schönes Ansehen, erstere ist ein lebhaftes Rothgelbbraun, welches nach der Unterseite in reines Weiß übergeht, wovon Schnauze, inneres Ohr, Kehle, Unterhals, Brust, Bauch und Innenseite der Füße überzogen sind. Die Zeichnung besteht aus großen schwarzen geschlossenen Ringen auf dem rothgelbbraunen Grunde, welche größer sind als die Fleckenringe bei den ähnlich gezeichneten Arten, so daß vom Rücken aus nach dem Bauche hin abwärts nur vier solcher Ringe gezählt werden können, wovon mehrere in ihrer Mitte pupillenartig einen, auch wohl zwei kleine schwarze Fleckchen haben, der Raum innerhalb der Ringe ist aber übrigens gleichfarbig mit dem Grunde. Nach dem Rücken und Bauch hin geht die Zeichnung in einfache und unregelmäßige abnehmend kleinerwerdende, schwarze einfache Flecken und einzelne Streifen, davon besonders am Unterhals einige quer laufen, aber die kleinsten, punktartigen Flecken finden sich in braunem Grunde auf der Stirn und an den Füßen. Auch der Schwanz ist nur gefleckt bis zur Ausdehnung einiger Halbringe, sonst nicht eigentlich geringelt und die Spitze ist ganz schwarz. Das Ohr ist außen

Digitized by Google

schwarz, mit weißem Fleck an der Basis, innen weißlich, der Maulwinkel schwarz. Das Haar ist durchaus kurz und glatt anliegend, fast glänzend, am Bauche nur wenig länger, ohne zottig zu seyn. Der ganze Leib ist kräftiger und stärker, und kräftiger gebaut als bei den folgenden Arten und vollkommen entsprechen diesem Bau die Glieder. Die sehr scharfspitzigen hakenförmig gebogenen, von der Seite flachgedrückten Klauen haben eine hornartig grünlich-weißliche Farbe.

Abänderungen in Farbe und Zeichnung kommen nicht selten vor, indem erstere mehr oder minder lebhaft erscheint, auch dunkler gefunden wird, ja sogar in Schwarz übergeht, auf welchem dann die Ringe nur noch dunkler abstechen. Dieser schwarze Jaguar wurde von einigen Schriftstellern für eine eigene Art gehalten, allein vorzüglich durch die Erfahrungen des Herrn Prof. Reinwardt, daß schwarze Leoparden mit bunten in demselben Wurfe geboren werden, wurde man auf die Erscheinung der schwarzen großen Katzen aufmerksamer und hält sie jetzt allgemein nur für individuelle Abweichungen (aberrationes, nicht Abarten oder varietates). Die Eingebornen und in Südamerika lebenden Portugiesen bezeichnen diesen schwarzen Jaguar mit dem Namen: Jaguara, Onça preta, die Botokuden: Capurack him, die Camacaner: Jaké-hya. Die Ringe und Flecken haben aber auch bei der gewöhnlichen Grundfarbe nicht immer dieselbe Gestaltung. A. v. Humboldt redet auch von ganz weißen Abänderungen dieses Thieres, über welches der Prinz Maximilian Neuwied keine Nachrichten einziehen konnte, allein im Sertong von Bahia, zu Vareda sah er ein Fell eines kleinen Jaguars mit dichter stehenden Flecken, welches von einem Thiere mit dickerem Kopfe und stärkeren Gliedern herrühren sollte, man nannte es Cangassú, jedoch bezeichnet man in anderen Gegenden auf dieselbe Weise auch den großen Jaguar, den wieder andere Popé nennen, und über die specifische Verschiedenheit jenes kleinen Thieres ließ sich noch keine Gewißheit erlangen.

Das Vaterland des Jaguars, den wir oft unter dem Namen des Panthers in unsern Menagerien zu sehen Gelegenheit haben, ist das südliche Amerika in großer Ausdehnung, von Guiana aus südlich bis unter Paraguay herab, in Brasilien überall da wo die Cultur die Waldungen noch nicht urbar gemacht hat, also bei weitem in den ausgedehntesten Districten. Zuverlässige Männer versicherten den Prinzen Maximilian N. W., daß sie in der Zeit der Gründung ihrer Niederlassungen oder Pflanzungen mit ihren Jagdhunden zwanzig bis ein und zwanzig solcher Thiere in einem Monate aufgefunden und erlegt hätten, bald aber nahm die Zahl ab und man konnte nun erst daran denken, die jetzt in jenen Gegenden so blühende Rindviehzucht einzuführen. Gegenwärtig zeigt er sich seltener in den bewohnten Gegenden, in denen man ihn auch kein hohes Alter erreichen läßt. Größer und furchtbarer erwächst er aber an den Ufern des Orenoco, wo es scheint, daß man ihn auch noch mit weniger Glück zu jagen versteht.

Lebensweise und Eigenheiten. Der Ausdruck des Gesichts deutet auf eine sehr vollendete Katzennatur, die lebhaften Augen mit runder Pupille bestimmen das Thier zum Tagwachen, leuchten indessen zur Nachtzeit, in welcher der Jaguar nicht weniger thätig ist, obwol er nur in der Dämmerung noch ein scharfes Gesicht hat. Der Geruch ist bei den Katzenthieren überhaupt nicht eben vorzüglich, aber sie haben ein sehr feines Gehör. Der Jaguar lebt einsam in seinem Reviere, lagert sich im Dickicht an den Rändern der ungeheuren Urwälder, vorzüglich gern an den Ufern der Ströme und Flüsse (man vergleiche unsere Abbildung) zwischen den hohen Gräsern, welche die

Digitized by Google

sumpfigen Stellen der Ufer umwachsen. In diesen hält er sein Lager und in der Morgen- und Abenddämmerung, so wie in mondhellen Nächten geht er auf seinen Raub aus. Sobald die Sonne höher steigt, begiebt er sich wieder in ein ähnliches Lager wo er ausruht. Er richtet seine Jagd hauptsächlich auf die wilden Pferde der Pampa's, wie Southey berichtet, ferner auf Hirsche, Rehe Affen, Aguti's, Kapybara's, wilde Schweine, frißt aber auch Schildkröten und Stachelthiere. In Ermangelung jener größeren Geschöpfe nimmt er auch mit kleineren, mit Ratten, Wasservögeln und Fischen vorlieb, welche letztere er am Wasser lauschend und deren Züge beobachtend, durch einen behenden Schlag mit der Tatze recht geschickt herauszuholen weiß, nachdem er sie durch Tropfen seines Speichels, welche er in das Wasser hinabfallen läßt, angelockt hat. Wo ihm Wild fehlt, streift er in die bewohnten Gegenden und holt sich Stücke aus den Viehheerden heraus. Hier sucht er sich am liebsten Kälber und Fohlen zu verschaffen; Ochsen und Kühe vertheidigen sich heftig gegen ihn und erstere erwarten muthig seinen Angriff. Dagegen werden ihm die Pferde und Maulesel weit öfter zur Beute, denn diese Thiere sind weit furchtsamer vor Raubthieren, wie uns aus der Geschichte des Löwen und Tigers schon bekannt ist. Sie wittern auch den Jaguar schon aus der Ferne, stampfen und schnauben und fliehen wenn sie frei sind. Die Art und Weise wie er sich seines Raubes bemächtigt, ist dieselbe wie bei dem Tiger, auch er tödtet durchaus nur wenn er Nahrung bedarf und bemächtigt sich des Raubes wie der Tiger durch weite Sprünge, reißt mit der Tatze die Halsadern auf, saugt das Blut aus, schleppt den Raub, selbst Pferde weite Strecken fort in das Dickicht und frißt ihn an. Er lagert sich nach der Mahlzeit zur Ruhe, bleibt in der Nähe höchstens von einer Viertelstunde und kehrt oft am andern Morgen dahin zurück, öfter aber nicht, da er kein Aas frißt. Prinz Maximilian N. W. fand häufig in Brasiliens Waldungen die Panzer der großen Landschildkröte (Testudo tabulata) vom Jaguar gänzlich ausgefressen, so daß er sich wahrscheinlich auch hier der Klauen zum Herausholen des Thieres bedient hatte. — Wo sich in der Nähe von Viehständen ein Jaguar aufhält, rottet sich das Rindvieh zur Nachtzeit, sobald es von ihm Witterung hat, zusammen, und brüllt unaufhörlich. Die Paarungszeit fällt in den August und September. Die Paare halten sich dann zusammen und werden dem Menschen höchst gefährlich, da sie auch die Gefahr des Kampfes mit einander theilen und mit Wuth einander gegenseitig beschützen. Unaufhörliches, weit durch die Wälder hintönendes Schreien, verkündet wie bei den Hauskatzen, die Zeit der Begattung. Das Weibchen trägt nahe an vier Monate, dann wirft es in unzugänglichem Dickicht zwei bis drei, seltener nur ein einzelnes Junges, von denen man sagt, sie würden blind geboren. Das Lager findet sich unter den sich eigenthümlich oberhalb des Bodens erhebenden und ausspreitzenden Wurzeln der Bäume des Urwaldes. Die Jungen werden wie bei den Hauskatzen im Maule fortgetragen wenn es Noth thut und wer sich ihnen genähert hat, wird von der wüthenden Mutter mit Brüllen bis in die weite Ferne verfolgt. Nach fünf bis sechs Wochen sind die Jungen so groß als die größten unserer Hauskatzen und jetzt beginnt die Mutter mit ihnen herumzustreifen und lehrt sie die Jagd auf kleinere Thiere. Die jungen Jaguare welche man als Säuglinge dennoch erlangt und aufzieht, haben noch ein längeres, weicheres, fast wolliges Haar und weniger deutlich bestimmt sind die Umrisse der Flecken. Sie benehmen sich wie junge Katzen, spielen so wie diese auch mit den Hunden, schmiegen sich an ihre Wärter schmeichelnd an und miauen wenn sie das Bedürfniß der

Digitized by Google

Nahrung empfinden oder sich langweilen, zischen und knurren wenn sie bei dem Fraße gestört werden. Wasser bedürfen sie viel zum Saufen, sie lecken es mit der Zunge wie die Katzen. Nach einer Sättigung werden sie träge und spielen ohne in Zorn zu gerathen. Man legt sie in Hofräumen mittelst eines Halsbandes und ledernen Seiles an einen Baum an. Ihren stinkenden Auswurf verscharren sie, wie die Katze zu thun pflegt. Das Ausathmen der Thiere verbreitet den üblen Geruch, den wir bei den meisten fleischfressenden Thieren zu bemerken gewohnt sind. Im dritten Jahre wird der so aufgezogene Jaguar böse und sein Schicksal ist dann gewöhnlich das festere Einkerkern in den Menagerien Europa's.

In Beziehung auf den Menschen benimmt sich der Jaguar ganz so wie seine Verwandten. In den unbewohnten Distrikten flieht er den selten sich zeigenden Menschen, aber in der Nähe menschlicher Wohnungen gewöhnt er sich an den Anblick desselben und wenn er hungrig ist und anderer Beute entbehrt, fällt er ihn an, wobei er auch wieder die Neger und Mulatten, wahrscheinlich der starkriechenden Athmosphäre folgend, den weißen vorzieht, so daß diese in Gesellschaft von jenen sicherer sind. Der Anfall geschieht aber so plötzlich, daß nur selten die augenblickliche Entschlossenheit zu retten vermag, denn kaum behält man Zeit das Gewehr auf ihn abzufeuern. Ob hier die Geistesgegenwart das Ziel noch richtig ins Auge faßt und trifft, entscheidet über Leben und Tod. Eben so schnell zieht er sich auch in andern Fällen wieder zurück. Sonnini erzählt, daß er mit seinen Leuten in Guiana zwei Nächte hintereinander von einem Jaguar beunruhigt wurde, der aber so plötzlich erschien und so schnell sich wieder zurückzog, daß sie alle nicht im Stande waren, ihn mit einem Schuße zu begrüßen. Einen andern Fall erzählt A. v. Humboldt. Zwei Indianerkinder, ein Knabe von neun und ein Mädchen von sieben Jahren vergnügten sich in der Umgebung eines Dorfes, als um zwei Uhr Nachmittags ein großer Jaguar aus dem Walde auf sie zukömmt, ganz nahe an sie herantritt, den Kopf niederbeugt, einen Katzenbuckel macht und Lust bezeigt mit den Kindern zu spielen. Jetzt tritt er mit dem Knaben, sich an ihn anschmeichelnd zusammen und jener wird eben erst gewahr, welche Gefahr ihm drohe, als der Jaguar ihm mit seiner Tatze einen Kratz auf den Kopf gibt, daß das Blut kömmt, worüber das kleine Mädchen heftig erzürnt, mit einer Ruthe in der Hand, nach ihm schlägt. Der Jaguar hatte sich hierauf bereits wieder zum Rückzuge herumgedreht, als die Indianer auf das Geschrei der Kinder herbeieilten. A. v. Humboldt sahe noch die Narben, welche der Knabe von den Kratzwunden auf dem Kopfe behielt. Der Jaguar schwimmt auch gut, steigt auf seinen Streifereien in die Schiffe und Kähne um sich Menschen oder Hausthiere zu holen. Er hält während des Schwimmens den Kopf über dem Wasser und schwimmt über die breitesten Ströme. Sobald er am Ufer das Wasser verlassen hat, sieht er sich um, schüttelt sich wie ein Hund und reinigt dann auch jede einzelne Pfote indem er sie rüttelt und abschüttelt. Wenn auch nur mit einer einzigen Klaue sich einhakend, schwingt er den geschmeidigen Körper in einen Kahn und geht unerschrocken auf die Mannschaft los. Nach Rengger's*) Erzählung feuerten Schiffer auf einen schwimmenden Jaguar in der Entfernung von nur etwa 5—6 Fuß. Dieser wurde verwundet, hakte sich am Rande des Kahns an und sprang ungeachtet der Ruder- und Kolbenschläge mit denen die Mannschaft ihn zu bewillkommen für gut

*) Rengger Naturgeschichte der Säugthiere von Paraguay. 8. Basel 1830. bei Schweighauser.

Digitized by Google

fand, so kräftig in denselben hinein, daß endlich diese selbst dem unerschrockenen Thiere wich, ins Wasser sprang und sich an das Land rettete. Der Jaguar selbst betrachtete sich nun als den Herrn des Kahns, setzte sich auf demselben gemüthlich nieder und ließ sich von der Strömung des Wassers dahinführen bis andere Jäger ihn abermals angriffen und nun er wieder ins Wasser hinabsprang, und wie die frühere Mannschaft, am Ufer sein neues Asyl fand.

Zur Jagd auf dieses Thier gehören wenigstens sechs tüchtige Hunde. Diesen gelingt es gewöhnlich den Jaguar in den Urwäldern in denen er haust, auf einen Baum zu treiben, von dem ihn dann der Jäger herabschießt. Weniger als drei Mann wagen nicht auf den Jaguar auszugehen, von ihnen trägt einer eine Lanze, ein anderer eine zweizinkige Gabel, wie Ofengabel, 5 Fuß lang, denn man muß immer gewärtig sein, daß das Thier nach einen Fehlschuß den Jäger angreift, was nach Art der Bären im aufgerichteten Zustande geschieht, in diesem Moment wird es nun mit jenen Instrumenten empfangen und durch geschickt angebrachte Stiche verwundet. Letztres muß gewöhnlich mehrmals wiederholt werden, daher diese Waffen nach angebrachtem Stiche schnell wieder zurückgezogen werden, auch kann der Lanzenstich nur von der Seite gelingen, da er von vorn auf der hochgewölbten Brust abgleitet. Zuweilen zerbricht er mit einem Schlage oder durch eine Wendung die Lanze, wodurch die Gefahr für die Schützen sich bedeutend vergrößert. So lange der Jaguar noch unverwundet ist, können kaum zwanzig Hetzhunde ihn überwältigen, da er mit unglaublicher Gewandtheit sich von diesen Feinden befreit, im Augenblick bricht er einem das Genick, einem andern das Rückgrath, einem dritten reißt er den Bauch auf und die übrigen treibt er von sich. Dessenungeachtet wagt der kühne Mensch in einer gefahrvollen Jagd auch allein den Angriff auf ihn. Der Jäger wickelt sich ein Schaaffell um den linken Arm, bindet es fest und naht sich dem Thiere das er zum Kampfe herausforderte und durch seinen Angriff reizt, der Jaguar springt wüthend in großen Sätzen auf ihn zu, richtet sich auf und empfängt ihn brüllend mit offnem Rachen. Der Jäger beut ihm nun den geschützten Arm und sticht ihm mit der rechten Hand zu gleicher Zeit das ellenlange Waldmesser in das Herz. Das Thier stürzt nieder und die Hunde beginnen jetzt ihren Kampf. Steht es wieder auf, so wiederholt sich das ganze Mannöver. Auf Paraguay erlegte ein einziger Mann auf diese Weise mehr als hundert Stück dieser Thiere, bevor er, was im J. 1821 geschah, in diesem Kampfe sein Leben verlor. Die Jagd mit der Keule, womit man sich bemüht ihnen das Rückrath zu zerschlagen ist gefährlich, sicherer dagegen ist der Wurf mit der Schlinge welche man an einer langen Stange in einer Kerbe befestigt, ihm, während er sich auf einen Baum gelagert, um den Hals legt. Man reißt ihn dann herab und bringt noch mehrere Schlingen um die Beine. Die Jäger sprengen dann in entgegengesetzter Richtung fort, wodurch er erwürgt wird.

Wie zahlreich diese Thiere vor Einführung europäischer Cultur gewesen sind, ist schon oben angedeutet worden, man hat in den spanischen Colonien eine Zeit lang alljährlich 4000 Stück getödtet und 2000 kamen allein jährlich aus Buenos Ayres. Die Wunden welche der Jaguar durch seine furchtbaren Zähne und Klauen veranlaßt, sind mit vieler Gefahr verknüpft. Meist folgt bald Starrkrampf und Tod.

Das schöne Fell kann so benutzt werden, wie das des Tigers, hat indessen nur wenig Werth.

Unsere Abbildung stellt den Jaguar dar, wie er im Schilfe im Hinterhalte

Digitized by Google

liegt. Im Hintergrunde ist eines dieser Thiere im Anfalle auf Kapuzineraffen begriffen, welche erschrocken fliehen und aneinander gegenseitig sich anklammern.

6. Der Panther, Parder. Felis Pardus Linn. Gm. — Weibchen: Pantherthier.

Griechisch: ὁ πάνθηρ, ἡ πάρδαλις, εως, τὸ παρδάλιον. — Lateinisch: pardus, Weibchen: panthera, varia. — Felis panthera Pall. — Französisch: la Panthère, Tigre d' Afrique des fourreurs. — Englisch: the Panther. — Italiänisch: pantéra. — Russisch am Kaukasus: Bars. — Tatarisch: Kaplan. — Georgisch: Wepchi. — In Congo: Engoi. — Gewöhnlich von den in Afrika Reisenden: Leopard genannt. Vgl. No. 7. —

Kennz. der Art: sehr glatt und kurzhaarig, rothgelbbraun, unten weiß, an den Seiten mit in sechs bis sieben Längsreihen stehenden, aus etwa 6—7 schwarzen Fleckchen zusammengesetzten Ringen, deren Innenraum mit dem Felle gleichfarbig ist; Schwanz (aus 28 Wirbeln) so lang als der Leib (mit Ausschluß des Kopfes).

Beschreibung. Der ächte Panther der Alten, den wahrscheinlich schon Aelian und Oppian meinten, als sie unter den ähnlichen Arten eine langgeschwänzte unterschieden, ist von mehreren späteren Schriftstellern wieder verkannt worden, und nur Linnée und unter den neueren der ältere Cuvier scheinen diese Art richtig wieder aufgefaßt zu haben, welche wir nach ihnen als den Panther beibehalten. Dieser erreicht eine Länge von 3—4 Fuß. Georg Cuvier verglich hunderte von Fellen und fand den Kopf 8 Zoll lang, von da an bis zur Schwanzwurzel 3 Fuß 3 Zoll, den Schwanz dritthalb Fuß. Pallas giebt das Maas bei einem Felle das er sahe, bis 5 Fuß 6 Zoll, der Schwanz ist immer so lang, daß er über den Rücken zurückgelegt mit seiner Spitze den Hals berührt, also während des Gehens herabhängend auf der Erde schleift. Die Grundfarbe ist ein schönes Rothgelb, die ganze Unterseite ist weiß. Ueber die Seiten hin ziehen sich etwa sechs Reihen schwarzer Ringe, welche mehr oder weniger dicht beisammenstehend, aus 6—7 schwarzen Fleckchen zusammensetzt sind, so daß man sie mit einer Rose verglichen hat; einige haben auch im Mittelpunkte ein oder zwei schwarze Fleckchen, die Flecken des Kopfes, Rückens, des Schwanzes und der Beine sind kleiner, meist einzeln, nur wenige ringförmig, andre wie kleine Streifen oder rundlich. Der Panther ist demnach sowohl durch die Form der Flecken als vorzüglich durch die Länge des Schwanzes von den beiden benachbarten und noch folgenden Arten, nicht schwer zu unterscheiden, der jüngere Cuvier hat in seinen Abbildungen den Panther als Leoparden und den Leopard als Panther gegeben.

Das Vaterland des Panthers ist Afrika, das westliche Asien bis zum Kaukasus, Armenien und dem Ararat. Es darf kaum bezweifelt werden, daß dieser Panther unter den großen gefleckten Katzen, welche die alten Römer in Menge aus Afrika zu ihren Kampfspielen brachten, zum großen Theile sich befunden habe. Er war damals in Syrien und Kleinasien häufig, heut zu Tage hat seine Zahl sehr abgenommen. Als Cicero als Proconsul in Cilicien residirte, bat ihn sein Freund Coelius ihm eine Heerde dieser Thiere zu seinen Spielen zu senden. Nach Xenophon soll man zu Aristoteles Zeit derselben mehr in Europa gehabt haben als in Asien und Afrika. Probus zeigte deren zweihundert im Circus, von denen die eine Hälfte aus Lybien die andere aus Syrien angelangt war. Unter Pompejus erschienen 410 und unter Augustus 420.

Lebensart, Jagd und Fang. Der Aufenthalt des Panthers kommt mit dem

Digitized by Google

der benachbarten Thiere überein; er hält sich in den Waldungen gern in der Nähe der Flüsse und Sümpfe auf, wo er im Dickicht verborgen, Thiere belauscht, welche zur Tränke gehen. Seine Nahrung besteht in kleinen Waldthieren, Hasen und Affen, vorzüglich stellt er auch den Antilopen nach und raubt zur Nachtzeit Federvieh und Schaafe und junge Rinder aus den Gehöften. Mit Leichtigkeit erklettert er Bäume und fängt sich da Affen und Waldvögel, und sucht wenn er flieht, seine eigne Rettung in den dickbelaubten Zweigen der Gipfel. Er vermeidet es scheu, dem Menschen zu begegnen, indessen wird er furchtbar sobald man ihn in Wuth gebracht hat. Für die Colonisten wird er schon wegen seiner Räubereien der schlimmste Feind. Die wilden Afrikaner halten ihn für ein geheiligtes Thier, daher sie ihn schonen, und ihre Frauen und Kinder werden ihm darum häufig zur Beute. In den Cap-Colonien hat man ihm mehr Achtung eingeflößt, dort greift er die Menschen nie an, außer wenn er gereizt wird. In den ferngelegenen Gegenden ist es indessen nicht selten, daß er bei nächtlicher Weile um die Pachthöfe herumstreift und sein gräßliches Geheul hören läßt. Den hungrigen Panther hält dann auch das Gebell der vielen Hunde, welche auf allen Gehöften gehalten werden, nicht ab, sich den Weg zu den Ställen zu bahnen. Die Colonisten fangen ihn so wie die Hyäne in Gruben und Fallen, letztre aus Holzstücken errichtet. Sobald ihn die Schlinge gefaßt hat, hetzt man die Hunde auf ihn, er unterliegt aber selten ohne drei bis vier Hunden das Genick zerbrochen zu haben. Im Walde gejagt, verbirgt sich das Thier instinctmäßig im Gipfel eines schnell erklommenen Baums. Wer sich einem solchen Baume nähert ohne das Thier sogleich herabzuschießen, läuft Gefahr daß es auf ihn springt und er schwer verwundet oder getödtet wird. Ein Colonist am Kap erzählte folgenden Vorfall, welcher genauen Bekannten von ihm begegnet war.

Zwei Pächter kamen von der Antilopenjagd, stießen in einer Gebirgsschlucht auf einen Panther und begannen sogleich ihn zu jagen. Der Panther suchte anfangs zu entwischen indem er einen Absturz erkletterte, allein von den Jägern beinahe eingeschlossen und bereits durch eine Kugel verwundet, wendet er sich plötzlich um und stürzt sich mit der Wuth welche diesen Thieren, wenn sie gereizt werden, eigenthümlich ist, auf den Jäger der ihn verwundet hatte, reißt ihn vom Pferde, bringt ihm einen rüchtigen Biß an der Schulter bei und zerfleischt ihm mit den Klauen das Gesicht. Der andere Jäger sieht diesen Vorfall, steigt ab und feuert auf das wüthende Thier, das er indessen im Schusse verfehlt. Der Panther verläßt jetzt den angegriffenen und stürzt sich mit einem ungeheuren Sprunge hastig und wüthend auf den zweiten Jäger, wirft ihn mit unglaublicher Schnelligkeit zu Boden und verstümmelt und zerfleischt ihn mit seinen Tatzen und Zähnen, auf die entsetzlichste Weise. Alles geschah in wenigen Augenblicken, und bevor der erstere sich aufzuraffen vermochte um seine Flinte zu ergreifen, waren die beiden Kämpfenden im Handgemenge eine bedeutende Anhöhe hinabgerollt, wo sie den Kampf fortsetzten. Jetzt hat jener wieder geladen und schießt auf den Panther, doch zu spät, das wüthende Thier hatte dem unglücklichen Freunde das Gesicht zerfleischt, die Kehle zerbissen und den Bauch aufgerissen, so daß er unter den furchtbarsten Qualen den Geist aufgab. Sein selbst schwer verwundeter Freund hatte den traurigen Trost, das gleichfalls durch die Jagdmesser schon übel zugerichtete und bereits sich verblutende Thier noch zu erlegen.

Ein andermal verfolgten acht Jäger einen Panther, der nächtlicherweile um ihre Pachthöfe herumgestreift hatte und nachdem sie ihn eine halbe Stunde lang verfolgt

Digitized by Google

hatten, sprang er auf einen Baum, in dessen dicht belaubten Zweigen er ihren Blicken entschwand. Sie umstellen den Baum und suchen das Thier auszuspähen. Ein Neuling in dieser Jagd will sich hervorthun, geht nahe an den Baum heran und bevor noch die andern im Stande sind, ihn durch ihren Ruf zurückzuhalten und die Gefahr zu entfernen, stürzt sich der Panther auf ihn herab und beide wälzen sich bereits mit einander am Boden herum. Alle standen vom Schrecken getroffen und vom herzergreifenden Geschrei welches der angegriffene in der Todesangst ausstieß, tief bewegt, aber dennoch nicht im Stande, auf das Thier zu schießen, in der Furcht den Freund selbst zu durchbohren. Einer wagte es endlich sich zwischen die Kämpfer zu werfen und es gelang ihm mit dem Pistol, in der größten Nähe das Thier in den Kopf zu schießen. Der Jäger vermochte jetzt sich loszureißen, trug aber tiefe Wunden davon und besonders hing ihm der behaarte Theil des Kopfes, den die großen Katzen mit bewundernswürdiger Schnelle sogleich aufreißen, wie Lappen zur Seite herab. In diesem traurigen Zustande wurde er nach Hause getragen und nach drei Monaten war er wieder geheilt, doch mit gräßlichen Narben, welche ihm Zeitlebens als Zeugen seiner Unvorsichtigkeit verblieben.

So furchtbar der Panther im gereizten Zustande ist, so schmeichelnd ist er im gezähmten Zustande als junges Thier, und die ungemein zierlichen Bewegungen der schlanken schöngezeichneten Katze, bieten ein erfreuliches Schauspiel. Springen und Klettern geschieht mit der Behendigkeit des Eichhörnchens und die Stimme wechselt nach den Affecten, welche das Thier durch sie auszudrücken bemüht ist. Von der Jungenliebe des weiblichen Panthers erzählt der blinde Reisende Lieutenant Holmann ein Beispiel. Etwa 80 englische Meilen weit von Sierra Leone wurde das Lager eines Pantherweibchens entdeckt, umstellt und nachdem dasselbe auf Beute ausgegangen, ihm die endlich aufgefundenen zwei Jungen geraubt. Sie waren nicht größer als gewöhnliche Katzen, man steckte sie in einen Sack und brachte sie nach Sierra Leone. Die Mutter fand die Spur, folgte den Räubern ihrer Jungen, wagte aber doch nicht so viele Personen anzugreifen und fuhr fort mehrere Wochen lang um die Stadt herumzustreifen, bis sie die Hoffnung ihre Jungen wieder zu erhalten, endlich aufgab.

Lebendige Panther bringt man oft nach Europa, wo sie gewöhnlich Leoparden genannt werden, deren Felle finden sich häufig bei den Kürschnern unter dem Namen des kleinen Panthers, Pantherthiers, afrikanischen Tigers. Auf den Fellen der jüngeren Thiere sind die Flecken wie bei den ähnlichen Arten, noch weniger ausgeprägt und zerstreuter. Cuvier und Desmoulins sagen, daß am Schwanze nur der letzte Achttheil schwarz sey, und auch dessen Unterseite noch weiß, dann folgen 3—4 weiße Ringe.

Abbildungen sind zum großen Theil nach jungen Thieren gefertigt, unsre Abbildung kann den Typus des Panthers darstellen und drückt zugleich den Charakter des Thieres wunderschön und lebendig aus.

7. Der Leopard. Felis Leopardus Schreb.

Das Wort ist erst im vierten Jahrhundert christl. Zeitr. aufgekommen, es ist zusammengesetzt und bedeutet: Löwenpanther. — Franz.: le leopard. — Engl.: the leopard. — Ital.: il leopardo. —

Kennz. der Art: sehr glatt und kurzhaarig, Grundfarbe blaßgelblich, über den Rücken hin bräunlich, nach unten weiß, längs den Seiten hin laufen in etwa 10 Rei-

Digitized by Google

hen zahlreiche aus etwa 3—4 kleinen schwarzen Fleckchen zusammengesetzte enge Ringe, deren Innenraum rothbraun ist, der Schwanz ist mittelmäßig, hat 22 Wirbel.

Beschreibung. Der eigentliche Leopard wird nur drei, höchstens vierthalb Fuß lang, sein Schwanz höchstens zwei Fuß, berührt also kaum mit der Spitze den Boden. Die Farbe ist oben angegeben, und ist als besonderes Kennzeichen zu betrachten, daß der Raum innerhalb der Ringe dunkler gefärbt, ist als die Fläche des Felles um die Ringe herum, welche sehr blaß, fast weißlich ist. Cuvier und Desmoulins sagen daß der Schwanz am letzten Drittheil schwarz sey, mit 5—6 weißen Seitenringen.

Der Leopard bewohnt die Inseln des indischen Oceans, er haust auf Java, Sumatra, Borneo und Celebes, in Ceylon und China. Wie weit er sich ausbreitet, ist wegen Unbestimmtheit der Angaben ungewiß und ob er sich in Afrika wirklich gefunden oder noch findet, sehr zweifelhaft. Ob daher die Römer ihn gekannt oder unter ihrer Varia nicht vielmehr den Gepard, Nimr und Irbis gemeint haben, dürfte kaum sicher zu entscheiden sein. So viel ist gewiß, daß der Name Leopard erst weit später aufkam, als man der zahlreichen Panther erwähnt fand, welche die Römer aus Afrika brachten, so daß der Panther sogar vorzugsweise auch Africaner genannt wird. Erst im vierten Jahrhunderte fing man an von Leoparden zu sprechen, die man sich ohne einen bestimmten Artbegriff, als Bastarde vom Panther mit der Löwin erzeugt, dachte; ja man wendete das Wort so wenig bestimmt an, daß man den Panther selbst damit bezeichnete. Auch die Giraffe nannte man deßhalb Kamelparder, weil man sie für einen Abkömmling des Panthers und Kameels hielt. Man wird deshalb nur billigen können, wenn die meisten Schriftsteller für das den Alten genauer bekannte Thier aus Afrika, auch den ihm schon von Alters her gegebenen Namen des Panthers beibehielten, und das weniger bekannte mit dem Namen des Leoparden bezeichneten.

In Hinsicht auf Lebensweise, Jagd und Fang, Nutzen und Schaden kommt der Leopard mit dem Panther fast ganz überein.

Unsre Abbildung giebt den Leopard in dem Zustande in welchem er auf der Lauer im Schilf liegt.

8. Der Nimr. Felis Nimr H. E.

Griechisch: nebst No. 6. verstanden unter παρδαλις. — Lateinisch: Pardus? Varia? — In Arabien, Nubien, Habessinien: Nimr. — In Amhara: Nibr, Nader. —

Kennz. und Art. Oben rostfarbig, unten schmuzigweiß, mit zerstreuten schwarzen Ringen und Flecken, Ohren an der Basis und Spitze weiß, in der Mitte mit schwarzem Fleck, oberste Bartborsten schwarz, unterste ganz weiß.

Beschreibung. Der Nimr hat nicht ganz die Größe und fast die Gestalt der beiden vorigen Arten. Ein Fell welches Ehrenberg gemessen hat, hielt 3 Fuß 4 Linien, dessen Kopf 6 Zoll 4 Linien, der Schwanz (verletzt) 1 Fuß, 8 Zoll, 4 Linien. Die Ohren sind ein wenig kürzer als ein Drittheil der Kopflänge. Die Höhe des Thiers beträgt hinten etwa die Hälfte der Körperlänge nnd vorne nicht viel weniger. Das Haar ist auf dem Rücken 4—6 Linien lang und angedrückt, am Bauche dagegen anderthalb Zoll lang, nicht sehr steif, schlaff, immer einfarbig. Die Grundfarbe ist eigentlich blaß gelblich, wie ausgebleicht, unter sehr vielen Fellen sahe Ehrenberg nur eins welches röthlichgelblich war; die Flecken zahlreich, braunschwarz, nach der Mitte

Digitized by Google

der Seiten in Ringe zusammengehäuft auch wohl augenartig, anderwärts nur einfach, die Unterseite ist weißer, deren Flecken schwärzer. Auf den Kopfe sind die Fleckchen weit zahlreicher und kleiner, zerstreut, einige als kleine Streifchen von 6 Lin. Länge und 3 Lin. Breite, dergleichen finden sich 8 größre zwischen den Ohren und 10 kleinere zwischen den Augen, zwischen Ohren und Augen etwa 9. Alle diese Fleckchen sind röthlich und haben weiße Räume zwischen sich, welche wenig größer sind als sie selbst. Auf der Mitte des Scheitels neigen sich die Streifchen gegeneinander und fließen fast in einen Kamm zusammen, was doch an andern Fellen nicht der Fall war. Ueber den Augen schwarzbraune Wimpern. Kinn weiß. Ein breiter schwarzer Fleck am Maulwinkel, ein längerer auf der obern Kinnlade, ein kürzerer auf der untern, deren Spitze weiß ist. Die Schnurren scheinen an der Basis von 3 schwarzbraunen Linien aufgenommen zu werden, die untern derselben sind ganz weiß (also nicht an der Basis schwarz). An der Kehle läuft eine Punktreihe vorn querüber, drei dünne schwarze Querbinden laufen darüber hinaus. Mitten auf dem Nacken bilden schwärzere, schmale Fleckchen zwei fast parallele, unterbrochne Linien. Auf der weißern Brust sind die schwarzen Punkte weniger zahlreich. Die Vorderbeine haben einfache, größere, fast kreisrunde, fast 9 Lin. breite Fleckchen. Auf den Oberschenkeln sind die Fleckchen unbestimmt rosenartig zusammengehäuft, doch nicht so bestimmt als an den Seiten des Leibes. Am Ellenbogen zeigt sich beiderseits ein Augenfleck und ein kleiner einfacher Fleck. An den Seiten laufen 3, 4 bis 5 schwarze halbzöllige Flecken in eine Rose zusammen oder bilden einen Ring, dessen Innenraum rothgelblich ist, die obern halten 1 Zoll 3 Linien, die untern 1 Zoll 10 Linien im Durchmesser. Auf dem Hinterrücken und an den Hinterbacken finden sich dergl. Zeichnungen nicht, sondern die Flecken sind hier zerstreut, größer auf den Hüften, schräge, und 1 Zoll 3 Lin. lang, 8 Lin. breit. Am Unterfuße nehmen die Flecken ab, auf den Zehen sind es nur noch Strichelchen und Punkte. Sieht man vom Schwanze aus gegen den Hinterrücken so sind dessen Farben in 7—8 Parallelreihen zu unterscheiden, deren obere deutlicher, deren untere weniger regelmäßig sind. Die beiden Mittelreihen stehen von den übrigen weiter ab, weniger unter sich selbst und laufen über die Mitte des Schwanzes fort, sie sind dunkler. Der Schwanz hat längliche und rhomboidale Flecken die von der Basis aus in mehreren unregelmäßigen Reihen verlaufen und gegen die Spitze an Größe zunehmen. Nächst der Spitze erscheinen die breiter gewordenen Flecken als querüberlaufend. Unten ist der Schwanz weißer, dessen Flecken seltner. Der erste Querfleck ist 1 Fuß, 7 Zoll, 6 Linien von der Basis des Schwanzes entfernt. Die Krallen sind weiß.

Der Nimr lebt in Syrien, im glücklichen Arabien in den Gebirgen bei Gumfuda, in Dongola und im Küstenlande von Habessinien. Er war schon den Hebräern, Griechen und Römern bekannt. Letztere erhielten die großen gefleckten Katzenarten für ihre Kampfspiele aus Afrika und Syrien, sie glaubten Männchen und Weibchen zu unterscheiden indem sie die mit röthlicher Grundfarbe **Pardos** nannten und für erstere annahmen, die mit weißlicher Grundfarbe aber, **Pantheras** genannt, für letztere, nämlich Weibchen hielten. Deshalb lesen wir auch, daß diese weißen d. h. die orientalischen Panther, unser Nimr, häufiger aus Cilicien gebracht wurden. Zu **Plinius** Zeit wußte man wohl, daß unter beiden Thierarten sich beiderlei Geschlechter fänden und unterschied sie bloß noch nach der Farbe.

In der Lebensweise kommt dies Thier sehr wahrscheinlich mit den ähnlichen über-

Digitized by Google

ein. Ehrenberg sahe nur in Nubien eins lebendig, welches aus einem Wäldchen kam und etwa hundert Schritte weit vom ersten Cameele langsam über den Weg schlich, sich dann hinter die Hügel verbarg. Zwei von der Gesellschaft verfolgten die Fährte, irrten aber lange auf unwegsamen Pfaden umher und mußten fürchten, der Hitze und dem Durste zu unterliegen, ohne das Thier auffinden zu können. Im Sinagebirge erzählten die Beduinen von dem Vorkommen des Nimr und nach ausgesetzter Belohnung brachte auch einer die Nachricht, er hätte einen verwundet, welcher eben eine Sina-Ziege zerrissen. Andre gingen mit ihm das Thier aufzusuchen, allein sie fanden es nicht wieder. — Der Felle bediente man sich im glücklichen Arabien, in Syrien und Habessinien als Lagerdecken.

Die Abbildung ist ganz nach Ehrenberg, dem wir in neuerer Zeit nach Hamilton Smiths Andeutung, die genauere Auseinandersetzung und nähere Kenntniß dieses Thieres verdanken.

Die nächsterverwandte Art ist

8b. Der Irbis, od. die persische Unze. Felis Irbis Müll.

dessen schöne Abbildung und Beschreibung wir im Nachtrage zu diesem Bande nebst noch mehreren erst jetzt erhaltenen Arten geben werden.

9. Der Melas, schwarze Leopard. Felis Melas Peron.

Franz.: Le Melas. — Engl.: The Melas. — Sumatr.: Rimau-Kumbang? —

Kennz. d. Abänderung. Ganz schwarz mit noch dunkelschwarzen Flecken.

Beschreibung. Man hielt dies Thier ehedem für eigne Art, indem es De Lamétherie unter dem Namen Panthère noire beschrieb. Peron brachte späterhin wieder ein Exemplar nach Europa und legte ihm obigen Namen bei. Er brachte es von der Ostküste von Java und verehrte es der Kaiserin Josephine welche es der Menagerie am Jardin de plantes überließ. Neuerlich zeigte man in London in Wombwell's Menagerie wieder ein ähnliches Thier. Es war kleiner als die gewöhnlichen Leoparden und sehr wild. Es hat sich nunmehr ergeben, daß dergleichen schwarze Leoparden in dem Vaterlande des Leoparden (vergl. No. 7.) nichts seltenes sind, sondern als individuelle Abänderungen daselbst ebenso einzeln vorkommen, wie wir von den schwarzen Jaguars in Südamerika, berichtet haben. Professor Reinwardt und der auf Java verstorbene Dr. Kuhl versichern, daß man dort allgemein weiß, daß schwarze Leoparden in demselben Wurfe mit bunten geboren werden. Die dunkelschwarzen Flecken treten auf dem weniger dunklen Grunde, besonders in gewisser Einwirkung des Lichtes deutlicher hervor. Wie bei allen Abänderungen, kann man auch hier nicht erwarten, daß die Individuen derselben einander alle gleich seyn sollten, deßhalb darf es nicht auffallen, wenn Temminck wieder solche sahe, deren Grundfarbe nur kastanienbraun war, so daß diese gleichsam den Uebergang zu jenem Melas darstellen.

Sehr wahrscheinlich giebt es von mehreren und vielleicht von allen verwandten gefleckten Katzenarten dergleichen schwarze Abänderungen.

Digitized by Google

10. Der Schildpadd-Tiger, großgefleckter Tiger. Felis macrocelis Tem.

Sumatr.: Riman-Dahan. — Franz.: Félis longibande, tigre à écaille de Tortue. — Engl.: The Riman-Dahan. —

Kennzeichen der Art: Bräunlichgrau mit schwarzen bogigen Binden und großen, eckigen Ringen in 2—3 Längsreihen, deren Hinter-Hälfte stärker ausgedrückt ist, Schwanz lang, dick und gleichmäßig schwarz geringelt.

Beschreibung. Nach Temminck ist das Thier 5 Fuß 6 Zoll lang, wovon nämlich 2½ Fuß auf den Schwanz kömmt. Dr. Horsfield maß ein Weibchen und fand es eben so groß, obwohl schwerlich vollkommen erwachsen, nämlich 5 Fuß, 6 Zoll, wovon 2 Fuß, 8 Zoll auf den Schwanz kamen. Die Schulterhöhe war 1 Fuß, 4 Zoll. — Der Kopf ist verhältnißmäßig klein, etwas verdünnt, stumpf, die Oberlippe voll und ausgedehnt, die Unterlippe weniger aufgeworfen, die Schnauze abgestumpft, der Vorderkopf niedrig und platt, die Nase nur wenig gewölbt. Das ganze Ansehen des Thieres verräth nicht die Wildheit des Tigers oder Leoparden; die gelblichen Augen und die ganze Physiognomie ähnelt außerordentlich der unsrer Haußkatze. Die Ohren sind verhältnißmäßig klein und abgerundet, die Gliedmaßen kurz, dick und kräftig, der Schwanz bis zur Spitze von gleicher Dicke und so lang wie der Leib bis an den Kopf. Die Grundfarbe ist blaßgraulich, etwas ins Bräunliche ziehend, die Zeichnung ist schwarz. Vom Auge und vom Maulwinkel aus ziehen zwei schwarze Linien nach der Kehle hin, einige wellenartige längs über den Halsrücken, vom Rücken aus nach den Seiten zeigen sich die großen eckigen Ringe, von denen über den Schultern nur einer wegen bedeuten der Größe Platz findet, von da an finden sich aber vom Rücken aus zwei bis drei untereinander, deren Vorderrand ist dünn, kaum bestimmt, der Hinterrand aber dicker und stärker ausgeprägt, der Innenraum ist dunkler und wie punktirt; auf der Unterseite des Halses, des Bauchs und auf der Außen- und Innenseite der Füße finden sich unregelmäßige einfache, schwarze, spitzige Flecken und Streifen; der Schwanz hat zahlreiche, ziemlich gleiche, schmale, schwarze Ringe, welche unten wenig zusammenschließen.

Die erste Nachricht von diesem Thiere, dessen Kenntniß der neuesten Zeit angehört, gab Sir Stamford Raffles in dem beschreibenden Catalog seiner in Sumatra zusammengebrachten Sammlung. Nach ihm gab der Dr. Horsfield eine ausführlichere Beschreibung und treffliche Abbildung, die wir von ihm entlehnt haben. Später beschrieb Temminck das Thier unter dem Namen den wir oben nannten, nach unvollständigen Fellen und Horsfield erklärte dessen Félis longibande für dasselbe schon früher von ihm beschriebene Thier.

Der Schildpadd-Tiger lebt in Sumatra, Temminck vermuthet er sei auch auf dem Continet von Ostindien zu Hauße, weil er mehrere Mäntel von Daiackers erhielt welche aus dem Felle des Thiers gemacht waren. Er klettert auf Bäume und verfolgt die Vögel und kleinen Säugthiere von denen er lebt, ja die Bewohner von Sumatra versicherten Raffles, daß das Thier auf dem Gabel-Zweige eines Strauches ausgestreckt und an denselben angeklammert zu schlafen pflege, daher ist auch der Name zu leiten, denn Daban heißt eine Gabel, welche aus zwei Aesten gebildet wird. In der Gefangenschaft benahmen sich die Exemplare bei Raffles sehr sanft, sie betrugen sich wie Katzen, spielten und schmeichelten, mit einen Vogel den man ihnen zuwarf spielten sie wie eine Katze mit der Maus, sie zogen ihn herum ließen ihn los, faßten ihn wieder

Digitized by Google

und stießen ihn wieder fort. Dies Spiel treiben sie oft Stunden lang bevor sie ihm das Blut aussaugten und ihn auffraßen. Sie schienen niemals auf einen Menschen oder ein Kind Jagd zu machen, sondern nur die Unterhaltung mit ihnen zu lieben. Die Eingebornen versicherten daß sie sich von Federvieh, Waldvögeln und jungem Rothwild nährten. Sie leben nicht gesellschaftlich, sondern gehören auch in ihrem Vaterlande unter die seltensten Thiere. Die beiden Exemplare welche Raffles erhielt, waren im Innern von Bencoolen am Ufer des Bencoolen-Flusses gefangen worden. Sie leben da in der Nähe der Dörfer, und die Eingebornen fürchten sie weiter nicht, außer für ihr Federvieh. Eins von den beiden Thieren kam in die Menagerie nach Exeter-Change, wo es in den ersten Tagen sich sehr wild benahm, nach und nach aber wieder gewöhnte und sanft wurde.

Raffles erwähnt auch noch eines ähnlichen großen Thiers im südlichen Sumatra. Man nennt es dort Rimau-mang und sagt es sey noch größer und gefährlicher als der Tiger selbst, es mache seine Anfälle nicht aus einem Hinterhalte und schleichend, sondern dringe wüthend und unaufhaltsam vorwärts in die Dörfer und Häußer. Es soll eine lange Mähne haben, eine Schwanzquaste und dunkel einfarbig seyn, auch einen größern und längern Kopf haben als der Tiger. Wenn also das Thier nicht eine Race des Löwen selbst ist, so muß es ihm in jedem Betracht sehr nahe verwandt seyn.

Den Abbildungen nach, mögen doch wohl auch zwei ähnliche Thiere verwechselt worden sern. Die Felis nebulosa welche Smith früher in der Menagerie zu Exeter-Change abbildete und beschrieb und in Fr. Cuvier's Mammifères publizirte, hat einen größern Kopf, rothgelbe Grundfarbe und abgerundete nicht eckige Ringzeichnung, dasselbe Thier copirte Schinz und gab ihm den neuen Namen Felis virgata.

Griffith beschreibt seine F. nebulosa so groß wie den Tiger, das Fell das er sahe, war unglücklicherweise zu Pelzmützen zerschnitten und kam aus China. Er gab dessen ungeachtet eine Abbildung im Animal Kingdom und diese erscheint jetzt, copirt bei Schreber Heft LXXIV. f. 105. A. Wir haben vielleicht mit Fischer, Lenz und Voigt geirrt, wenn wir im Regnum animale No. 10. die F. nebulosa mit der beschriebenen, für einerlei halten und werden diese im Nachtrage noch hinzufügen. Auch Jardine hält sie für verschieden.

11. Der Ozelot. Felis pardalis Linn.

In Südamerika: Chibi-Gouazoti, Maracaya, Mbarabayá, Gato do mato pintado grande, Onça pequena. — Botocud. Cuparack-nig-mack. — Camaçan. Kuichhua. — Peruvianischer, brasilianischer Tiger.

Kennzeichen der Art: Grundfarbe gelblich, nach unten weißlichgrau, braune schwarzgeränderte Längsstreifen laufen über die ganze Seite hin, unterhalb zerstreute, einfache Fleckchen, der Schwanz ist so lang als der Mittelrücken.

Beschreibung. Der Ozelot ist 2 Fuß 4 Zoll lang, 15 Zoll hoch und sein Schwanz 15 Zoll; der Kopf nebst Nase, doch mit Ausnahme der Schnautze und Wangen ist blaßröthlichbraun, welche Farbe über den Rücken hinzieht, Schnautze, Wangen, die Seiten des Körpers vom Rücken aus bis zum Bauch und von da herab, so wie die Innenseite der Beine weißlich, die Außenseite der Beine und Oberseite des Schwanzes haben eine blaß gelblichgraue Grundfarbe. Der Kopf hat in braunem Grunde auf der Stirn zahlreiche kleine schwarze Fleckchen, zwei schwarze Linien beginnen von der

Digitized by Google

Nasenwurzel und laufen von da aus nach dem Halsrücken, zwei andre jederseits eine vom Augenwinkel aus, die andre unter demselben beginnend, nach den Seiten des Halses, Hals und Vorderbeine sind mit unregelmäßigen schwarzen Streifen geziert, über den Rücken und die Seiten laufen lange bandförmige braune Flecken mit schwarzer Einfassung, kürzere dgl. finden sich zwischen ihnen und tiefer nach dem Bauche hin, ähnliche rundliche auch zusammengesetzte zeigen die Hinterschenkel, der Schwanz ist von der Basis aus bis über die Mitte unregelmäßig schwarz gefleckt, von da aus mit einigen ungleichen Ringen umgeben, die Spitze schwarz.

Dieser langgeschwänzte Ozelot muß vorzugsweise seinen Namen behalten, obwohl mehrere Schriftsteller denselben auf ähnliche Thiere übergetragen haben. Ich sahe ihn lebendig und habe ihn jetzt ausgestopft vor mir.

Azara sagt von seinem Chibi-guazu daß es paarweise lebe und am Tage sich sehr verborgen halte. Er tödtet Vögel, Hunde und Katzen welche kleiner sind als er selbst, soll indessen vom Genuß des Katzenfleisches die Raude bekommen. Er frißt auch Schlangen und Kröten, nach deren Genuß er jedoch an Erbrechen leiden und sogar sterben soll. Im Käfig gehalten, bringt er immer seinen Koth in ein Wassergefäß. Er gebiert zwei Junge die sich leicht zähmen lassen, indessen alles Hausgeflügel todtbeißen. Auch das Exemplar welches ich lebendig sahe, war sehr sanft, für andre Zeit doch katzenartig boshaft und hielt sich sehr reinlich. Aus Trinidad kam ein anderes durch Sir Ralph Woodford unter dem Namen eines peruvianischen Tigers nach London in die Menagerie am Tower. Der Mbaracaya, unter welchem Namen der Prinz Max von Neuwied das Thier beschreibt, wurde von ihm, in Brasilien vorzüglich am Mucuri, Alcobaça, Peruhype und Belmonte beobachtet. Es nähret sich gern von Aguti's und wurde in Schlagfallen gefangen. Es streift weit umher und ist ein kühnes Raubthier welches alles Lebende, was es bezwingen kann, verzehrt, auch Rehe fängt. Mit Hunden gehetzt entflieht es auf Bäume und wird herabgeschossen. Die Neger und einige Eingeborne essen das Fleisch, obgleich dasselbe wie von allen Katzen, unangenehm riecht. Des schönen Felles bedient man sich zu Regenkappen für die Flintenschlösser.

Diese und mehrere andre Arten welche jetzt oder später folgen, bilden gleichsam eine besondere Gruppe in der Gattung der Katzen, welche den Uebergang von den großen gefleckten Arten, denen sie sich in der Zeichnung anschließen, durch ihre längliche Katzenpupille zu den kleinern Arten eröffnen. Diese Gruppe enthält No. 11. den Ozelot: F. pardalis Linn. — 12. Die Halsbandkatze. F. armillata Fr. Cuv. — 12b. Die Kettelkatze, F. catenata Hamilt. Sm. — 15. Der Marguai. F. tigrina Schreb. — 13. Die brasilianische Katze. F. brasiliensis Fr. Cuv. — 13b. Der Tlatco od. Mexicanische Ozelot. F. Onca Schreb. — 13c. Leffons Ozelot. F. elegans Lesson. — 14. Die großschwänzige Katze. F. macroura Max. N. W.

Unsere Abbildung stellt den ächten Ozelot in etwas verkürzter Stellung dar.

12. Die Halsbandkatze. Felis armillata Fr. Cuv.

Franz.: Chat à collier.

Kennzeichen der Art: Gelblich, unten weiß mit Längsstreifen, welche schwarz eingefaßt, auf dem Rücken dunkelbraun, nach den Hinterbacken hin bräunlichgelb sind,

Digitized by Google

von einem schwarzen Halsbande laufen 7 schwarze Linien kopfwärts, Brust, Bauch und Füße sind klein-schwarzgefleckt, der Schwanz geringelt und kürzer als die Hinterbeine.

Beschreibung. Diese schöne Katze ist 2 Fuß lang, ihr Schwanz nur 10—11 Zoll. Farbe und Zeichnung ist oben angegeben. Diese südamerikanische Katze wurde in der Menagerie in Paris lange lebendig gehalten, alle ihre Bewegungen hatten etwas angenehmes und zierliches, ebenso war auch ihr Charakter. Sie spielte gern und betrug sich überhaupt wie eine wohlerzogene, gutartige Haußkatze, deren größte Race sie etwa um ein Drittheil an Größe übertraf, ihre Höhe betrug über einen Fuß.

13. Die brasilianische Tigerkatze. Felis brasiliensis Fr. Cuv.

Franz.: Chat du Brésil.

Kennzeichen der Art: Aschgrau, unten weiß, am Halse schmale Längsstreifen und an den Seiten sehr unregelmäßige Flecken von gelbbräunlicher Farbe mit schwarzem Saum, vom Halsband aus laufen 7 Linien kopfwärts, diese so wie die kleinen Flecken und Streifen an Brust, Bauch und Füßen sind schwarz, der geringelte Schwanz ist kürzer als die Hinterbeine.

Beschreibung. Die Länge beträgt 2 Fuß, die des Schwanzes 11 Zoll, die mittlere Höhe einen Fuß. Sie kam aus Cuba nach Frankreich, mit der Versicherung, sie stamme aus Brasilien. Sie zeichnet sich aus durch die kurzen abgerundet-breiten Ohren, Farbe und Zeichnung ist oben angegeben. Die Schnurren sind weiß.

Sie betrug sich in ihrer Gefangenschaft ungemein sanft und schmeichelnd, zum Theil wohl in Folge der guten Behandlung, die ihr zu Theil wurde.

14. Die kleine oder langgeschwänzte Tigerkatze. Felis macroura Max. N. W.

Brasil. an der Ostküste: Gatto do mato pintado, die gefleckte Waldkatze. — Botocud.: Kuparack-Kuntiack. — Camacan.: Knichhua-dan. — Franz.: le Chat-tigre à longue queue. Engl.: the Long-tailed Ocelot. — Felis Wiedii Schinz, Wiedische Katze. —

Kennzeichen der Art: Fahl grauröthlich, unterseits weißlich, auf Rücken, Bauch und Füßen spitzeckige Flecken, die an den Seiten ringförmig; an der Stirn zwei, am Halse 5 Längsstreifen welche so wie die Querbänder an der Kehle schwarz sind; der Schwanz anderthalb mal so lang als die Hinterbeine, großgefleckt, Fußsohlen dunkelbräunlich.

Beschreibung. Obigem ist nur noch hinzuzufügen, daß das Thier kleiner ist als voriges, 1 Fuß 9 Zoll lang, der Schwanz aber 13 Zoll 9 Linien.

Diese Katze lebt in den großen Urwäldern Brasiliens, wo sie mit größter Leichtigkeit an den Lianen emporklettert und die Bäume nach Vogelnestern und mancherlei Thieren durchsucht, sie verzehrt alles warmblüthige, Lieblingsnahrung bieten ihr besonders die Tinamu's und andere rebhuhnähnliche Vögel. Aus den Höfen holt sie Federvieh. Sie wohnt in hohlen Stämmen, Felsklüften oder Erdhöhlen, wo sie wie unsere wilde Katze, ihre Jungen zur Welt bringt. Sie geht bei Tag und Nacht auf den Raub aus und wird in Schlagfallen gefangen oder von den Bäumen geschossen, wohin sie vor den Hunden entflieht.

Botocuden und Neger essen ihr Fleisch, von dem Felle macht man Mützen und Regenkuppen um die Gewehrschlösser.

Digitized by Google

15. Der Marguai, amerikaniſche Tigerkatze. Felis tigrina Schreb.

Braſilian.: Marguao. — Mexic.: Tapa malaton.

Kennzeichen der Art: Fahlgelb unten weiß, ſchwarzbraune Streifen und längliche Flecken laufen in Reihen über die Seite und ſchief nach unten, der Schwanz iſt geringelt etwa ſo lang als die Hinterbeine.

Beſchreibung. Der Marguai hat die Größe und Geſtaltung unſerer Haußkatze, die Ohren ſind breiter. Der Leib hält 15 Zoll, der Schwanz 12 Zoll Länge, die Höhe des Thiers beträgt 9 Zoll. Auf dem Kopfe entſpringen zwei Linien vom innern Augenwinkel und ſteigen zum Scheitel empor, wo vier Linien folgen, welche nach dem Halſe herablaufen, und dann zwei andre auf jeder Seite, welche parallel herablaufen, eine vom äußern Augenwinkel die andre von der Seite der Naſe bis zum Anfange des Halſes. Vier bis fünf kleine Striche zeigen ſich noch am Urſprunge der Schnurren. Drei Parallelſtreifen, aus langen Flecken zuſammengeſetzt, ziehen ſich über den Rücken, die mittlern, anfangs ſehr ſchmal, werden dann breit. Die Seiten des Halſes ſo wie die des Körpers ſind mit mehr oder weniger länglichen, ſehr unregelmäßigen, ſchwarzen Flecken verſehen, einige ſind auch in der Mitte gelblich oder ausgekerbt und mit jener Farbe geſäumt; unter der Unterkinnlade entſpringt ein Streif, welcher über die Seite des Halſes verläuft, ein andrer ſchneidet quer zwiſchen Hals und Bruſt durch und vereint ſich mit den Schulterflecken, von denen ſich beſonders zwei durch Größe auszeichnen. Hüften und Schenkel führen kleine ſchwarze Flecken. Bauch, Innenſeite der Hüften und Schenkel ſind weniger gefleckt und die Vorderbeine oben mit ſchwarzen Querbändern gezeichnet. Der Schwanz hat oben Halbringe und unten loſe und unregelmäßige Flecke. Der Kopf hat oben eine graulichgelbliche Grundfarbe, unten iſt er weiß, die ſchwarze Linie, welche vom Augenwinkel ausgeht, trennt dieſe Farben. Die Ohren ſind ſchwarz, am Hinterrande mit einem kleinen weißen Flecken, auch inwendig weiß. Die Fleckenzeichnung iſt bei dieſer wie bei ähnlichen Arten ſehr veränderlich.

Die Pupille iſt länglich, ein inneres Augenlied zieht ſich oft über das Auge. Der Marguai iſt äußerſt ſanft, läßt in der Gefangenſchaft ſich ſtreicheln und ſchmiegt ſich dabei an, wie die Haußkatze, wobei er ſchnurrt wie dieſe, ein etwas ſtarkes Miauen iſt die Stimme ſeines Verlangens. — Ich habe dieſe Art ausgeſtopft vor mir.

16. Der Stahlpanther. Felis chalybeata Herm.

Franz.: Panthère chalybé. — F. pardus Temm. Fisch.

Kenzeichen und Art. Röthlichgelb, unterſeits weißlich, der ganze Körper mit ungleichen ſchwarzſtahlglänzenden einfachen Flecken beſtreut, Schwanz ſehr lang.

Beſchreibung. Dieſe Art gehört unter die zweifelhaften und bleibt deshalb ferneren Beobachtungen empfohlen. Der Straßburger Prof. Hermann kaufte das Fell in Leipzig und ſandte die Abbildung nach dem ausgeſtopften Thiere an Schreber, welcher dieſe in ſeinem Säugthierwerke publizirte. In Hermanns Nachlaß und im Straßburger Muſeum ſuchte man Aufſchluß über das Thier, welches aber vielleicht nicht mehr vorhanden war und jetzt in einem jungen Leoparden vermuthet wurde, wofür auch Wahrſcheinlichkeit ſpricht, da bei mehreren Katzen mit Ringzeichnung, dieſe Ringe in der Jugend nicht ausgeprägt, ſondern in Geſtalt ausgefüllter Flecken erſcheinen. Cuvier und

Digitized by Google

Temminck irrten, wenn sie Hermans Thier in einem Serval des dortigen Museums suchen wollten, darüber vergleiche man die treffliche Beleuchtung der Sache von Dr. A. F. Wiegmann in der Isis 1831. S. 286. Vielmehr scheint es dasselbe zu seyn, welches Temminck und Fischer als F. pardus annehmen, zu unserm F. leopardus gehörig. Unsre Abbildung ist eine verkleinerte Wiederholung der einzigen existirenden, und konnte nicht besser seyn als diese. — Eine andre Felis chalybeata Jard. ist der Liver-coloured Puma in Chili, von dem noch keine Abbildung existirt.

17. Der Gepard, Chittah, oder Jagdleopard. Felis jubata Schreb.

Persisch: Palenk, Youze. — Buchar.: Pulam. — Kalmukisch: Tschagunda. — Arabisch: Fahad. — Ind.: Chittah. — Französisch: le Guépard, tigre-chasseur. — Holländisch am Cap.: Luipard. — Englisch: The Chetah, the Hunting-Leopard, Hunting Cat. — Felis venatica Pennant.

Kennzeichen der Art: Klauen nicht zurückziehbar, Nacken mit aufrechter Mähne, Grundfarbe erbsgelb, unten blasser, der ganze Leib mit zahlreichen einfachen, schwarzen Flecken; vom Augenwinkel läuft eine S-förmige schwarze Linie nach dem Maulwinkel, der Schwanz ist etwa so lang als die Hinterbeine.

Beschreibung. Der Gepard wird 3 Fuß und 2 Zoll lang, sein Schwanz 22 Zoll bis 2 Fuß. Der Wuchs des Thieres weicht einigermassen ab von dem der übrigen Katzen, indem es hochbeiniger ist, und die Hundsklauen oder nicht zurückziehbaren Nägel, könnten allerdings einen Charakter darbieten, um das Thier als eine eigene Gattung: Cynailurus Wagler von den eigentlichen Katzen zu sondern, da es wegen des ganzen Habitus und wegen des Gebisses und der rauhen Zunge, worin es mit den übrigen Katzen auf das genaueste übereinstimmt, unmöglich ist, das Thier in die Gattuug der Hundsthiere zu versetzen. Sein Vaterland ist Afrika, wo es am Senegal und seltner am Cap vorkömmt und der Orient; nach Pallas lebt es an der südöstlichen Küste des kaspischen Meeres und in der südlichen Kirgisen-Steppe hier und da, findet sich in Ostindien auf dem Continent so wie auf Java und Sumatra. Einige glaubten man müsse zwei ähnliche Thiere unterscheiden, nämlich den gemähnten Gepard (F. jubata Schreb. venatica Penn.) aus Indien und den ungemähnten Gepard (F. guttata Herm. Schreb. venatica Griff.) aus Afrika. Es hat sich indessen der ungemähnte Gepard, wie ihn Schreber abbildet, in der Natur gar nicht nachweisen lassen und die Abbildung scheint unter diejenigen dieses Werkes zu gehören, welche durch Zeichner und Maler verdorben sind, sobald nicht dies zweite Thier, welches nach der Abbildung auch eine rothbraune Grundfarbe und kurze Beine zeigt, wirklich so wieder aufgefunden wird. Das Thier, welches Lecoupé vom Senegal brachte, war der gewöhnliche Gepard ebenso wie der aus Indien, welchen Duvaucel unter dem Namen Chittah brachte.

Der Gepard hat eine runde Pupille, sein Kopf ist in der Mitte weit gewölbter als der der verwandten Katzen (wie unsre Abbildung treulich zeigt). Er ist durch seine große Sanftmuth ausgezeichnet und wird nicht nur ganz frei in Häußern gehalten, wo er mit Kindern aber auch mit Haußthieren spielt, sondern er ist auch das Thier, dessen man sich in Ostindien zur Jagd bedient und welches gewöhnlich auch unter dem vieldeutigen Namen der Unze in unsern ältern Schriften erwähnt wird. Seine Lebensweise im wilden Zustande scheint noch wenig beobachtet, allein desto häufigere Nachrich-

Digitized by Google

ten existiren über sein Benehmen im gezähmten Zustande. Chardin, Bernier, Tavernier u. a. ältere Reisende fanden in mehrern Gegenden von Persien und Ostindien, daß man sich einer gefleckten Katzenart zur Jagd auf Gazellen bediente, indessen war die Kenntniß dieser Art erst neueren Zeiten vorbehalten. Jene Jagd üben die Fürsten und Großen des Reichs zu ihrer Belustigung, nicht wegen des Nutzens, also mit dem veralteten Spiel der Falkenjagd in Europa zu vergleichen. Man richtet auch die Gepards auf ähnliche Weise zur Jagd ab, man benimmt ihnen ihre natürliche Kraft dadurch, daß man sie gefesselt und mit verkappten Gesicht auf niedrigen Karren fährt und sie hier erst auf das gegebene Commandowort befreit und auf den Raub, wenn er sich zeigt, fortspringen läßt, an den sie dann heranschleichen und ihn endlich mit wenigen Sätzen erhaschen. Man hat sie auch auf dem Elephanten oder auf dem Kameele das man reitet, hinter sich sitzen, wenn sie dressirt sind, gewöhnlich aber fährt man sie auf jenen niedrigen Karren, welche mit Ochsen bespannt werden. Ein Augenzeuge sagt darüber folgendes: kurz bevor wir unser Revier berührten, meldete uns der Kameeltreiber, denn deren bedient man sich gewöhnlich zum Aufsuchen des Wildes und zum Vorbereiten der Jagdlust, daß eine halbe Meile von unserm Standte eine Heerde Gazellen weide, und wir beschlossen sogleich sie mit unsern Gepards zu verfolgen. Jeder derselben fand sich auf einem offenen Karren ohne Leitern, mit zwei Ochsen bespannt und jeder hatte sein Gefolge von zwei Personen. Die Gepards waren mit einem Halfter an ein leichtes Halsband oben auf den Karn gebunden und wurden noch von den Beileuten an einen Riemen gehalten, welcher um die Lenden ging. Eine lederne Kappe bedeckte ihnen die Augen. Da die Gazellen außerordentlich scheu sind, so ist die beste Weise an sie anzukommen, wenn der Treiber an der langen Seite des Jagdwagens sitzt und man baut auch letztere darum so wie die Karren der Bauern, weil an deren Anblick die Thiere gewöhnt sind, so daß man sich ihnen bis auf 1—200 Ellen näheren kann. Diesmal hatten wir drei Gepards mit uns, rückten auf die Stelle wo die Gazellen gesehen worden waren in einer Linie vor, in welcher jeder 100 Ellen vom andern entfernt blieb. Als wir eben in ein Baumwollenfeld kamen, erblickten wir vier Gazellen und mein Kutscher bemühte sich bis auf 100 Ellen an sie zu kommen. Schnell wurde dem Gepard die Kappe und die Fesseln abgenommen und kaum erblickte er das Wild, als er sich nach der entgegengesetzten Richtung mit dem Bauch gänzlich zur Erde gedrückt, äußerst langsam und schmiegsam, hinter jedem Busche, und jedem Hinderniß was im Wege lag, sich verbergend fortschlich, sobald er indessen vermuthete bemerkt zu werden, beflügelte er seine Schritte und war nach einigen Sätzen plötzlich mitten unter den Thieren. Er faßte ein Weibchen und rannte indem er dieses gepackt, gegen 200 Ellen weit, gab ihm dann einen Schlag mit der Tatze, wälzte es um und in einem Augenblicke trank er das Blut aus der geöffneten Kehle. Einer der andern Gepards war zu derselben Zeit losgelassen worden, nachdem er aber vier bis fünf verzweifelte Sprünge gemacht hatte, mit denen er die Beute verfehlte, gab er die Verfolgung auf, kehrte knurrend zurück und setzte sich wieder auf den Karren. Als jenes Thier überwältigt worden lief einer vom Gefolge hin, setzte dem Gepard seine Kappe auf und schnitt dem Thiere die Kehle ab, sammelte Blut in ein hölzernes Gefäß und hielt es dem Gepard unter die Nase. Die Gazelle wurde fortgeschleppt und in ein Behältniß unter dem Wagen gebracht, während dem Gepard durch ein Bein des Thieres sein Widerrecht gegeben wurde.

Digitized by Google

Johnson sahe zu Ellickpoor mehrere Gepards auf offner Straße unter offnen Verschlägen nur mit Kappen versehen.

In Afrika kennt man die Benutzung des Thieres nicht, man treibt dort nur einen unbedeutenden Handel mit dessen Fellen, allein in Ostindien wurde diese Jagd unter der Regierung des Mogul am meisten betrieben, für ihn wurden auch andere ähnliche Thiere, wie es heißt „Leoparden, Luchse, Tiger" zu diesem Zwecke aufgebracht um Schweine mit ihnen zu hetzen. Mehre Kaiser führten bei ihren großen Jagden tausend Jagdleoparden mit in das Feld. Aber es dürfte nicht uninteressant seyn, zu wissen daß auch in unserm Europa diese Jagd nicht ganz fremd gewesen ist. Im Leben des Kaiser Leopold I. heißt es nämlich: „Es ist noch eine Art von Jagden in Wien bekannt gewesen, welche Lust sonst kein Prinz in Europa genossen, nemlich die Leoparden-Jagd. Der türkische Kaiser hatte durch die letzte Gesandtschaft unter andern Präsenten zwei zum Jagen abgerichtete zahme Leoparden präsentiren lassen, womit sich der römische Kaiser zum höchsten Vergnügen öfters divertirte. Diese Thiere waren so zahm, als der allerangewöhnteste Hund, saßen ihren Reitern zu Pferde hinten auf der Kruppe und sahen sich bei der Jagd weit um, ob sie was gewahr würden. Erblickten sie nun Hasen, Rehe u. dergl. Thiere, so sprangen sie ab und in einem vogelschnellen Schuß hatten sie das Wild eingeholt, worauf sie sich wieder hinter ihren angewohnten Jäger auf das Pferd setzten und einen neuen Fang ablauschten. (Der Verf. beschreibt sie nun und fährt fort:) Als aber die Rebellen bis fast in die Vorstädte von Wien einbrachen, haben sie diese Thiere, nebst andern wilden Thieren, so in den neuen Gebäuden aufbehalten worden, niedergehauen, um sich der Felle zu ihrer Husarischen Tracht zu bedienen." Auch der dressirte Panther, den Emmanuel, König von Portugal dem Pabste Leo X. schenkte, war sehr wahrscheinlich ein Gepard, ebenso auch die Unze welche der Herzog Wilhelm von Cumberland mit einem starken Hirsche zusammenbrachte, dem sie nicht beikommen konnte, endlich durch Zerreißung der Netze durch die Zuschauer entkam und in einem nahen Gehölz einen Damhirsch jagte, wornach man sie zurückbrachte.

18. Der Serval, afrikanische Tigerkatze. Felis Serval Schreb.

Franz.: le Serval, le chat-pard. — Engl.: The Serval. The Cape tiger. Holländ.: Tigerbosch Kate. — Felis Serval et F. capensis Temm. — Afrikanische Pardertatze. F. Galeopardus.

Kennzeichen der Art: Erbsgelb, unten weißlich, Lippen blaßgelblich, im Nacken vier schwarze Längslinien, fünf zwischen den Schultern, übrigens über den ganzen Leib zerstreute kleine schwarze Flecken, Ohren groß, schwarz, weiß gefleckt, Schwanz nicht halb so lang als der Leib.

Beschreibung. Der Serval wird 2 Fuß 11 Zoll lang, sein Schwanz 13½ Zoll, die Ohren 2½ Zoll. Das Exemplar welches in der Pariser Menagerie lebte, war mit einem Schiffe in Brest gelandet, ohne daß man früher erfahren konnte, woher das Thier gebracht sey, indessen ist es keinem Zweifel unterworfen, daß dasselbe im südlichen Afrika lebt, woher die übereinstimmenden Felle kommen und woher ich auch das vor mir stehende Thier erhielt. Das lebendige Exemplar in Paris war katzenartig, sanft und spielend, stehend war es hinten 15 und vorn nur 12 Zoll hoch. Farbe und Zeichnung vgl. oben.

Digitized by Google

Die Pupillen sind rund, der Serval ist also eine Tagkatze, die Ohren sind verhältnißmäßig groß.

Die Felle werden zu hunderten vom Cap der guten Hoffnung und von Guinea gebracht und kommen im Handel unter dem Namen der afrikanischen Tigerkatze vor. Sie werden zu Unterfutter in Oberröcke und Mäntel, Mützen u. dgl. verarbeitet.

Die ähnliche ostindische Servalkatze: **F. ornata Mus. Edinb.** (**F. servalina Jard.**) vgl. später.

19. Der Chati, die sanfte Katze. Felis mitis Fr. Cuv.

Franz.: le Chati. — Felis chati Temm. F. chibi-gouazou Desmar.

Kennzeichen der Art: gelblich, unten weiß, mit vier Reihen kurzer schwarzer Streife über den Rücken, einige braun ausgefüllte, offene Ringe an den Seiten nebst zerstreuten kurzen Strichen und Fleckchen, Ohren außen schwarz und weiß gefleckt, Schwanz schwarz geringelt etwa so lang als die Hinterfüße.

Beschreibung. Diese schöngezeichnete Katze war ein Weibchen und wurde in der Pariser Menagerie lebendig gehalten, sie hatte 2 Fuß Länge, der Schwanz hielt 11 Zoll; die Pupille war rund. Ueber das Vaterland war man nicht ganz sicher, da der Schiffer, welcher mit ihr in Brest landete, darüber nichts angeben konnte; sie stammt indessen sehr wahrscheinlich aus Südamerika und der Prinz Max Neu-Wied findet sogar die Abbildung seinem Ozelot so ähnlich, daß er fast geneigt ist, sie für dasselbe Thier zu halten.

Der Wärter, welcher in der Menagerie das Thier pflegte, nannte es Chati und Fr. Cuvier nahm diese Benennung als Artnahmen an, was er für besser hält als unbestimmt diese schöne Katze für die Abänderung einer andern auszugeben. Das Benehmen, des Thieres war so sanft als das der zahmsten Katze, deren Stimme auch die ihrige gleich, nur etwas stärker war. Sie spielte gern, ohne jemals zu kratzen oder zu beißen. und wenn Umstehende ihr nicht nahe genug kamen, so trieb sie sich unruhig im Käfig herum und ließ ein sanftes Rufen hören, bis man sich mit ihr beschäftigte. So große Sanftmuth und Anhänglichkeit läßt vermuthen, daß diese Katze ein ebenso angenehmes als schönes Hausthier werden würde, wenn es gelänge, sie jung zu erhalten und unter guter Behandlung aufzuziehen. Fr. Cuvier vermuthet in einem Nachtrage zu seiner Beschreibung, daß sein Chati vielleicht mit dem Jaguar von Buffon IX. t. 18 und Suppl. t. 39 (nicht unser Jaguar No. 5.) mit dem Brasilian-Tiger von Pennant Hist. of. Quadrup. t. 31. f. 1. und mit Felis Onça Schreber. t. CII. einerlei seyn könne, indessen müssen wir ganz der Annahme von Desmoulins beistimmen, welcher in den Figuren von Buffon und Schreber den Mexicanischen Ozelot oder Tlalco-Ocelot von Hernandez findet und den Chati als besondere benachbarte Art aufführt, derselben Meinung sind auch die neuesten englischen Zoologen, welche in gegenwärtig ablaufendem Jahre über diese Thiere geschrieben haben.

Digitized by Google

20. Der Kuwuk, javanische Katze. Felis javanensis Horsf.

Javan.: Kuwuk. — Franz.: Chat de Java. — Engl.: The Javanese Cat, the Kuwuk.

Kennzeichen der Art: gelbgraubräunlich, obenhin mit 4 rußschwarzen Linien, welche auf dem Rücken unterbrochen sind, an der Seite mit länglichen, am Bauche mit runden Flecken, an der Kehle mit vier, und am Unterhalse mit zwei schwarzen Querbinden.

Beschreibung. Von dieser Katze wurden Felle aus Java durch Leschenault an das Pariser Museum gebracht. Sie maß nur 17 Zoll, ihr Schwanz 8 Zoll, die Höhe betrug 8 Zoll, so daß sie auch in der Größe der Haußkatze so nahe kam, wie in der Farbe. Späterhin beschrieb indessen Horsfield seine Javanische Katze und bildete sie ab, deren Grundfarbe rothbraun ist, sein Thier sieht überhaupt etwas anders aus und es ist noch nicht entschieden, ob beide zu derselben Art gehören. Horsfield beschrieb ein jüngeres Thier und Cuvier glaubt, daß das seinige ein altes gewesen seyn, und deshalb eine mehr graue Grundfarbe gehabt haben könne, was dadurch wahrscheinlich wird, daß Temmink zwei Exemplare lebend besaß und bemerkt daß diese in der Jugend röther gewesen wären.

21. Der Puma, Kuguar. Felis concolor L.

Brasil.: Çuguaçuarana Marcgr. Guazonara Azara. Onça Çuçuoranna; in der Linga Geral: Çuçuaranna. — Botokudisch: Cuparak-Nimpruck. — Camakanisch: Jaké-Coará. — Felis concolor und discolor Schreb. — Französisch: le Couguar, le Pouma. — Englisch: The Puma, or American Lion.

Kennzeichen der Art: röthlichgrau, Brust, Bauch, innres Ohr und Maul meistens weiß, äußeres Ohr und Schwanzspitze schwarzbraun.

Beschreibung. Der Puma erreicht eine Länge von 3½ Fuß, der Schwanz wird gegen 2 Fuß lang, nach englischem Maas wird angegeben 4—4½ Fuß, der Schwanz 2—2½ Fuß. Nach Versicherung des Prinzen Max N. W. wird das Thier auch noch weit größer, da ihm Felle aus Pennsylvanien vorgekommen, welche denen des Jaguar an Größe wenig nachgaben. Die röthlichgraue Farbe des Thieres zieht in der Jugend nahe in grau, im Alter nahe in röthlichbraun, von Flecken scheinen sich nur in der Jugend undeutliche Spuren zu finden, diese Spuren deuten auf große aber sehr entfernte also nicht zahlreiche Flecken in den Seiten, dergl. sich auch drei Reihen über den Rücken ziehen; bei den ausgewachsenen Thieren sind sie gänzlich verschwunden. Die Augenwimpern sind weiß und entspringen von schwarzen Punkten. Der Pelz ist dick und weich, besonders gilt dies vom Schwanze.

Man hat nach der Entdeckung von Amerika, wo man die dortigen Thiere mit den aus andren Welttheilen bekannten, verglich, den Puma, als die einzige, größre, einfarbige, fahle Katze, amerikanischen Löwen genannt, weil derselbe in der Färbung einige Aehnlichkeit mit dem Löwen, in der Gestalt wohl auch mit der Löwin hat, indessen ist der Schwanz quastenlos, keine Mähne vorhanden und das ganze Thier bedeutend kleiner und schwächer. Der Kopf ist verhältnißmäßig klein und kurz, Leib und Glieder aber lang und ziemlich stark, die Klauen groß und grünlich-weiß.

Der Puma findet sich in dem größten Theile von Amerika, nördlich bis Canada,

Digitized by Google

und südlich bis Paraguay. Er hält sich dort in allen großen Wäldern auf und verbirgt sich wie die verwandten Thiere gern auf Bäumen. Wenn er sich in der Nähe großer Viehstände aufhält, wird er den Kälbern und jährigen Rindern gefährlich, denen er gern nachstellt. Er begnügt sich nicht, wie die größeren Katzen mit einem einzigen Opfer, sondern würgt z. B. von einer Schaafheerde so viele Schaafe als er kann, und säuft nur deren Blut. Er ist überhaupt in den Ebenen im freien Felde, in den Pampa's mehr zu fürchten als der Jaguar, welcher die Wälder nicht leicht verläßt Im Freien jagt er alle Arten des kleinern Wildes, auch Rehe. Doch ist der Puma furchtsam und scheu; auch in der Gefangenschaft zeigte er sich weniger wild als andre Katzen; im Gegentheil waren die, welche wir gesehen, sanft und fast träg zu nennen. An ihre Wärter gewöhnen sie sich und lassen sich von denselben liebkosen, einen Fremden zischen sie dagegen nach Katzenart an. Einer in der pariser Menagerie lebte daselbst funfzehn Jahre und fraß täglich 4—6 Pfund Fleisch, auf eine Mahlzeit. Man hat Beispiele von gänzlicher Zähmung. Schon Azara besaß einen ganz gezähmten, und der Tragödiendichter Mr. Kean hatte einen Puma, der ihm nachlief, wie ein Hund, und den er oft mit in das Schauspiel brachte. Wilson hatte einen Puma von dem er sagt, er habe sich sehr anhänglich an bekannte Personen gezeigt und ihren Füßen oft seinen Rücken geboten und wie die Katzen mit dem Besatze ihrer Kleider gespielt. Er liebte das Wasser sehr und sprang gern in einen großen Bottich hinein und wieder heraus, wenn er sich zur Abkühlung darin herum gewälzt hatte. Als Wilson in London war, entlief das Thier einmal auf die Straße, wurde aber daselbst durch einen Gassenwächter ohne Widersetzlichkeit gefangen genommen und wiedergebracht. Es war aus St. Paulo, der Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts von Brasilien gebracht worden. Auf der Reise befand es sich in ganz freundschaftlicher Berührung mit mehreren Hunden und Affen, von denen es keinem etwas zu leid that, nicht einmal die Neckereien jener erwiederte; hatte aber ein Vogel oder eine Ziege das Unglück in seinen Bereich zu kommen, so machte es ihm sogleich kurzen Prozeß. In Edinburg angelangt, wurde dieser Puma gewöhnlich mit Fleisch gefüttert, doch gelang es ihm einen wilden Entrich und einen Hasen zu beschleichen, bei denen er dasselbe Mannöver wie in seinem Vaterlande ausführte, in Kreisen um sie herumzugehen, dann auf sie zu springen und ihnen mit der Pfote den tödtlichen Schlag zu versetzen.

Die Jagd auf den Puma geschieht entweder so wie bei den vorigen Arten, daß man ihn mit Hunden auf einen Baum hetzt und herabschießt, oder in den Pampa's bedient man sich der, den Amerikanern eigenthümlichen Weise, welche unsere Vignette darstellt, mit der Wurfschlinge. Ein Jäger führt einen sehr langen Riemen, an dessen Ende ein Stein befestigt ist, diesen Riemen dreht er so lange, bis er den Puma eingeholt hat, und schleudert ihn nun so auf denselben los, daß der Stein seinen Weg um ihn herum nimmt und ihn in den Riemen einschlingt. Sobald der Wurf gelungen, zieht der Jäger den Riemen straff und reitet einige Schritte zurück, wodurch das Thier erdrosselt wird. Aeltere amerikanische Reisende sagen, der Puma greife die Menschen nie an, indessen haben doch die neuesten Erfahrungen gelehrt, daß ein verwundeter Puma dem Menschen leicht lebensgefährlich werden kann, wie ein Vorfall in den Katskills Gebirgen in der Provinz New-York bewiesen hat.

Neger und Indier essen das Fleisch des Puma. In allen Gegenden von Brasilien traf der Prinz Max N. W. die Felle desselben in den Wohnungen der Bewohner an.

Digitized by Google

Sie haben weniger Werth als die der gefleckten Katzen und werden zu Pferdedecken benutzt. Im Handel in Europa kommen sie selten vor.

Abbildung. Das ältere Thier im Vordergrunde, das jüngere Thier unter Gebüsch ruhend. Im Hintergrunde die Jagd mit der Schleuderschlinge, welche oben beschrieben.

22. Die dunkle Katze. Felix obscura Desmar.

Französisch: le chat noir du Cap.

Kennzeichen der Art: braunschwarz mit wellenförmigen dunklern Querbinden, der Schwanz etwas länger als die Beine, undeutlich geringelt.

Beschreibung. Sie hat einen, dem unserer Hauskatze ähnlichen Wuchs, ihre Körperlänge beträgt 19 Zoll, die des Schwanzes 10 Zoll. Der ganze Pelz hat eine schwärzliche etwas in das röthlichbraune fallende Farbe, die dunklen Querbinden über den Rumpf, Hals und die Beine fallen nicht sehr in die Augen, zwei schwarze Linien gehen von der Seite des Auges und der Brust parallel bis hinter die Backzähne; zwei breite Querflecken finden sich nach oben an der Innenseite der Vorderbeine, am Schwanze 6 — 8 undeutliche schmale Ringe; die ganz dunkle Zeichnung macht sich nur bei einer treffenden Beleuchtung bemerkbar.

Die Herrn Peron und Lesueur hatten diese Katze während der Weltumseegelung des Capitän Baudin, am Vorgebirge der guten Hoffnung erlangt und verehrten sie der Menagerie in Paris. Auf dem Schiffe lief sie frei herum und fing Ratten; auch in der Menagerie befreite man sie späterhin aus ihrem engen Gewahrsam, doch ließ sie sich nicht fangen und angreifen. Hauskatzen verfolgte sie feindlich, und lebte nur ein Jahr lang. — Temminck hielt sie irrig für eine Abänderung des Stiefelluchses (No. 42.) so daß Geoffroi und Fried. Cuvier sich veranlaßt sahen zu sagen: wenn diese Katze von irgend einer andern eine Abänderung sey, so sey sie es doch gewiß nicht vom Stiefelluchs.

23. Der Jaguarundi. Felix Jaguarundi La Cep.

Franz.: le Jaguarundi d'Azara. — Brasil.: Gatto murisco, an einigen Orten: Hyrara oder Irara. Botokud.: Poknienn.

Kennzeichen der Art: Haar sehr kurz, abwechselnd schwarz und weiß, daher der Pelz dunkel braunschwarz, weißlich melirt; Kopf klein, Ohren klein, abgerundet, Schwanz so lang als Rumpf.

Beschreibung. Im Wuchs nähert er sich dem Puma ist aber weit kleiner. Seine Größe wird indessen sehr verschieden angegeben. D'Azara giebt ihm *) dieselbe Größe, wie seinem Chat noir, nämlich 23 Zoll für den Leib, gegen 13 Zoll auf den Schwanz, anderwärts 36¾ Zoll und für den Schwanz 13¾ Zoll, Desmoulins setzt: 26 Zoll für erstern und 16 Zoll für letztern, Temminck 2 Fuß 6 Zoll und für den Schwanz 22 Zoll, im Ganzen 4 Fuß 4 Zoll. Die Höhe beträgt auf den Schultern 1 Fuß. Die Puppille ist rund, das Weibchen trägt an jeder Seite 3 Zitzen.

*) Voyages dans l'Amerique méridionale par Don Felix de Azara par Walkenaer. Paris 1809. p. 273.

Digitized by Google

Der Jaguarundi lebt einsam oder paarweise im Dickicht der Wälder von Brasilien, Paraguay und Guiana, namentlich Surinam und Essequebo und gehört unter die Arten welche selbst die Reisenden sehr selten zu sehen bekommen, auch der Prinz Maximilian von N. W. erfuhr nur daß man ein schönes Paar gefangen hatte ohne es in noch vollkommnem Zustande zu sehen. Das Thier beschleicht listig vorzüglich die Hühnervögel und kleinen Säugethiere, verbirgt sich gern in Höhlen und Klüften oder in alten Stämmen, soll überhaupt schwerer zu schießen seyn als die Tigerkatzen, da es nicht lange vor den Hunden aushält, wenn es gebäumt hat. Azara bekam ein erwachsenes Exemplar lebendig welches nach 28 Tagen so zahm war, daß man es angreifen durfte. Den kurz aber dichtbehaarten Pelz braucht man zu Regenkappen über Gewehrschlösser und zu Mützen.

Der Puma (No. 21.) der schwarze Puma (Fel. nigra cf. suppl.) der Jaguarundi (No. 23.), Eyra, Pampa-Puma oder Pajeros bilden nebst dem zweifelhaften Stahl-Puma (vergl. S. 46. Z. 6.) eine eigne Gruppe oder Untergattung, welche Sir William Jardine unter dem Gattungsnamen Puma zusammengefaßt hat. Von letztgenannten Arten existirt noch keine Abbildung. — Temminck hält die einfarbige Katze, F. unicolor Traill für den Jaguarundi. Das Thier kam von Demerara, es ist 2 Fuß 8½ Zoll lang, der Schwanz 1 Fuß 8 Zoll, die Höhe über die Schultern 10 Zoll, alles im englischen Maaße.

24. Die Nepaulische Katze. Felis nepalensis Horsf. et Vig.

Französ.: Chat du Nepaul (aber nicht Geoffr. und Fr. Cuviers Thier dieses Namens vergl. No. 29.) — Engl.: Nepaul Cat.

Kennzeichen der Art: Schwanz mittelmäßig, dünn, an der Spitze grau, Rumpf röthlichgrau, an der Seite mit länglichen oder eckigen schwarzbraunen und lohfarbigen Flecken, welche hinten dunkler eingefaßt sind, Unterkehle ungefleckt, Hals zur Seite mit zwei gebogenen Binden und einem länglichen Querflecken, Kehle mit schmalen Binden, Wangen mit zwei schwarzen Linien und schwarzen Mondfleck bis zum Rachenwinkel.

Beschreibung. Eine schlanke Katze von 1 Fuß 10½ Zoll, Schwanz 10½ Zoll engl. Maaß. Sie hat also die Größe von der javanischen Katze (No. 20.) ist aber weit schlanker gebaut, auch ihr Schwanz länger und dünner, die Stellung der Flecken ist anders und sie haben hinten einen dunkelschwarzen Saum. — Das einzige existirende Exemplar in der Sammlung der Zoological Society, Broton Street in London, wurde von Farrer, Capitän der Ostindischen Compagnie eingesendet. Man hatte es in Calcutta aus Nepaul erhalten. Es lebte einige Zeit im Garten der zoolog. Gesellschaft, betrug sich aber äußerst unbändig. Meist traf man es sitzend, wie unsere Hauskatzen. Unsere Horsfieldische Abbildung giebt dies seltene Thier leider nur im (ziemlich schlecht) ausgestopften Zustande treulich wieder.

25. Die Kleinpfötige Katze. Felis manicalata Ruepp. Cretzschm.

Franz.: Félis ou chat ganté. — Engl.: the egyptien Cat.

Kennzeichen der Art: ockergelblich-grau, Wangen und Vorderhals weiß, dieser ockergelb gesäumt, Sohle und Hand- und Fußwurzeln schwarz; Schwanz schlank, gleich, an der Spitze mit zwei schwarzen Ringen.

Digitized by Google

Beschreibung. Größe einer mittelgroßen Hauskatze, um ein Drittheil kleiner als die europäische wilde Katze, der Schwanz verhältnißmäßig länger: 9 Zoll, 2 Linien, der Rumpf 1 Fuß 19 Zoll. Das wollige Grundhaar schmutzig ockerfarbig, nach dem Rücken zu dunkler, nach dem Bauche zu heller; Oberhaar schwarzbraun und schmutzigweiß geringelt, Lippenränderhaut, Augenliederrand und Nase schwarz; Bart und Augenbraunborsten glänzend weiß, an der Wurzel braun, Nasenwölbung dunkel ockerfarben, Iris im Auge feurig gelb. Acht schmale, schwarze Wellenlinien welche auf dem Scheitel entspringen, verlieren sich auf dem Oberhalse; Wangen, Kehle und Vorderhals sind glänzend weiß, von dem äußern Augenwinkel und der Mitte der Wangen entspringen zwei ockergelbe Linien, welche unter dem Ohre zusammenstoßen. Zwei solcher ockergelben Ringe umschlingen den weißen Hals, während sich ähnliche Flecke unter denselben zeigen. Brust und Bauch sind schmutzigweiß und mit denselben gelben Flecken oder Halbringen durchwirkt. Ueber den Rücken läuft ein dunkler Streifen, der lichter an den Schultern entspringt und dunkler auf dem Kreutze wird, sich allmählig in den obern Theil des Schwanzes verliert, dessen untere Fläche weißlichgelb ist und der am Ende zwei schwarze Ringe hat. Die Beine haben vorn 5—6 schwärzliche Bänder, hinten 6 dergleichen.

Diese Katze wurde von Rüppel in Nubien, auf der Westseite des Nils bei Ambukol in felsigten, buschigen Gegenden aufgefunden, auch Ehrenberg sendete dieselbe Art aus Nubien, vorläufig mit dem Namen F. dongolana bezeichnet nach Berlin.

Dr. Cretzschmar macht zuerst darauf aufmerksam daß diese Katze auch darum die Aufmerksamkeit der Naturforscher verdiene, weil sie mit Wahrscheinlichkeit diejenige sey, von welcher die Hauskatze der alten Egypter abgestammt habe. Aus den Katzenmumien und deren Abbildungen an den Monumenten von Theben erkennt man noch wie sehr sie diese Thiere verehrten. Ehrenberg bemerkt daß bei den Egyptern zwei ähnliche Arten, nämlich außer den gegenwärtigen noch die F. Bubastis: eine Mittelart zwischen unsrer wilden Katze (No. 27.) und dem Kirmyschack (No. 45.) mit langer Schnautze und mittelmäßigem Schwanz, heilig gewesen sey. Von letzterer spricht Hasselquist in seiner Reise nach Palästina S. 69. Der Kopf der Katzenmumie in der Description de l'Egypte, Antiquités II. pl. LI. Fig. 3. scheint hierher zu gehören; in derselben Abtheilung dieses Werkes findet sich pl. XLV. Fig. 14. eine Hauskatze, pl. LIV. Fig. 7. deren Skelet.— Auch unter den Varietäten der zahmen Katzen in Europa findet sich eine welche von jener egyptischen abzustammen scheint, sie ist weißgrau und hat die 8 Stirnstreifen, die beiden welche an den Wangen hinziehen und die zwei Brustringe so wie die Querstreifen und Bänder der Gliedmaßen, dieselbe Größe und den dünnen langen Schwanz.

26. **Die Hauskatze. Felis domestica Briss. — Männchen: Kater, Weibchen: Katz, Katze, Kätzin, Kietze, Kitze, Kitz. — junges: Kätzchen, Kätzel, Katzel.**

Altgriechisch: ὁ und ἡ Αἴλουρος. — Altlateinisch: Cattus, Gattus, Murilegus. — Altdeusch: Kot, Kotta, ♂ Kuder. — Franz.: le chat domestique, la chatte. — Engl.: the domestic cat. — Altengl.: cath. — Ital.: catto, catta. — Portug. und Span.: gato. — Schwed.: Katta. — Dänisch und Holländ.: Kat. — Polnisch: Kot. — Russ.: Koschka. — Illyr.: Kotschka.

Kennzeichen: wegen mehrfacher Abstammung der Abarten sehr veränderlich, eine Hauptrace (5.) welche am selbstständigsten scheint, zeichnet sich aus durch: fleischfarbene Lippen und Fußsohlen, vermischt sich aber mit den andern.

Digitized by Google

Was wir unter dem Namen der Hauskatze zusammenfassen ist, ein Gemisch von Thieren welche mit größter Wahrscheinlichkeit von mehreren wilden Arten abstammen, welche wir indessen nur für einige Raçen mit ziemlicher Gewißheit vermuthen können. Voraus ist es nothwendig die Raçen selbst zu sondern. *)

1) Die kleinpfötige Hauskatze: **F. maniculata**, von voriger Art abstammend, deren Beschreibung vergl. oben.

2) Die Karthäuserkatze, blaue oder Augsburger Katze: **F. domestica coerulea** Bchst. **Chat des chatreux.** Scheint von einer eignen Varietät der wilden Katze abzustammen, welche unter einer graublauen Farbe erscheint und z. B. in England noch vorkommt. Dahin gehört die Abbildung der wilden Katze in **William Jardines Felinae plate 29.** Das gezähmte Thier behält diese graublaue Farbe, hat sehr langes weiches Haar, schwarze Lippen und Sohlen, und ist sehr lebhaft, es wird vorzüglich in Augsburg und Nürnberg gefunden. Die sibirische bleigraue Katze welche Pallas beschreibt, steht ihr wahrscheinlich sehr nahe, und die türkische scheint zu dieser zu gehören. Nach Pallas werden in Rußland von schwarzen Katzen ebenfalls bleigraue, den sibirischen ähnlich, geboren.

3) Die Cyperkatze, gestreifte Katze: **F. dom. striata** Bchst. **F. dom. tigrina** Desmar. sonst **Catus syriacus.** Grau mit schwarzen Streifen welche über Kopf und Rücken gerade auslaufen, auf den Beinen krumm sind. Stammt vermuthlich von einer nicht genau bekannten, vielleicht von der von Schreber t. CVII. A. a. abgebildeten Varietät der wilden Katze, welche vielleicht eine eigne Art ausmacht, und von Pallas mitgetheilt worden war, ab. Sie wird jetzt überall cultivirt und ist wahrscheinlich orientalischen Ursprungs, auch im südlichen Rußland kommt sie zahm vor, aber Pallas vermuthet daß man sie dort eingeführt habe. Obige wilde, hat rostrothe Wangen, Lippen und ganze Unterseite weiß. Nach dem Pariser Museum stammt sie von **F. caffra No. 30.** ab.

4) Die Cumanische Katze: **F. dom. cumana.** Pallas erzählt daß am Cuma-Fluße und vom Caucasus Felle gebracht werden von 4 Spannen Länge, deren Schwanz anderhalb Spanne mißt. Der Pelz ist aschgraulich wie von den Cyperkatzen, oder aus gelblichgrauem Grunde, aschgraulich, so wie auch die zahme Katze vorkömmt, Rücken dunkler, Ohren gleichfarbig, innerseits weiß behaart. Vier schwarze Striche von der Stirn aus längsverlaufend, drei über den Nacken, einer über den ganzen Rücken gehend; Bändchen über die Seiten hin vom Rückenstreifen aus querüber bogig, an den Seiten etwas unterbrochen. Unten mit Wischflecken, in der weißlichgrauen Abänderung längs durch die Mitte weiß. Schwanz rund, zottig, an der Basis gleichfarbig, am Ende mit 3 immer breiter werdenden Ringen, welche so wie die Spitze schwarz sind. Beine mit schwarzbraunen Wischflecken, Sohlen graulichgelblich, Schnurren weiß.

5) Die spanische Katze: **F. dom. hispana**, ehedem **Catus vulgaris nostras.** Weiß und schwarz in großen Flecken wechselnd, bis zum ganz weißen und ganz schwarzen, die Weibchen auch dreifarbig, mit rostrothen Flecken oder ganz rostroth; Lippen und Sohlen fleischfarbig. Diese ist als die eigenthümlichste zahme Katze zu betrachten. Sie scheint von einer wilden Form des südwestlichen Europa, aus Spanien und Südfrankreich

*) Noch existiren von denselben wenig Abbildungen, so wie man sie überhaupt in Büchern wenig beachtet findet. Was wir gut abbilden können, werden wir künftighin zur Vervollständigung liefern.

Digitized by Google

verbreitet worden zu seyn. Die Kater kommen wahrscheinlich nicht dreifarbig vor, es sind sogar deshalb Täuschungen versucht worden, doch wird gesagt daß dergleichen wirklich existiren sollen.

6) Die angorische Katze: **F. dom. angorensis.** Sehr wahrscheinlich vom Manul (No. 32. 33.) abstammend, vergl. dessen Beschreibung und Abbildungen. Haar sehr lang, seidenartig, vom Bauche an oft bis zum Boden herabhängend, nur am Kopfe und den Pfoten kurz. Grau, bräunlich, weiß, auch gefleckt, Lippen und Sohlen fleischfarbig.

7) Die chinesische Katze: **F. dom. sinensis,** mit hängenden Ohren wie der Dachshund und langen hängenden seidenartigen Haaren. Abstammung wahrscheinlich von einer nicht naturhistorisch bekannten Katzenart in Ostindien oder China, die hängenden Ohren können sich durch eine Cultur von mehreren tausend Jahren so erzeugt haben wie bei den Hunden. Das Thier ist noch gar nicht genau bekannt. In der Provinz Po-chi-ly als Liebling der Damen gehalten.

8) Die malayische Katze: **F. dom. indica s. torticauda,** wurde von Sir Stamford Raffles im malayanischen Archipel angetroffen und zeichnete sich dadurch aus, daß ihre Jungen entweder Haarflechten oder knotige Büschel am Schwanze trugen. Eine ähnliche Abänderung soll auch auf Madagaskar vorhanden seyn.

9) Die nacktschwänzige Katze: **F. dom. nudicaudata s. paraguensis,** Haar kurz und dicht anliegend, Schwanz nackt.

10) Die kurzschwänzige Katze: **F. dom. brevicaudata s. japonica,** weiß, gelblich und schwarz gefleckt, der Schwanz kurz abgestutzt.

11) Die ungeschwänzte Katze: **F. dom. ecaudata in Cornwall und Isle of Man** häufig; ob von voriger als Race verschieden? —

12) Die Marder-Katze: **F. Foina-domestica.** Vielleicht Bastard. Im Dorfe **Nikolskoe** genannt **Beketofka** im Penser Gouvernement hielt man eine Katze welche oft in den nahen Wald lief und lange vom Hause wegblieb. Sie gebar einmal im J. 1790 drei Junge, darunter ein Weibchen, welche der Mutter ganz unähnlich waren und Fell und Pelz vom Steinmarder hatten. Pallas sahe sie alle lebendig und sagt von ihnen daß sie den Charakter von Bastarden getragen hätten. Das junge Weibchen belief sich mit einem gewöhnlichen Kater und gebar zwei schwarze und ein graues junges, fraß aber alle in wenig Tagen wieder auf. Die Beine jener Bastarden waren dünner als gewöhnlich und bis zum Rumpfe schwarz, die Schnautze etwas länger, schwärzlich bis über die Augen; ein Mondfleck vor den Ohren und der Scheitel gelblichgrau, Ohren ganz schwarz, Schwanz dreimal so lang als der Kopf, schwarz, die Haare (bei Ausstreckung) fast zweireihig. Rumpf ganz so gefärbt wie vom Steinmarder, etwas dunkler, besonders am Rücken; Unterhaar gelblichgrau-weißlich. Betragen und Geruch wie bei einer Katze, aber sie blieben sehr wild. Die Abbildung wird folgen.

Wenn wir bereits bei Beschreibung früher betrachteter katzenartiger Thiere gesehen haben, daß dieselben in hohem Grade zähmbar sind, so ist es nicht unwahrscheinlich daß die Zukunft noch verschiedene andere Racen von Hauskatzen mit dem Menschen in Berührung bringen dürfte. Indessen ist diese Berührung immer weit weniger innig als die mit dem Hunde, denn während der Hund seinem Herrn gehört, so kann man von der Katze nur sagen daß sie dem Hause ihres Herrn angehört und leicht ihn, schwerer und nicht freiwillig dieses verläßt, ja meilenweit wieder nach ihrem alten Wohnorte

Digitized by Google

zurückkehrt, wenn man sie entfernt hatte. Dagegen ist sie von da nicht zu vertreiben, wo sie sich eingewöhnt hat. Mit diesen Umständen ist es auch übereinstimmend daß wir die zahmen Katzen nur bei den Völkern finden, welche Häuser bauen, bei den Nomaden aber größtentheils diese Thiere gänzlich vermissen. Die Zähmung der Katzen scheint auch überhaupt, wenigstens in Europa nicht in das früheste Alterthum zurückzugehen. Die Griechen kannten sie wenig, Aristoteles u. a. griechische Naturforscher erwähnen derselben nur mit wenigen Worten, und nur von den Egyptern erfährt man durch Herodot *) daß diese sie (nämlich F. Bubastis und maniculata, s. oben) göttlich verehrten; lief indessen eine Katze über den Weg so galt dies schon im Alterthume für ein böses Anzeigen **). Die Seltenheit der Katzen war in Europa noch im eilften und zwölften Jahrhundert so groß, daß damals eine gute Mausekatze in hohem Preise stand. In Petersburg ist dies auch jetzt noch der Fall und in London hält man deren drei Millionen. Die **Leges Walliae** oder die Walliser Gesetzsammlung enthält noch eine Werthbestimmung für die Katzen von jedem Alter und nach Maaßgabe ihrer Eigenschaften und Leistungen, so wie die bestimmten Strafen auf Mißhandlung, Verstümmelung und Tödtung derselben. Alte Heldenvölker führten sie auch als Bild der Freiheit in ihren Wappen und Fahnen. Die Europäer haben sie nach und nach in alle Gegenden der Welt verbreitet, wobei dieselben sich kaum verändert haben. So sind nach Bosmann die in Guinea noch ganz so wie sie in Holland waren, die amerikanischen Hauskatzen sind auch offenbar noch die spanischen und eben so die gewöhnlich (außer der 8ten Raçe) auf Madagaskar vorkommenden keiner Veränderung unterworfen gewesen. Man hat in der Vorzeit die Raçen und sogar Arten der Thiere zu voreilig als Produkt klimatischer Einflüße erklärt.

Die gewöhnlich vorkommenden zahmen Katzen gehören zur dritten und fünften Raçe, auf sie bezieht sich vorzüglich was hier noch gesagt wird.

Die Größe ändert, so daß man die Mittelgröße zu anderhalb Fuß oder um ein Drittheil geringer annehmen kann, als die der wilden Katze. Das Haar ist weit kürzer als bei dieser und der Schwanz verdünnt sich auffallender; auch die Beine sind dünner, doch stärker und kürzer als bei der ersten Raçe. Auf der Oberlippe stehen dicke und steife Borstenhaare in 4—5 Reihen, über jedem Auge 3—6 längere und mehrere kürzere Borsten in einem Büschel beisammen, auf jedem Backen 2 kurze. Der Kater läßt sich schon durch seinen dicken Kopf von der Katze unterscheiden, so wie überhaupt sein ganzer Körper kräftiger gebaut ist. Der Mechanismus für die eigenthümliche, leichte Beweglichkeit so wie der für das Rauben, ist derselbe welcher den früher betrachteten Arten zukommt und wird bei den Kennzeichen der Gattung beschrieben werden.

Was die Lebensart der zahmen Katze betrifft; so sind von derselben manche Eigenheiten bekannt, welche dies Thier um so mehr von allen übrigen gezähmten unterscheiden, je mehr diese überhaupt von den Gattungskennzeichen der Katzenthiere abweichen. Die Hauskatze ändert bei der nur sehr beschränkten Erziehung welcher sie sich in Berührung mit Menschen unterwirft, ihr Naturell wenig, sie liebt die Freiheit und Einsamkeit und sucht sich besonders zur Nachtzeit, welche ihr überhaupt für ihre Thätigkeit, vermöge ihrer bei Tage länglichen Pupille, die nur zur Nachtzeit rund wird, mehr

*) In Euterpe sive II. 66. seq. — Cicero de leg. l. II
**) Herald ad Martial. VII. epigr. 86.

Digitized by Google

angewiesen ist als der Tag, vom Wohnhause zu entfernen. Immer schleichend, lauschend und horchend, merken sie auf alles was sich bewegt, und das geringste Geräusch erweckt ihre Mordlust, so daß die Katze unter den Säugethieren offenkundig eine Feindschaft gegen alles Lebendige repräsentirt. Bei der ersten Wahrnehmung eines lebendigen Wesens, steht sie still und stutzt, gewöhnlich mitten im Laufe, meist die rechte Vorderpfote hebend, oder niedergeduckt und liegend starrt sie unverwandten Auges hin auf die bewegte Stelle, bei Wiederholung des Geräusches oder der Bewegung thut sie einen schnellen Sprung und meist augenblicklich ist die Beute von ihr überwältigt. Ihr Jagen auf ein fliehendes Thier geschieht in weiten Sätzen, wobei sie den Schwanz oberwärts richtet. Dies sieht man nur vor dem ersten Angriffe, denn was ihr nach gemachtem Angriffe entgangen, verfolgt sie so wenig, als andere katzenartige Thiere dies thun. Vor größern Thieren, z. B. starken Hunden flieht sie in schnellem Laufe, gewöhnlich erst nachdem sie sich zur Wehr gesetzt hat. Dies geschieht indem sie sich hochbeinig hinstellt, die Vorderbeine vorwärts ausstreckt, den Rücken krümmt, das Haar sträubt, die Ohren zurücklegt, den Schwanz heftig bewegt, den Rachen aufsperrt, zischt und spuckt, endlich bei jedem Angriffe sich der Vorderpfoten zu Hieben bedient, um dem Feinde damit eine Kratzwunde zu versetzen. Auf der Flucht senkt sie die Augen nieder, legt die Ohren zurück, zieht den Schwanz ein und macht weite Schritte mit niedergedrückten Rumpf, sie sucht dann entweder in ein Versteck zu gelangen oder an einen Baum, an einer Planke in die Höhe zu klettern, was bei Einhakung der Krallen mit großer Behendigkeit geschieht. Sehr geschickt und schnell laufen sie, besonders zur Nachtzeit auf den schmalsten Latten und Stangen herum, und sind im Stande weite Sprünge zu machen. Bei jähen Sprüngen macht sie den Rücken ganz krumm, spreizt die Glieder auseinander und hält den Schwanz gleichsam als Steuerruder empor, so gelingt es, daß sie aus bedeutenden Höhen herabfallend, im Falle sich sogar im Bogen herumdreht und doch endlich auf die Beine auftritt, wonach sie dann sich zu schütteln und schnell fortzulaufen pflegt. Ihr Geruch ist weniger fein als der der Hunde, allein desto feiner ist bei ihr Gehör und Gesicht, letzteres besonders in der Dämmerung, während im Sonnenscheine ihre Pupille sich zusammenzieht. Das Leuchten, oder richtiger gesagt das Funkeln des Katzenauges ist nichts anders als das Glänzen und Reflectiren der Farbenfläche (tapetum) auf der Aderhaut im Auge, weshalb man das Licht nur in der Richtung sieht, in welcher man senkrecht in das Auge hineinblickt, in schiefer Lage schwindet es, noch weniger sieht man es im Profil, wodurch bewiesen ist, daß kein Licht vom Auge ausströmt. Ganz dasselbe Funkeln sah ich auch an drei gezähmten Fischottern. — Bei der Angewöhnung an die Sitten der Menschen sehen wir die meisten Katzen auch am Tage thätig, indessen ist dies kein Vergleich gegen ihre behende Beweglichkeit und Unruhe zur Nachtzeit, wo sie ihrer Nahrung und Paarung vorzugsweise nachzugehen pflegen, so daß wir sie doch häufiger am Tage schlafend und ruhend erblicken. Sie schläft auf der Seite liegend, den Kopf nach dem Bauche gerichtet, Beine und Schwanz eingezogen; nach dem Erwachen aus ihrem Schlafe, welcher so sanft ist daß jedes Geräusch sie zu wecken vermag, stellt sie sich hochbeinig, macht einem Katzenbuckel, hebt den Schwanz und dehnt sich einigemal aus. Ruhend sitzt sie auf den Hinterbeinen, hält die Vorderbeine aufrecht und schlägt den Schwanz um diese herum.

Das bekannte Miauen ist die Stimme des Verlangens, der Ton ihrer Behaglichkeit oder Zutraulichkeit ist das rru-rru oder Schnurren, oder Spinnen, weil man es mit

Digitized by Google

dem Geräusch eines Spinnrades vergleicht; ihr Ziſchen und Blaſen im Zorn und die melancholiſchen Töne bei der Paarung ſind gleichfalls bekannt und werden allgemein für ſo unangenehm gehalten, daß die Katzenorgel *) keine weitere Nachahmung gefunden und die Katzenmuſiken ſo wenig harmoniſch als ehrenvoll genannt werden können.

Der elektriſche Zuſtand der Katzenhaare kann an allen Katzen, aber nur in vollkommen trockner Atmosphäre, beſonders bei großer Kälte und zur Laufzeit im Januar und Februar beobachtet werden, wo der mit trockner Hand rückwärts geſtrichene Pelz, vorzüglich eines ſchwarzen Katers, Fünkchen ſprüht und kniſtert. Die Erſcheinung gehört jedoch unter diejenigen, welche weit häufiger beſchrieben als geſehen und oft übertrieben worden ſind. Dieſer elektriſche Zuſtand mag indeſſen die Urſache ſeyn, daß manche Perſonen eine Unbehaglichkeit in der Nähe der Katzen empfinden. So erzählte Petit in ſeinen Vorleſungen daß er eine Frau gekannt, welche ſich ſtets übel befunden ſobald, auch ohne daß ſie es gewußt habe, in einem Zimmer ſich eine Katze befunden. Daſſelbe weiß man noch vom König Stanislaus von Polen und die Beiſpiele unter den Lebenden ſind nicht ſelten. Die Katzen ſelbſt haben Vorgefühl von elektriſchen Entwicklungen in der Atmosphäre und werden deshalb vor Gewittern und Erdbeben unruhig. Wie ſehr die Katze die Reinlichkeit liebt, zeigt ſie ſtets ſo lange ſie geſund iſt, und man muß jede unreinliche Katze für krank halten. Sie meidet nicht nur allen Schmutz ſondern auch die Näſſe die ihr durchaus zuwieder iſt. Mit großer Geſchicklichkeit putzen ſie mit den Pfoten ſich ſelbſt ab, wobei ſie dieſelben mit Speichel benetzen um ſich da zu reinigen wohin ſie durch Lecken mit der Zunge nicht zu gelangen vermögen. Ihren Koth entfernten ſie möglichſt weit von ihrem Lager (wie die Marder, Iltiſſe und andere Raubthiere) an verborgenen Orten, oder ſcharrten ihn ein. Ebenſo iſt es mit dem Urin. In Zimmern halten ſie denſelben, wenn ſie nicht entlaufen können außerordentlich lange an und entledigen ſich deſſelben nur im höchſten Zwange der Natur. Sie lieben ferner den Tag über die Ruhe und Wärme, legen ſich gern an erwärmte Stellen und Feuerheerde und ſollen dadurch ſchon Köhlchen im Pelze weggefangen und verbreitet haben.

Die urſprüngliche Nahrung der Katzen beſteht in lebendigen Thieren, in friſchem Fleiſche, in der Gefangenſchaft gewöhnen ſie ſich an die zubereitete Nahrung der Menſchen, geben aber doch immer dem Fleiſch und der Milch den Vorzug. Gehen ſie ins Freie auf Beute aus, ſo verfolgen ſie wie geſagt alles was lebt, was ſich bewegt und nicht zu kräftig iſt. Sie verſchmähen daher auch kleine Thiere nicht und jedes Inſekt welches ihnen aufſtößt macht ſie aufmerkſam, jede Fliege wird von der Katze verfolgt, im Freien fängt ſie Heuſchrecken, Käfer und Nachtſchmetterlinge, ſo daß ſie oft in Häuſern die böſen Schaben (**Blatta orientalis**), — in Gärten und Wäldern die Maikäfer (**Melolontha vulgaris**) oder auf den Feldern die ſchädlichen Hopfenſchmetterlinge (**Hepiolus humuli**), in Menge fängt, ſie frißt die Leiber und wirft die Flügel dann weg. Es iſt höchſt unterhaltend eine Katze im Freien zu beobachten, wo viele Inſekten und andere Thiere vorkommen, nichts kann ihre Aufmerkſamkeit und die Geſchwindigkeit übertreffen, womit ſie nach allen Seiten hin ihre gefälligen Bewegungen ausübt. Eine Lieblingsſpeiſe bieten ihr die Hausmäuſe, Ratten, kleine Vögel, Eier und Fiſche. Katzen welche ſich die Fiſche ſelbſt aus dem Waſſer fangen, ſind ſelten, da ihre Scheu vor dem Waſſer ſo groß iſt. Mit ſchwachen Thieren pflegt ſie nach dem Fange zu ſpielen.

*) Umſtändlich beſchrieben in Krünitz Encyclopädie Theil 36. S. 205—9.

Digitized by Google

Durch Verzärtelung und zu gute Nahrung entwöhnt sie sich vom Fange der Mäuse, doch sind die Individuen hierin verschieden. Ratten werden nicht von allen Katzen gefangen, noch weniger gefressen, was ihnen auch schädlich seyn soll, weshalb man der Katze nach solchem Genuß gewöhnlich ein Stückchen Butter oder Speck als Reinigungsmittel zu geben pflegt. Flüssige Speisen genießen sie leckend, salzige lieben sie nicht und zu warme umgehen sie, bis sie erkaltet sind. Sie kauen schwer und schütteln den Kopf sobald sie etwas nasses berühren, sie saufen oft, aber wenig auf einmal. — Merkwürdig ist bei Betrachtung ihres Geruches, die ihnen eigene Neigung für gewiße Gewächse, welche starkriechende ätherische Oele enthalten, nämlich das sogenannte Marumverum (Teucrium Marum L.) die Katzenminze (Nepeta Cataria) und den Baldrian (Valeriana officinalis). Ersteres kommt in unsern Gärten vor, das andere wächst auf Schutt, an Wegen und in Gärten, letzteres in Wäldern vorzüglich in bergigen Gegenden und wird in Thüringen auf dem Felde gebaut, wo ich oft einzelne Pflanzen ebenso durch Katzen vertilgt sahe wie sie die Exemplare von jenen beiden Pflanzen in Gärten zu vertilgen pflegen. Sie werden wie unsinnig, sobald sie den Geruch genossen, wälzen sich auf der Pflanze herum, zerstören sie bis nichts mehr übrig ist, vom Baldrian graben sie selbst die Wurzeln aus und werden auch durch die Wurzel allein, welche man ihnen hinwirft, ebenso heftig aufgereizt. Die Gartenraute (Ruta graveoleus) ist ihnen dagegen zuwieder und sie verschonen die Gegenstände, welche man mit den frischen Blättern derselben gerieben hat.

Die Paarungszeit der Katzen tritt jährlich zweimal ein, zu Ende Januar bis in den Frühling und dann wieder im Herbste, bisweilen auch dreimal. Die Laufzeit dauert bei jeder etwa 9 Tage und die Kitzen sind in dieser Zeit am unruhigsten. Sie versammeln sich zur Nachtzeit in der Mehrzahl um einen Kater herum und reizen ihn durch klägliches Geschrei, durch Betastung, heftige Angriffe und Bisse. Kommen mehrere Kater zusammen, so streiten auch diese untereinander und immer heftiger wird der Lärm und immer gräßlicher tönen die Stimmen. Die Begattung geschieht gänzlich im verborgnen Dunkel der Nacht, während der Kater die Kitze in den Nacken beißt. Die Kitze trägt etwas über 8 Wochen gewöhnlich 55 Tage und gebiert dann auf der Seite liegend und mit dem Maule sich selbst Hülfe bringend 4 — 6, selten mehr, höchst selten sogar bis 12 Junge an einem verborgenen Orte, diese bleiben 9 Tage blind und die Kitze ist vorzüglich besorgt, sie vor den Nachstellungen des Katers zu schützen, welcher sie gern auffrißt. In seltnen Fällen frißt die Kitze unmittelbar nach der Geburt wo sie ohnedies die Placenta aufzufressen hat, auch eines oder das andere von den Jungen mit. Vorfallende Mißgeburten verzehrt die Mutter instinctmäßig, sobald sie sie nicht als wohlgebildete Kätzchen erkennt. Ihre Mutterliebe entwickelt sich indessen von Tag zu Tag mehr, sie schützt und verbirgt ihre Jungen sorgfältig, trägt sie im Maule fort wenn sie entdeckt werden und sie Gefahr für sie fürchtet, säugt sie fleißig und bringt ihnen bald nachdem sie sehen gelernt Mäuse, Vögel und andere lebende Thiere mit denen sie zu spielen beginnen. Ein Engländer erzählte sogar daß neuerlich beobachtet worden sey: eine Katze habe kurz vor ihrem Gebären eine Anzahl Mäuse und junge Ratten zusammengefangen, ihnen die Beine gelähmt und sie so gefangen gehalten. Man entdeckte es als eine von den Ratten entkam. Wenn der Katze die Jungen genommen werden, so wird sie traurig und säugt bisweilen andere Thiere, man will sogar Beispiele wissen und erzählt mit genauer Angabe der Umstände, auch vom Säugen einer Maus in

Digitized by Google

Jesse's gleanings, eine fast unglaubliche aber als wahr bezeugte Geschichte, welche wenigstens zu ferner Beobachtung veranlassen kann.

„Diese Katze gehörte dem Hrn. Smith, dem Gerichtshalter des Hrn. Carl Lucan zu Lalcham. Sie lag gewöhnlich auf der Decke vor dem Kaminfeuer. Man hatte ihr von allen ihren Jungen nur ein einziges gelassen und wahrscheinlich wurde sie von der Milch beläſtigt. Ich erwähne dies um das folgende einigermaßen zu erklären. Eines Abends, als die Familie um das Feuer saß, bemerkte man eine Maus, welche von dem Schranke neben dem Kamine nach der Katze hinlief und sich an ihren Leib legte, wie es ein junges säugendes Kätzchen zu machen pflegt. Erstaunt über diesen Anblick, und aus Furcht, die Maus, welche eine alte zu seyn schien, zu stören, konnte man auf der Stelle sich nicht überzeugen, ob sie sauge oder nicht. Nachdem sie ziemlich lange bei der Katze geblieben war, kehrte sie zu dem Schranke zurück. Diese Besuche wiederholten sich bei mehren andern Gelegenheiten, und viele Personen waren Zeuge davon. Die Katze schien nicht allein die Maus zu erwarten, sondern sie ließ auch jenen schnurrenden oder spinnenden Begrüßungston hören, welchen dieses Thier bekanntlich, wenn es von seinen Jungen aufgesucht wird, von sich giebt. Die Maus schien in der That an der Katze zu saugen, aber sie war dabei so wachsam, daß sie sogleich die Flucht nahm, wenn Jemand die Hand ausstreckte sie zu ergreifen. Kam die Katze nachdem sie draußen gewesen, wieder in das Zimmer, so ließ sie ihre einladende Stimme hören, und die Maus kam zu ihr. Die Anhänglichkeit, welche zwischen diesen beiden, so wenig zu einander passenden Thieren statt fand, war nicht zu verkennen, und dauerte eine Zeit lang. Das Schicksal der Maus war, wie das der meisten Lieblinge, traurig. Während der Abwesenheit ihrer Ernährerin kam eine fremde Katze in das Zimmer. Die arme Maus sah sie für ihre alte Freundin und Beschützerin an, lief ihr entgegen und wurde sogleich ergriffen und getödtet, ehe man sie retten konnte. Die Trauer der Pflegemutter war außerordentlich. Als sie in das Zimmer zurück kam, rief sie auf die gewöhnliche Weise, aber die Maus kam ihr nicht mehr entgegen. Sie war in beständiger Unruhe und Kummer, miaute um das Haus herum und äußerte ihre Trauer auf die deutlichste Weise. Merkwürdig ist hierbei noch besonders, daß diese Katze fast eine vortreffliche Mäusefängerin ist und während der Zeit wo sie eine so große Anhänglichkeit für jene Maus verrieth, andere mit der größten Begierde verzehrte." — In Elford bei Lichfield hatte Rev. Mr. Sawley junge Hasen vom Felde mitgebracht, um sie aufzuziehen, da er den alten geschossen hatte. Die Hauskatze, welcher eben ihre Jungen genommen worden waren, lief auf sie zu und man glaubte schon sie würde sie auffressen, als sie sich ganz ruhig niederlegte, ihnen ihre Milch bot, und sie so Mutterstelle bei ihnen vertrat. — Anderwärts hatten eine Katze und eine Hündin zugleich Junge bekommen, die Hündin ging einmal aus dem Hause und kehrte nicht wieder zurück, da man sie weggefangen oder getödtet haben mochte. Die Katze begab sich zu den jungen Hunden und säugte sie. Nach zwei Tagen entdeckte man die jungen Katzen so abgemagert, daß sie bis auf eine starben, diese erzog die alte in Gesellschaft mit den Hunden zugleich. — Bei den Spielen der jungen Katzen bemerkt man immer deutlicher die Entwickelung ihrer Naturtriebe und ihres Charakters und die hauptsächliche Uebung besteht bei ihnen im Gebrauche der Krallen, das Herausstrecken derselben aus ihren Scheiden, so wie das Zurückziehen der Krallen, wird immer versucht, daher das Kratzen und Häckeln während der vielfachen Sprünge und geschmeidigen Bewegungen des Leibes und der Gliedmaßen

Digitized by Google

auch bei der ersten Ausdehnung nach den Schlafe, stets zu bemerken ist. Ihr Wachsthum dauert 15 bis 18 Monate, dessen ungeachtet sind sie schon vor Auslauf des ersten Lebensjahres zur Fortpflanzung fähig und bringen ihr Alter auf 10 Jahre und darüber. Kastrirte Katzen werden älter, aber bald fett und faul, in gesitteten Ländern ist überhaupt diese Operation nicht üblich.

Die geistigen Fähigkeiten der Katzen sind nicht denen der gelehrigen Hunderacen gleichzustellen, alles geht bei ihnen immer nur auf Befriedigung natürlicher Triebe, die allerdings bei der bessern Erziehung veredelt werden können, so daß in dieser Hinsicht die Individuen so verschieden sind als die Art der Behandlung welche sie genossen. Es ist durchaus nicht zu leugnen daß sie großer Anhänglichkeit an den wohlwollenden Wärter fähig sind, allein bei dennoch eintretender Züchtigung überwiegt ihr Zorn uud sie vergessen in solchen Augenblicken die Zuneignng zu ihrem Wohlthäter, deshalb nennt man sie falsch, während sie nur unfähig sind, nach menschlichen Sittengesetzen ihren innern Trieben zu wiederstehen. In Edinburg hatte ein Nachtwächter in St. James Square eine Katze welche ihn bei seinen nächtlichen Umgängen regelmäßig begleitete, und mit dem Schlage der Stunde auf ihrem Posten sich einfand. Die rührende Anhänglichkeit der Katze des Henry Wriothesly, welcher Freund und Gefährte des Carls von Suffex in seinem Aufstande war, und nicht wenig erstaunte als ihn in seinem Gefängnisse diese durch den Schornstein gekommene Katze besuchte, ist durch Pennant bekannt genug. Beweise langer Rückerinnerung geben sie durch Rückkehr in das gewohnte Haus aus weiter Ferne. Eine schöne Katze wurde aus Glasgow mit nach Edinburg, 10 Stunden weit mitgenommen und warf bald junge. Man ließ ihr zweie davon. Eines Morgens vermißt man sie und eines ihrer Jungen. Nach vierzehn Tagen schrieb man aus Glasgow die Ankunft der höchst abgezehrten, ermatteten Katze mit einem Jungen im vorigen Wohnhause. Sie hatte auf dem weiten Wege vielleicht eine Woche zugebracht und tausend Unfälle zu vermeiden gehabt um ihr Junges zu retten. Man pflegte und fütterte sie wieder so, daß sie bald wieder zu Kräften kam, aber dann auch wieder die Reise nach Edinburg glücklich vollendete. Hier kaum wieder gestärkt, nahm sie das zweite jetzt selbst laufende Junge mit leichterer Mühe mit sich in die gewohnte Heimath nach Glasgow. Ob irgend ein Thier eine größere Mutterliebe oder kräftigere Rückerinnerung zu beweisen im Stande sey, möchte man wohl hierbei bezweifeln müssen. Ihre Kenntniß von Lokalitäten entwickelt sich sehr bald und ein entdecktes Mauseloch oder Vogelnest weiß sie in großer Entfernung wieder zu suchen und ermüdet nicht Stunden lang dabei Wache zu stehen, oder liegend davor zu lauschen.

Das zähe Leben der Katzen ist sogar zum Sprichworte geworden und ebenso abhängig von der besonders auffallenden Stärke ihrer Nerven, wie wahrscheinlich ihre Empfänglichkeit für Elektrizität. Jene Nervenstärke beschleunigt ihre Reife zur Paarung, sie macht sie weniger empfindlich gegen die Leiden des Gefäßsystems und läßt sie Durst und Hunger, Mangel an Luft und Wärme ertragen. Nur ein Beispiel. Als man vor einiger Zeit in Leith (in Südschottland) einen Ballen russischen Flachs öffnete, welcher bekanntlich vor Absendung durch Maschinen zusammengepreßt wird, so sprang aus der Mitte desselben eine Katze heraus. Sie war so munter als jede andere gesunde Katze und hatte dennoch in einem höchst zusammengepreßten Zustande, denn der Raum ihres Lagers betrug etwa den vierten Theil ihres gewöhnlichen Umfanges, ohne Luft und Nahrung sich 28 Tage auf der Reise von Petersburg nach Leith befunden. Vor

Digitized by Google

einigen Jahren stürzten Knaben in Weimar eine Katze von der Höhe des Jacobsthurmes, welcher sie eine Schweinsblase angebunden hatten, sie drehte sich im Fallen immer im Kreise und kam auf die Füße zu stehen, die Blase wurde ihr abgebunden, und sie lief eiligst davon.

Die Krankheiten der Katzen finden wir in unsern Naturgeschichten gewöhnlich nur mit wenigen Worten berührt. Man pflegt sie nicht so zu beobachten wie die der Hunde, weil die Katzen sich weniger unserer Aufsicht überlassen und wenn sie krank sind verbergen, ihnen auch Arzneien nur schwer beizubringen sind; dann auch wohl deshalb, weil diese Thiere im Allgemeinen heut zu Tag wenig geachtet werden. Der Gegenstand bleibt dessenungeachtet für das praktische Leben beachtungswerth. — Die Wuth ist die fürchterlichste Krankheit der Katzen, obwohl sie ihnen vielleicht nur durch Bisse von Hunden und Füchsen beigebracht wird. Sie bringt dieselben Erscheinungen und Folgen hervor wie die Hundswuth. Die gebissene, oder sonst von der Wuth befallene Katze wird traurig ohne ferner von ihren Umgebungen Kenntniß zu nehmen, sie verliert den Appetit, säuft auch keine Milch mehr, bekommt bald Schaum um das Maul, wird endlich unruhiger, springt plötzlich auf, rennt über Treppen auf- und abwärts, und dreht sich im Wirbel herum. In solchen Falle ist stets das Tödten des Thieres anzuempfehlen und alle Versuche mit Arzeneien würden nicht ohne große Gefahr seyn, für den Menschen der sich damit ihr nähren wollte. Wo Arsenikdämpfe aufsteigen, welchen die Katzen ausgesetzt sind, bildet sich eine der Wuth ähnliche Krankheit, sie liegen einige Tage still, erbrechen sich dann heftig und drehen sich im Kreise herum, laufen auf und nieder und schreien fürchterlich zwischen wechselnden Convulsionen. Man empfiehlt hier das Begießen mit kaltem Wasser, obwohl eine innere Anwendung von Mitteln gegen Arsenik überhaupt, nützlich seyn könnte, weshalb auch bei jener Behandlung fast alle sterben. Wuthähnliche Erscheinungen treten bisweilen als Milchfieber ein, wo die Absonderung der Milch durch Verhärtung der Brustdrüsen gehemmt ist. Durch Lecken wissen sie diese wieder zu erweichen und meist heilen sie leicht ohne daß man mit erweichenden Mitteln ihnen beisteht. Nach Wegnahme der Jungen folgt jene Verhärtung oft und ein Bestreichen der Milchdrüsenstellen mit Oel oder Butter ist anzuwenden wenn sich das Thier nicht durch das Lecken selbst heilt. Die Raude oder Räude entsteht bei den Katzen zuerst im Gesicht. Sie verlieren hier die Haare, kahle Flecken werden schuppig oder wohl gar rissig, und verbreiten sich nach und nach über den ganzen Leib, so daß die Katze ein häßliches Ansehen annimmt. Da diese Krankheit in Folge schlechter Haltung und schlechter Nahrung, wohl gar aus Mangel derselben entsteht, so ist sie auch im Anfange noch durch Reinlichkeit und bessere Fütterung zur heben. Besonders dient das öftere Waschen des Thieres mit lauem Regenwasser worin man Waizenkleie und Klettenwurzel gekocht hat, oder mit lauem Seifenwasser. Nach diesem Abwaschen bringt man das Thier auf ein erwärmtes Lager, am besten hüllt man es in eine wollene Decke. — Arsenikvergiftung kommt bei den Katzen nicht selten vor, wenn sie Mäuse oder Ratten gefressen die von dem ihnen gesetzten Gifte bereits genossen hatten. Die Katze erbricht sich bald nach dem Genusse einer solchen Maus heftig und es wird nothwendig um die Katze zu erhalten, ihr vor allen andern Mitteln, Seifenwasser in den Hals zu schütten, welches das specifische Mittel ist, um den Arsenik zu zersetzen. Sobald dies geschehen, nöthige man sie auch zum Einnehmen von Leinöl oder Milch in möglichster Menge. Auch äußerlich wasche man sie, besonders auch am Unterleibe mit

Digitized by Google

Seifenwasser oder warmen Oel mit Opiumtinctur und bringe sie auf ein warmes Lager. — Die eigenthümlichste Krankheit dieser Thiere ist die vorzugsweise genannte Katzenseuche, eine epizootische *) Krankheit von der Natur eines schnell vorlaufenden gastrisch-nervösen Fiebers, welches bisweilen sehr heftig unter ihnen wüthet und so z. B. in den Jahren um 1750 in Paris (Joubert) und gegen Ende des verflossenen Jahrhunderts, besonders im Herbst und Winter 1797 in mehreren Gegenden Europa's vorkam. In Kopenhagen starben damals in vier Wochen 7000 Katzen, dann zog diese Epizootie über Wien, Leipzig und Pavia, in welcher letztern Stadt das Sanitätscollegium eine Beschreibung darüber herausgab (**Memoria sull 'attuale epidemia de' Gatti. 3 plag. in 4. Ticini.**) Im J. 1798 herrschte die Seuche in Görlitz, beschrieben von Knebel in der Lausitzischen Monatsschrift März 1799. S. 151—164. Dann hat sie Wiedemann im Archiv für Zootomie I. 2 St. beachtet, und F. A. Hund in lateinischer Sprache (**Fried. Aug. Hundius: morbi epizootici felibus anno 1797. fatalis historia. Dist. inaug. Vitebergae d. 16. Dec. 1800.**) darüber berichtet. Sobald die Krankheit beginnt wird die Katze traurig, schläfrig und unruhig und ängstlich-furchtsam, sie hört auf ihrem Herrn zu folgen und versteckt sich, oft an entlegnen Orten des Hauses. Man bemerkt an ihrem Gange die Schwäche die sie befallen, mit Mühe schleppt sie sich fort und nimmt weder Getränk noch Nahrung, ja sogar die höchsten Reize für sie, Marumverum, Baldrian und Katzenmünze rühren sie nicht mehr, höchstens leckt sie noch einige Tropfen frisches Wasser. Sie fängt an sich zu erbrechen, mit vielem Würgen entleert sie vor mehrern Stunden genossene Speise in unverdauten Ballen. Bei steigender Krankheit nimmt die Kraft des Blutumlaufes in gleichen Maaße ab, als sich die Folge davon, die Schwäche sich zusehends vermehrt, der Athem wird immer kürzer und ängstlicher, ein kurzes leises Hüsteln und Kutzen folgt, das Herz strengt sich an zur Bewegung, der kleine, härtliche, häufige Puls deutet aber auf die Unmöglichkeit das Blut durch den Körper zu treiben und die Kälte des Körpers unterbricht sich nur in kurzen Momenten durch brennende Hitze. Jetzt wird die Katze betäubt, kann nicht mehr gehen und liegt bewegungslos oder wirft den Leib von einer Seite zur andern, der schwere Kopf hängt zur Erde, der Hals ist gestreckt, der Schwanz eingezogen, die Haare struppig, die Ohren kalt und schlaff, die Augen matt und traurig ohne den gewöhnlichen Glanz, die Pupille verengert. Manchmal setzt sich das Erbrechen unter heftiger Anstrengung und bellendem Keuchen fort, oder es läuft eine weißlichgrünliche, schaumige Materie aus dem Maule, die Zunge ist mit gelbem Schleime belegt und der Leib gänzlich verstopft. Der Zustand dauert oft nur einen, bisweilen zwei oder drei Tage, die Kräfte schwinden immer mehr, die Empfindnng für die Eindrücke der Außenwelt geht gänzlich verloren. Convulsivischer Schlucken quält das Thier, welches deshalb nicht mehr liegen kann, sodann die Beine umbeugend, sich auf die Knie zu stützen versucht, der Leib wird aufgetrieben, Würgen ohne Erfolg dauert fort und die Kälte nimmt immer mehr überhand bis es stirbt, was am vierten oder fünften Tage gewöhnlich geschieht. Häufig sind dabei andere Erscheinungen, oft vorzüglich Verbindung mit Wurmleiden, wo sie dann oft Würmer ausbrechen. Jüngere Katzen unterliegen der Krankheit fast ohne Ausnahme. Zeichen der Genesung sind die Annahme von Trank und Speise in der zweiten Periode der Krankheit, in welcher schon Bewußtlosigkeit ein-

*) Durch Ansteckung sich häufig verbreitende, was man unter den Menschen Epidemie nennt.

Digitized by Google

trat, dann kehrten die Kräfte und mit ihnen die Gesundheit nach wenigen Tagen zurück. Sobald aber bis zum vierten und fünften Tag keine Annahme von Speise erfolgte, ist keine Rettung mehr zu hoffen. Die Section deutet nur auf das gänzliche Unterliegen des Herzens und der Lungen und des von beiden abhängigen Blutumlaufes. Reizmittel retteten deshalb einige schon erkrankte. Die Aerzte in Pavia brachten die kranken Katzen auf einen erhöhten Ort in den Genuß einer reinen, freien Luft und gaben ihnen Thee von Baldrian, Katzenmünze und Marumverum zu trinken, entweder mit Wasser oder mit Wein aufgegossen. Auch wurde Aloe mit Nutzen angewendet, mit Knoblauchsaft in Branntwein aufgelöst, so wie auch guter Wein, der in Italien wenig kostet. Essigdämpfe erwiesen sich ebenfalls nützlich. In Holland gab man Weingeist mit Milch Löffelweise, doch beförderte dies Mittel nur das Wurmerbrechen und den Schlaf, ohne zu retten, weshalb man Theriakpillen von der Größe einer Haselnuß anwendete, von denen man eine, und bald nachher einige Löffel laue Milch eingab. Diese Arznei machte anfangs Unbequemlichkeiten, am andern Tage folgte aber Wurmerbrechen und der Theriak erwies sich als ein rettendes Mittel, wonach jedoch eine Schwäche lange Zeit zurück blieb. Die Krankheit äußert sich in Städten verheerender als auf dem Lande, wegen der leichtern Verbreitung des Ansteckungsstoffes durch die Menge der Thiere. Sie herrscht in den verschiedensten Himmelsgegenden und trat in den Niederlanden, in Dänemark, Schweden und Sachsen unter denselben Erscheinungen auf, wie in Oestreich und in der italienischen Provinz Pavia. Das Vorwalten der Electrizität in der Atmosphäre äußerte sich im J. 1797 zu deutlich, um nicht dies als ein ursächliches Moment für die Krankheit zu betrachten, indessen ist es nicht möglich, die Entstehung der Epizootie daraus genügend zu erklären. Um der Krankheit Schranken zu setzen, ist es nothwendig, die in einer Stadt daran zuerst leidenden Katzen zu tödten und tief zu vergraben und mit Kalk zu überschütten, was späterhin nicht mehr helfen kann, wenn sich die Krankheit verbreitet hat. Die Ausführung dieses Mittels ist um so schwerer, als die kranken Katzen sich von den Menschen entfernen und verkriechen. Auch der Ort wo das Thier starb muß sorgfältig gereinigt und gelüftet werden, und ist mit Essig, Seifensiederlauge oder Kalkwasser zu waschen, so wie alles was von dem Auswurfe oder der Ausathmung der Katze berührt worden. Vorzüglich hüte man die noch gesunden Katzen vor Zusammentreffen mit erkrankten; man halte sie an entfernten Orten in freier Luft, gute, nährende Speisen und mäßige Anwendung der ihnen angenehmen Reizmittel, der obengenannten Kräuter, sind ihnen nothwendig. Während des Sommers halte man besonders darauf, daß die Katze den häufigen Genuß des frischen Wassers nicht entbehre. — Aehnlich erscheint die Krankheit sporadisch, aber mit denselben Gefahren. F. A. Mayer nennt sie dann Asthma. Die Katze hängt nach vorherigem Wohlsein auf einmal den Kopf, legt sich auf eine Stelle nieder wo sie unbeweglich verbleibt, selten steht sie auf, noch ein wenig zu trinken, kann aber nicht hinabschlucken. Schon nach 5—6 Stunden ist das Thier wie gelähmt. Die Haare sträuben sich, heftiges Würgen tritt ein und dauert fort bis zum Tode. Man nimmt dagegen 3 Gran Brechweinstein, 2 Quentchen Bittersalz in einem halben Nösel (Seidel) Wasser aufgelöst, und giebt den kranken Thieren von der wohl umgeschüttelten Auflösung etwa einen Eßlöffel voll ein, nach einer Viertelstunde dieselbe Dosis. Spätestens nach dreimaliger Dosis folgt eine stinkende Ausleerung und das Thier ist genesen, im entgegengesetzten Falle endigt die Krankheit in kurzem mit dem Tode.

Digitized by Google

Der Nutzen der Katzen beruht in der Ausübung ihres Naturtriebes, wodurch sie den Menschen von den kleinen Säugethieren befreien, welche sich als Gefolge seiner Cultur an ihn anschlossen und ihm auf mancherlei Weise Schaden bringen.

Um diesem Naturtriebe folgen zu können, muß die Katze frei seyn, denn das Streben nach Freiheit geht ihr über die Pein von Hunger und Durst. Eine in engen Raum absichtlich eingesperrte Katze fängt daher keine Mäuse, und als die Franzosen im Hannöverschen ihre Magazine von den überhandgenommenen Mäusen reinigen wollten, wurde es nicht eher möglich, bis sie Igel und Iltisse zusammenfingen, da die eingesperrten Katzen die Mäuse verschmähten. Will man gute Katzen haben, so muß man sie wenig füttern, am wenigsten mit rohem Fleisch und ihnen nur Milch zu trinken geben. Manche Katzen bringen ihren Raub aus dem Walde und vom Felde nach Hause, bevor sie ihn fressen, aber im Aufsuchen desselben wollen sie nicht beschränkt seyn, und machen sich dann erst dem Menschen unentbehrlich. Auf der Insel Procida ließ der vorige König von Neapel zum Schutze seiner Fasanerien alle Katzen entfernen. Bald nahmen aber die Mäuse aller Art so sehr überhand, daß sich die Einwohner ihrer nicht mehr erwehren konnten, alle Nahrungsmittel wurden verzehrt, die Orgeln zernagt, die Leichen in den Särgen und die Kinder in den Wiegen waren vor ihnen nicht mehr sicher, so daß der Befehl zurückgenommen werden mußte, als man sich überzeugte, wie wichtig die Katzen in der Oekonomie der Natur zur Erhaltung eines nöthigen Gleichgewichtes sind. Auf dem Lande werden sie auch durch Vertilgung der Feldmäuse, Wasserratten, Maulwürfe, Wiesel und vieler zum Theil obengenannten Insekten nützlich. Wenn die Katze vielen zur Unterhaltung dient und besondere Zuneigung bei ihnen erweckt, so muß wiederholt werden, daß auch das Thier sich seinem Erzieher so wieder giebt, wie er sich ihm gab. Hiernach sind die Individuen unendlich verschieden und ihre Folgsamkeit kann bis zum traulichen Umgange mit andern kleinen Thieren, sogar mit Vögeln gebracht werden, ich sahe eine Wachtel mit einer Katze von einem Teller fressen und ähnliche Beispiele giebt es mit Drosseln und andern Vögeln. An den bekannten Hund des Hauses gewöhnen sie sich bald, so wie dieser an sie, mit fremden Hunden kommen sie immer in Streit. Die Gelehrigkeit der Katzen, um kleine Künste zu lernen, wie Aufwarten, Tanzen, Schildwachstehen, durch den Reifen springen und dergl. ist sehr gering, sie sind hierzu viel zu eigensinnig. — Der Winterbalg der Katzen ist ein häufig benutztes Pelzwerk zu Müffen, Mützen, Kragen, Aufschlägen und Unterfutter, so wie zur Anwendung bei electrischen Apparaten, zu Unterlagen bei Geschwülsten. Das Fleisch wird bei vielen Völkern, am häufigsten bei den Chinesen gegessen, welche auf den Märkten beständig Katzen in Käfigen haben oder auf dem Kopfe herumtragend in die Häuser bringen. Das Gehirn wird für schädlich gehalten. Das Katzenfett ist wie anderes, zertheilend; aus den Därmen werden Saiten gemacht.

Der Schaden welchen Katzen anrichten, hängt nicht weniger von ihrem Naturell ab und ist meist durch Nachlässigkeit in der Erziehung und Aufsicht verschuldet. Die meisten gut behandelten Katzen wiederstehen der Versuchung verbotene Speisen zu entwenden, so lange sie Aufsicht merken; läßt man sie allein, so wird es Pflicht, eine Veranlassung zur Erweckung ihres natürlichen Instinktes von ihnen zu entfernen. Auf dem allernatürlichsten Wege ist es zu erklären, wenn menschliche Nachlässigkeit so schaudervolle Scenen herbeiführt, wie den Mord eines Kindes durch eine Katze. Wenn wir aber gehört haben, daß die Katze ihrem Naturell nach als ein Feind alles Lebendigen um der

Digitized by Google

Ausgleichung willen in die Welt gesetzt worden, so bedarf es nicht großen Nachdenkens, wie das Daseyn eines kleinen Kindes, von dem überdies nur Gesicht und Händchen unverhüllt sind, bei dem der Mund athmet oder wohl gar schreiende Töne aus sich entwickelt, und dessen Händchen sich bewegen, die Aufmerksamkeit der Katze erregen und wie diese immer sich steigernd, die Thätigkeit in ihr hervorruft, welche ihr natürlicher Beruf ist. Ebenso wird sie bei erwachsenen Schläfern durch das Pulsiren der Adern, durch das Bewegen des Kehlkopfes bei dem Athmen angereizt, und es werden Fälle erzählt, daß es auch hier bis zum Mord kam. Auch von dergleichen Fällen aus Rache will man Beispiele haben, und auch diese sind wegen großer Rückerinnerungs-Fähigkeit der Katze wenigstens wahrscheinlich, nur verdamme man dann noch nicht darum das Thiergeschlecht, weil es nach *seinen* und nicht nach *menschlichen* Moralgesetzen zu handeln vermag, man zeige sich im Gegentheil durch richtige Auffassung des Naturells solcher Thiere und durch eigne Umsicht selbst seiner höhern Stufe würdig, und man wird dergleichen Fälle unerhört machen können. Der erste Antrieb sich den Betten zu nähern, ist oft das Aufsuchen eines bequemen und warmen Lagers; auf diese Weise geschieht es auch, daß sie über kleine Kinder sich hinweg legen und sie ersticken, woraus der Aberglaube die Fabel ersonnen hat, sie saugten den Athem der Kinder. Auch die Beschuldigung daß die Katzen vom Feuerheerde Kohlen in ihrem Pelze verschleppen, wohl gar selbst ambrennen und dann durch Abstreichen der Flamme an andern brennbaren Körpern Feuersbrünste veranlassen, kann durch Aufsicht verhindert werden. Von Taubenschlägen u. a. Orten wo sie nicht rauben soll, hält man sie durch Raute ab, die man frisch oder trocken zerquetscht oder gerieben um den Eingang anbringt, die Stämme, welche Taubenhäuser tragen, beschlägt man auch unten mit Blech, so daß sie nirgends sich einhäckeln können. Von Sprenkeln und Dohnen wird es schwer sie abzuhalten, oft werden die Gefangnen ihr zur Beute. Indessen bedient man sich auf dem Lande des Mittels, ihr die Ohren zu verstutzen oder aufzuschlitzen, wonach sie es unterläßt in Wald und Gebüsch zu gehen und sich meist im Hause versteckt hält. Die großentheils ohne Aufsicht aufgewachsenen Individuen sind die unbändigsten und meistens auch die von ihnen im ersten Gliede abstammenden noch schwer zu zähmen. Man hat Beispiele, daß solche wieder verwildert sind und mit wilden Katzen Bastarde gezeugt haben. Die Frage ob Katzen im Stande sind ansteckende Krankheiten von Menschen zu verbreiten, ist nicht entschieden zu beantworten, da unsre ganze Lehre von der Ansteckung in neueren Zeiten so sehr erschüttert worden ist, indessen dürfte wohl Vorsicht in diesem Punkte mehr anzuempfehlen seyn als Gleichgiltigkeit, sie kann wenigstens nicht schaden. Vor Alters war dieser Glaube allgemeiner und bei der Pest vielleicht nicht zu wiederlegen. *Kircher* erzählt die Ansteckung einer Nonne zu Mayland, durch eine Katze. In der 1711 erschienenen Dresdnischen Pestverordnung wurde bei Strafe von 50 Thlr. verboten, zur Pestzeit einen Hund oder eine Katze auf die Straße zu jagen.

Die natürlichen *Feinde* der Katzen sind Hunde und Füchse, manche Jagdhunde tödten immer die Waldkatzen, die sie erlangen. In ihrem Pelze halten sich Flöhe auf, in Rußland eine kleinere, röthliche Art; in ihren Eingeweiden leben vier Arten von Eingeweidewürmern: Strongylus tubaeformis, Ascaris mystax, Taenia elliptica und T. crassicollis, welche wir bei Betrachtung der Würmer näher kennen lernen werden. Bei der Raude findet sich eine eigne Art von Krätzmilben. — Unnatürlich ist dagegen die Feindschaft des Menschen gegen die Katze, wenn er über das Naturell dieses Thieres,

Digitized by Google

und dessen Bestimmung vernünftig nachdenkt, was freilich bei angeborner Abneigung (Idiosynkrasie) gegen dasselbe schwerer seyn dürfte.

Die Abbildung stellt indessen eine Cyperkatze mit ihren Jungen dar, der Kater gehört ursprünglich derselben Race. Unsere Nachträge werden andere interessante Katzen darbieten.

27. 28. Die wilde Katze. Felis Catus Linn.

Franz.: le chat sauvage. Félis chat Temm. — Engl.: the wild Cat. — Uebrige Namen wie bei No. 26. — Waldkatze, Wildkatze, Waldkater, Baumreiter.

Kennzeichen der Art: Gelblichgrau, ein bis drei Rückenstreifen, einige unbestimmte Seitenstreifen, Lippen, Sohlen und einige Ringe so wie die Spitze des Schwanzes schwarz.

Die wilde Katze ist um ein Dritttheil größer als die zahmen Racen, gewöhnlich $1\frac{3}{4}$ Fuß lang, der Schwanz 1 Fuß und etwa 1 Zoll. Schwere bis 19 Pfund, ihr Haar länger und einen dichtern Pelz bildend. Der Vorderkopf unregelmäßig mit braunen Fleckchen und Linien versehen. Brust und Unterseite des Leibes, wenigstens ein Fleck an der Kehle ist weißlichgrau, ebenso die Winkel des Maules, die Lippen sind schwarz, die fahlgraulichen Pfoten sind dicker, innerseits und auf der Sohle gleichfalls schwarz, der Schwanz (die Ruthe) bedeutend dickhaariger als bei der gezähmten Katze, wird nicht aufwärts getragen, sondern immer hängend.

Auch die Wildkatze scheint in bestimmten Abarten vorzukommen worauf bereits bei Beschreibung der Zahmen hingedeutet wurde. So dürfte die schott- und irländische graublaue vielleicht das Mutterthier der Karthäuserkatze seyn.

Sie ist das einzige Thier dieser Gattung, welches noch heut zu Tage in den Wäldern Europa's ziemlich verbreitet ist, obwohl seine Zahl alljährlich vermindert werden dürfte. Die zahmen Katzen der spanischen Race, so wie die Cyperkatzen belaufen sich bisweilen mit wilden, woraus dann halbwilde Nachkommen entstehen, von denen manche den wilden selbst sehr ähnlich werden, nur gewöhnlich nicht die bedeutende Größe erlangen. Die wahre Wildkatze findet sich in großen dunklen Waldungen, besonders der Gebirge und bis zum 58° Nördl. Breite immer nur sparsam, da sie ihr Revier behauptet. Sie nimmt ihren Aufenthalt in Höhlen der Felsen, hohlen Bäumen oder verlassnen Fuchs- und Dachsbauen, im Winter auch wohl in Uferlöchern und im Röhricht zugefrorner Teiche.

Ihre Lebensweise kommt ganz mit der der beschriebnen ausländischen Katzen überein. Sie ist äußerst wild und scheu und geht nur zur Nachtzeit auf den Raub aus, der vorzugsweise in warmblütigen Thieren, besonders in Vögeln, am liebsten Rebhühnern, jungen Birk- und Auerhühnern und kleinerem Geflügel, Eichhörnchen, Hamstern, Maulwürfen, Mäusen u. dergl. besteht. Auch die Nester weiß sie sehr geschickt aufzufinden und den Inhalt der Eier zu schlürfen. Sie stellt auch den Fischen nach, sucht die Brut der Wasservögel im Schilf auf und schleicht zur Winterszeit in die Gehöfte, um sich aus Taubenhäusern und Hühnerställen Nahrung zu holen. Sie belaufen sich (ranzen) im Februar. Die Katze bringt nach 8—9 Wochen in einer versteckten Höhle, bisweilen in dem verlassenen Neste großer Vögel auf Bäumen 3—6 Junge, welche 13 Tage blind sind.

Digitized by Google

Die Wildkatze ist in ihrem Betragen gleichsam der Luchs im Kleinen. Dieselbe Reizbarkeit zum Zorn, dann dasselbe Zischen und Spucken, derselbe Blutdurst, dieselbe Geschicklichkeit im Erklettern der Bäume ist auch ihr eigen.

Die Jagd auf die wilde Katze halten die Jäger für um so pflichtmäßiger, als das Thier mannigfachen Schaden in den Revieren anrichtet, auch die Benutzung seiner Theile nicht ganz unbedeutend ist. Die Wildkatze gehört zur niedern Jagd. Die Fährte (Spur) derselben ähnelt sehr der der zahmen, ist sehr schräg geschränkt, aber bemerklich größer. Wenn die Wildkatze verfolgt wird, so bäumt sie alsbald, streckt sich aus einem dicken Aste aus und wartet so die Gefahr ab. Läuft der Schuß hier nicht so glücklich ab, daß er das Thier trifft und tödtlich verwundet, so springt es bisweilen in der Wuth auf den Jäger selbst. Auch die Hunde gehen sehr ungern auf die Wildkatzen, da sie oft Zerfleischungen davontragen. Das Hauptgeschäft der Hunde besteht deshalb nur im Auswittern und Auftreiben, und darin, daß sie sie durch das Aufstöbern veranlassen, auf die Bäume zu klettern und hier sich schußgerecht zu bieten. Man schießt sie auch wohl auf dem Ansitze, sowol auf dem Baue als auf dem Passe. Hierzu treibt man sie theils aus dem Baue mit Hunden oder durch Schwefeldampf, theils lockt man sie durch die nachgeahmte Stimme eines Häschens an. Um ihr Fell zu schonen sucht man sie auch in Tellereisen zu fangen, und bedient sich zum Ankodern (zur Witterung) der den Katzen beliebten Kräuter und Wurzeln: Marumverum, Katzenminze, Baldrianwurzeln. Das Eisen selbst wird mit Spreu, leichter Erde und Laub bedeckt; die eigentliche Lockspeise auf dem Teller bildet ein todter Vogel oder gebratener Häring. Man fängt sie auch nach dem Aufgraben des Baues, oder überhaupt an demselben in Netzen oder im Schlagbaume.

Der Winterbalg giebt ein gutes Pelzwerk, obwohl dasselbe nicht sehr dauerhaft ist. Auch bei Electrisirmaschinen findet derselbe seine Anwendung. Die Därme dienen zu Bereitung von Saiten und das Fett zum Brennen. Aus den Knochen macht sich der Jäger Wachtelpfeifen, und in älteren Zeiten waren, so wie noch jetzt in den südlichen Ländern, auch im Norden mehrere Theile von den Katzen offizinell.

In den Wäldern des ganzen russischen Reichs soll sie nach Pallas nicht eigentlich wild, nur verwildert vorkommen. Nur am caucasischen Vorgebirge bis an den Fluß Cuma häufig, daselbst von den Tataren **Moes-gedu**, d. i. **wilde Katze**, genannt. Im innern Asien häufiger. Russische und orientalische Namen sind noch ♂ **Kott** und ♀ **Koschka**, auch ♂ **Waska** und ♀ **Maschka** (Verkleinerungswort von **Maria**); — in Weißrußland: **Kischka**. — Tatar. **Psi, Musch, Kotschas**. — Buchar. **Mischak**. — Mongol. **Mi**. — Burät. **By-nochoi**. — Kalmukk. **Mis**. — Morduan. **Kúta**. — Tschuwasch. **Koschak**. — Wotiák. **Kotschis**. — Tscheremiss. **Piris** oder **Pris**. — Wogul. **Mätschik**. — Ostjak. **Kyty**. — Caragasso-Samojed. **Kyschko**. — Tangut. **Liwò**. — Ind. **Bilahwae**. — Armen. **Katu**, ♀ **Katzkatu**. — Japan. **Nego**.

29. Die bengalische Katze. Felis bengalensis Desmar.

Franz.: **Chat du Bengale, Chat du Nepaul** Fr. Cuv. (vergl. No. 11). — Engl.: **the Bengal Cat**. — **Felis torquata** Fr. Cuv.

Kennzeichen der Art: grauröthlich, unten weiß, die Stirn mit 4 schwarzbraunen Längslinien, welche paarweise zwischen den Augen und der Nase stehen, zwischen den ersten und zweiten jederseits ist der Raum weiß; die Wange hat zwei Quer-

Digitized by Google

binden, welche vom untern Augenwinkel entspringen und dann unter der Kehle zusammenlaufen, ein zweites Halsband ist unter der Kehle; auf dem Rücken längliche, schwarzbraune Flecken, die der Schultern gehen in Parallellinien über, Bauch und Beine sind mit kleinen Fleckchen, der Schwanz mit undeutlichen Ringen versehen.

Eine nur erst wenig bekannte Art. Der thätige Alfred Duvaucel, welcher in Ostindien so eifrig für Naturforschung wirkte, aber auch bald ein Opfer seines Eifers wurde, hinterläßt auch diese Entdeckung. Diese Katze hat die Proportionen unsrer Hauskatze, ihr Leib ist 15 Par. Zoll, ihr Schwanz 8 Zoll lang und ihre Höhe beträgt 6 Zoll. Sie lebt in Nepaul und in Bengalen. Ihr Haar ist kurz und seidenartig, an der Basis gelbgrau, in der Mitte hell röthlichgelb und an der Spitze weiß und schwarz geringelt. Da wo die dunklen Flecken stehen ist das Haar in der Mitte nicht röthlichgelb, sondern dunkelbraun. Die Schnurren auf den Lippen sind weiß und schwarz gescheckt, die über den Augen ganz weiß. — Die ähnliche Diardische Katze: **Felis Diardii** Desmoulins folgt später. — Die gleichfalls ähnliche Katze: **Fel. Temminckii** Horsf. et Vigors ist noch nicht abgebildet worden.

30. Die Caffern-Katze. Felis Caffra Desmar.

Franz.: Chat de Caffrérie. —

Kennzeichen der Art: oben röthlichgrau, unten röthlichgelb, obre Augenlieder weißlich, Kinn weißlich-röthlich, an der Kehle 3 schwärzliche Querbändchen, Vorderbeine mit 8 dergleichen und die Hinterbeine mit 12; Ohren röthlichgrau, Schwanz ziemlich so lang als der Rücken, außerhalb seiner Mitte mit 4 schwarzen Ringen und mit schwarzer Spitze.

Auch diese Art ist noch wenig bekannt. Delalande entdeckte sie im Lande der Caffern, starb aber zu früh um die Beobachtungen, welche er auf seiner Reise gemacht hatte, der Welt zu hinterlassen. Zwei Exemplare dieser Katze und eine Abbildung kamen durch ihn in das Pariser Museum, wo ich die ersteren sahe und die Bemerkung fand, daß sie das Mutterthier der Cyperkatze seyn solle. Dies ist indessen späterhin von Cuvier nicht erwähnt worden und auch nicht wahrscheinlich, da die Caffernkatze noch größer ist als unsre europäische wilde Katze und ihre eigenthümliche Zeichnung auch von der der Cyperkatze bestimmt abweicht. Sie ist 2 Fuß lang, der Schwanz noch 1 Fuß, die Höhe beträgt 13 Zoll über die Schultern und 14 Zoll auf der Kruppe. Die weichen wolligen Haare sind unten grau, dann gelblich, endlich mit 3 Ringen, einem schwarzen, einem weißen oder gelblichen und einem schwarzen an der Spitze versehen. Das Seidenhaar ist ganz schwarz oder an seiner Spitze wie die vorigen geringelt. Die dunkeln Flecken und Binden bilden sich aus fast ganz einfarbigen Haaren.

31. Der Colocollo. Felis Colocollo Molina.

Franz.: Le Colocolo. — Engl.: the Colocolo. — Chilef.: Colocollo.

Kennzeichen der Art: weißgrau mit schwarzen, braungesäumten Längsstrichen in mehreren Reihen, Bauch und Hüften weiß, Beine schwärzlichblau, Schnautze, Sohlen und Innenseite der Ohren fleischfarben, schmale Ringe und Spitze des Schwanzes schwarz.

Digitized by Google

Auch diese niedliche und hübsch gezeichnete Katze gehört unter diejenigen, welche man noch sehr wenig kennt. Der Abbé Molina entdeckte sie in Chili und erzählt, daß sie sich daselbst von Feldmäusen und Geflügel nähre, sich bisweilen den Häusern auf dem Lande nähere, um in die Hühnerhäuser zu gelangen. Sie hat die Statur und Größe der Hauskatze.

Major Smith erhielt dieselbe Art auch in Surinam, wo sie auf einem Baume sitzend gefangen wurde. Er sagt, daß sie im Verhältniß zur Hauskatze schmächtiger gebaut sey und größre Pfoten habe. Ihm verdankt man die gegebene Abbildung. Eine zweite gaben Griffith und Lizard.

32. 33. Der Manul, die Steppenkatze. Felis Manul Pall.

Franz.: Chat Manul. — Engl.: the Cat Manul. — Russisch, in Sibirien: Stepnaja Koschka oder kamennaja Koschka, d. i. Felsenkatze. — Kirgis. Tatar.: Manul. — Mongol.: Manot. — Baschkir.: Jalam. — Bucharisch: Malem.

Kennzeichen der Art: weißlichgelb oder röthlich, schwarz gezeichnet: Scheitel mit zerstreuten Punktfleckchen, Wangen mit zwei Strichen, der lange, gleichdicke Schwanz mit schwarzen Ringen.

Die Steppenkatze hat das Ansehn und die Verhältnisse des Luchses, zu dem sie den Uebergang eröffnet, sie schließt sich aber durch ihre abgerundeten Ohren und durch den langen Schwanz an die vorigen Arten an. Sie ist 1 Fuß 7 Zoll 3 Linien lang, der Kopf mißt 4 Zoll 6 Linien, die Schwanzruthe 9 Zoll ohne das zolllange Endhaar, die Höhe der Schultern ist 10 Zoll 18 Linien, die der Kruppe 11 Zoll 9 Linien, das Gewicht beträgt 6½ bis 7½ Pfund. Auch die Farbe ist der des Luchses ähnlich, aus dem röthlichen in graulichweiß ziehend, mit untermischten schwarzbraunen Haaren, unten blaß. Die Nase ist am nackten Theile schwarz, ebenso die Lippen am Rande, die obere tief eingeschnitten, die untere mit zugeschärfter Kante unter den Eckzähnen. Backenzähne oben jederseits zwei, der hintere sehr groß, unten drei, der vordere der kleinste. Zunge in der Mitte mit scharfen Häkchen besetzt. Schnurren in 4 Reihen, weiß, an der Basis wellenbogig, in der obersten Reihe mit zwei längeren, schwarzen Borsten. Die Augen liegen schief, haben einen zornigen Blick, die Augenlieder sind am Rande nackt, schwärzlich, die Wimpern stehen nur in der Mitte des obern Augenliedes, der Augenkreis ist dick, runzelig, schwarz gerandet, die Regenbogenhaut blaß rothgelb, Pupille länglich, schief. Ueber den Augenbraunen ist eine gelbliche, mit etwa 8 weißlichgelblichen Borsten besetzte Warze sichtbar, eine neunte Borste nach vorn ist schwarz und strahlartig. Die Ohren sind kurz, breit, rundlich, stumpf, das äußre Läppchen am Außenrande nach innen, fast in der Mitte abgerundet, am Innenrande nach der Basis hin mit doppelten Plättchen, außen mit dichtem weißen Pelze, einfarbig blaßgelblich bekleidet, inwendig nackt und schwärzlich, aber mit einer Art von Fächer aus umgebogenen weißen Haaren, welche aus der Basis des Ohrs entspringen. Die Gliedmaßen sind robuster und kräftiger als an der wilden Katze, mehr wie bei dem Luchs gebaut; die Pfoten auf beiden Seiten röthlichgelb und schwarzzottig bis zur Schwiele der Pfotenwurzel (Sohle), die Ballen der Zehen unten mit lockern rothgelben Haaren besetzt, nach den Fersenbeinen hin ist außen ein schwarzer Strich, die Zehen sind unten schwarz und ebenso ein Streif beiderseits an der Schwiele der Mittelpfote (Metatarsus). Die Krallen weißlich wenn sie ausgestreckt wird. Der Schwanz mit reichem Pelzhaar, cylindrisch, blaß-

Digitized by Google

gelblich wie der Leib, mit etwa 9 schwarzen Ringen umgeben, die Spitze breiter schwarz, die mittlern Ringe entfernter, die Spitze und die drei letzten Ringe sind oberseits durch einen Streifen verbunden und von glänzenderem Schwarz. Um die Nase herum ist die Farbe gelblich, die Kehle weiß, die Brust aschgraulich, der Leib übrigens oberseits verblichen röthlichgelb, nach außen weißlichgrau, die Haare auf dem Rücken schwärzlich gespitzt, der Scheitel hat zwischen Augen und Ohren viele schwarze Fleckchen, unter den Augen findet sich ein schwarzer Längsstrich und zwei ziemlich parallel nach hinten zusammenlaufende schwarze Linien. Außerdem ist der Körper ungefleckt, nur bei einigen Exemplaren der Hinterrücken mit sehr verloschenen Streifen versehen.

Der Manul wohnt auf steilen Felsgebirgen der tatarischen und mongolischen Steppen und innerhalb des russischen Kaiserthums um die südlichen Vorgebirge des Ural, das altaische Gebirgsjoch und über dem Baikal ziemlich häufig, auch über ganz Mittelasien verbreitet. In den nördlichen Gegenden, wohin die Luchse gehen, kommt der Manul nicht vor. Er verbirgt sich in Höhlen und Felsklüften. Zorn und Bosheit scheinen seine vorwaltenden Charactere. Die Nahrung besteht größtentheils, besonders in Davurien, aus dem Ogotona (**Lagomys Ogotona**), dem sogenannten davurischen Hasen. Von der europäischen Waldkatze unterscheidet sich der Manul durch Farbe und Zeichnung, durch den eigenthümlichen, mehr langhaarigen Pelz, durch seine Größe und verhältnißmäßig größeren Kopf, durch längeren Schwanz und durch die Zahl der Backenzähne. Sonst steht er ihr nahe und kommt auch in der Lebensweise mit ihr überein. Der Manul schnaubt im Zorne wie ein Luchs. Pallas vermuthet mit großer Wahrscheinlichkeit, daß die langhaarige, angorische Katze von dieser Steppenkatze abstamme. Jene ist wenigstens von der gemeinen Katze, obwol sie sich mit ihr verpaaren läßt, wesentlich verschieden. — Die Kenntniß des Manul verdanken wir Pallas, welcher auch dessen Anatomie beschrieben hat *). Die Bucharen bringen die Felle des Manul um ziemlich wohlfeile Preise in den Handel.

34. Der Rimau-bulu, sumatranische Katze. Felis sumátrana Horsf.

Franz.: Chat de Sumatra. — Engl.: The Sumatran Cat. — Sumatran.: **Rimau-bulu.** Javan.: **Kuwuk.**

Kennzeichen der Art: röthlichgelb, unten blaßgelblich, Zeichnung schwarz: über den Rücken längliche Flecken, in der Seite zerstreute unregelmäßige, ein Kehlstrich auf jeder Seite spitzwinklich, Schwanz kürzer als die Beine.

Horsfield beschrieb zwei Katzen, von denen er eine die sumatranische, die andre die javanische nannte. Späterhin erfuhr man, daß beide Thiere nur eine Art ausmachten, die javanische Katze nämlich, wie sie Horsf. beschrieben, nur das junge Thier der sumatranischen sey, so daß dieser Name vorgezogen werden müßte. Temminck schlug den neueren Namen **Fel. minuta**, kleine Katze, vor. Unsere, nach einem Examplare des hiesigen Museums gefertigte Abbildung stellt gleichfalls das junge Thier dar, dessen Farbe und Zeichnung oben angegeben worden. Es hat nur 10 Par. Zoll Länge, der Schwanz 2½ Zoll. Nach dem kleinen englischen Maaße hält das

*) Zoographia rutheno-asiatica I. p. 29—33

Digitized by Google

Exemplar im Edinburger Museum im Ganzen 21 Zoll, die Schulterhöhe ist 10½ Zoll, Temminck's Thier hält 16 Zoll im Körper, der Schwanz 8—9 Zoll.

Die röthlichgelbe Grundfarbe scheint sich im Alter in röthlichgrau zu verändern, die Flecken breiter und unregelmäßiger zu werden. Ueber den Rücken ziehen sich vier Reihen langer, dunkelbrauner Flecken, auf den Beinen sind dergleichen Tüpfel, welche nach unten immer kleiner werden. Der Schwanz trägt oberseits schwarze Querbänder.

Man fand diese Art auf Java und Sumatra, nicht im Continente Indiens. Sie lebt in den großen Wäldern, hält sich daselbst in hohlen Bäumen am Tage verborgen. Zur Nachtzeit geht sie ihrem Raube nach, und besucht oft die in der Nähe der Wälder gelegnen Landhäuser, um Hausgeflügel zu stehlen. Die Eingebornen kennen ihre List und erzählen diese ginge so weit, daß sie die Stimme der Vögel nachahme, die sie überfallen wolle. Sie jagt außerdem auch kleinere Säugthiere und frißt im Nothfalle auch Aas. Sie ist gänzlich unzähmbar und außerordentlich störrisch. Temminck giebt darüber Bericht; er hatte vor zwei Jahren zwei Stück lebendig, konnte aber bei der besten Behandlung ihre Wildheit nicht bändigen. Sie kauerten immer im dunkelsten Winkel des Käfigs und bewegten sich nur von dannen, wenn sie der Hunger quälte.

35. Der Hirschluchs. Felis cervaria Temm.

Franz.: le Lynx-cervier. — Schwedisch: Katt-lo. — Felis Kattlo Linn. Faun. suec.

Kennzeichen der Art: Pelz lang und dicht (besonders um die Beine), grau mit schwarzen (in der Jugend braunen) Flecken, Schnurren weiß, Ohrpinsel kurz oder fast fehlend; Schwanz länger als Kopf, kegelförmig, Spitze schwarz.

Hirschluchs ist zwar eine den Luchsarten ziemlich allgemein beigelegte Benennung, doch hat Temminck dieselbe vorzugsweise einer nördlichen Art beigelegt. Diese Art wird 3 Fuß 4—8 Zoll lang, der Schwanz 7—9 Zoll, die Schulterhöhe 2 Fuß 6—7 Zoll. In der Jugend, wenn das Thier nur die halbe Größe hat, ist es weißlich-gelblich, die Flecken länglich, klein und dunkelbraun mit schwarzem Saum, so wie unsre Abbildung zeigt. — Diese Art macht den natürlichsten Uebergang zu den Luchsen, mit denen sie in der Lebensart übereinstimmt, sie schließt sich aber durch den noch fast gänzlichen Mangel der Ohrpinsel an die Katzen mit abgerundeten Ohren an.

36. Der Sucheluchs. Felis rufa Güldenst.

Franz.: Chat cervier des fourreurs ou du Canada. — Engl.: Bay Lynx.

Kennzeichen der Art: Pelz gewellt und gestreift, im Sommer röthlich, im Winter braungrau; Ohren mit kurzem Pinsel; Schnurren kurz, Schwanz kurz, dünn.

Dieser Luchs kommt in Statur und Größe dem europäischen nahe, er hat aber immer auf dem dünneren Schwanze vier graue und vier schwarze Ringe, der Pelz hat ein hasengrauen Grund und zieht im Sommer ins fuchsröthliche. Die Länge beträgt 2 Fuß 5 Zoll, die des Schwanzes 5 Zoll. Sein Vaterland sind die vereinigten Staaten, indessen nach Temminck's Bemerkung mit Ausschluß von Canada, so daß die obige französische Benennung von Fr. Cuvier falsch wäre. Die Felle dieses Luchses kommen häufig in den Handel. Dieselbe Art scheint auch in Schweden vorzukommen.

Digitized by Google

37. Der mexicanische Luchs. Felis maculata Horsf. et Vigors.

Franz.: Lynx de Mexico. — Engl.: the Mexican Lynx. — Mexic.: Ocotochtl Hernandez.

Kennzeichen der Art: röthlichgrau, auf dem Rücken dunkler, die Seiten und Gliedmaßen äußerlich braungefleckt; Kehle, Unterseite des Leibes und Innenseite der Gliedmaßen weiß, braungefleckt, Ohren mit Pinsel.

Diese Luchsart wurde erst in den letzten Jahren der zoologischen Societät in London durch einen ihrer eifrigsten Correspondenten, den Capitän Lyon, in Abbildung vorgelegt. Die Haare sind mäßig lang und weich, an der Basis blaßröthlich, gegen das Ende braungeringelt, an der Spitze weiß. Auf der Rückenseite sind die Spitzen zum Theil braun, so daß die ganze Fläche darnach dunkler graubraun wird. Auf dem Kopfe und den Schultern walten die weißen Spitzen vor, so daß die Farbe daselbst mehr ins grauliche übergeht. Längs des Rückens deuten sich braune Streifen an. Vorn und an den Seiten sind zerstreute kleine braune Flecken. Die Backen sind auf ähnliche Weise gefleckt und die langen Backenhaare haben undeutliche braune Linien. Aufgerichtet und von hinten gesehen bilden sie einen braunen Fleck. Die Ohren sind vorn weißlich, hinten schwarz mit großen weißen Mittelflecke, die Pinselhaare gering und schwarz, um die Augen herum ein weißlicher Kreis, Oberlippe weiß mit schwarzen Linien, Unterlippe weiß, wie die Kehle, Brust, Bauch und Innenseite der Schenkel weiß und mit Ausnahme der Unterlippe und Kehle mit größeren schwarzen Flecken versehen. Der Schwanz ist dünn, weiß mit schmalen braunen Ringen und langer schwarzer Spitze.

Länge des Leibes 2 engl. Fuß, 6 Zoll. Schwanz 6 Zoll, Kopf ebenso, Schulterhöhe 14½ Zoll, Kruppenhöhe 15½ Zoll.

Dieser Luchs ist wahrscheinlich bisher mit unter den zahlreichen Abänderungen des Fuchsluchses oder der Bay Cat des Pennant begriffen worden, unterscheidet sich aber wesentlich vom Originaltypus dieser Art, schon durch den längeren Schwanz. Unsere Abbildung konnte natürlich nicht besser seyn als das einzige existirende Original, welches oben erwähnt und von Vigors und Horsfield wieder mitgetheilt worden ist.

38. 39. Der Rothluchs, Kälberluchs. Felis lynx Linn.

Griechisch: ὁ λύγξ, -γκός, ὁ λυγκεύς, -έως, — ἀπὸ τῆς λύκης, d. h. vom Lichte, scharfem Gesicht, Sehen, Lugen, also: Sehe-Thier, Lugs-Thier. — Altlat.: lynx, lupus cervarius. — Franz.: le lynx. — Engl.: The lynx, European lynx. — Ital.: lince, cerviero. — Heißt auch Lux, Waldluchs, Hirschluchs, Hirschwolf, Steinluchs. — Uebrige Namen gehören zu den folgenden Arten, besonders No. 44. — Altschweizerisch: Thürwolff.

Kennzeichen der Art: Sommerhaar kurz, das Winterhaar länger, Farbe röthlich mit kleinen schwarzbraunen Tüpfeln, um die Backen laufen 4—5 wellenförmige Bandstreifchen, Schnurren weiß, Ohrpinsel lang, Schwanz so lang als Kopf, außerhalb der Mitte schwarz.

Der Luchs wird 2 Fuß 8—10 Zoll lang, sein Schwanz hält 6½ Zoll. Sein Wuchs ist zwar ganz katzenartig, aber robuster, besonders die starken Gliedmaßen, dickere Pfoten und langzugespitzten, einen Pinsel tragenden Ohren (welcher Ohrpinsel indessen nur im Frühlinge, gleichsam als hochzeitliche Zierde, recht ausgezeichnet ist), stellen ihn als Typus einer eigenthümlichen Gruppe im Katzengeschlechte auf. Die schwarzbraunen Fleckchen sind mehr oder weniger zahlreich bei verschiedenen Exemplaren, fehlen

Digitized by Google

indessen fast niemals auf den Schenkeln aller Beine, wo sie auch bei denjenigen, die über den ganzen Pelz zerstreute Fleckchen führen, gedrängter beisammen stehen. Das Haar ist übrigens weich, fast seidenartig. Die Ohren (Gehöre) *) stehen aufrecht, sind in der Mitte weißgrau mit glänzend schwarzem Rande und an der Spitze mit einem aufrecht stehenden Pinsel aus langen schwarzen Haaren geziert. Kehle und Unterleib sind weißgelblich. Der Schwanz (die Ruthe) ist dicker als an vorigen Arten, hat einen rothgelblichen Grund, undeutliche rothbraune Ringe und eine glänzend-schwarze Spitze (Blume). Die Sommerfarbe hat in der Regel weniger schwarzbraune Abzeichnung. Die Iris im Auge ist hellgelb, die Pupille länglich wie bei der Katze.

Der Luchs war in der Vorzeit, nach der Versicherung der Schriftsteller, sehr über Europa verbreitet. Der sich höher entfaltenden Cultur ist er gewichen und findet sich heut zu Tage in dem wärmeren Theile Europa's nur noch in den Gegenden der höheren Gebirge. In der Schweiz, in Piemont, Tyrol und Vorarlberg, in den Pyrenäen und Apenninen kommt er noch vor, in Baiern, in den Forstrevieren von Tegernsee, Immenstadt, Zwiesel u. s. w. werden alljährlich noch mehrere Exemplare geschossen oder in Tellereisen gefangen; am Harze wurde in den Wernigeroder Waldungen noch im J. 1818 ein sehr großes Exemplar geschossen **); auch in Böhmen, in Niederöstreich (vgl. Fitzinger in d. Beitr. z. Kenntniß von Niederöstreich), auf dem Schneeberge, dem Oetscher, dem Gahns und Ward, bei Gutenstein, Lilienfeld u. s. w., auch in den oberöstreichischen Alpen, in Steiermark kommt er noch einzeln vor. Im Winter durchstreift der Luchs auch die niedriger gelegenen Wälder, im Sommer zieht er sich in die Höhe der Alpen zurück. Dieselbe Art scheint die in den caucasischen Laubwäldern lebende zu sein.

Der Luchs ist durch die Schärfe seines Gesichts (Gesäuges) schon bei den Alten zum Sprüchwort geworden. Die hohe Entwicklung dieses Sinnes, wie die des Gehöres, der robuste Gliederbau, die scharfen Klauen (Waffen) und die dadurch mögliche Behendigkeit in seinen Bewegungen, so wie der Nachdruck, den er seinem Angriffe zu geben weiß, machen ihn zu einem so furchtbaren Raubthiere, daß er in Europa von keinem anderen übertroffen wird. Dazu kommt noch der große Blutdurst, der ihn so viel als irgend einem des Auslandes eigen ist, und welcher ihn veranlaßt mehr zu tödten, als er auffressen kann, so daß er in seinem Reviere sogar in einer einzigen Nacht bis zu 30 Schafen tödtet. Man könnte ihn den Repräsentanten des Tigers in Europa nennen. Er lebt nur einsam oder paarweise, und hat nie andre Raubthiere in seinem Revier. Das Lager findet sich in den unzugänglichsten Dickichten der Wälder und in Klüften der Felsen, oft wählt er dazu Dachs- oder Fuchsbaue oder hohle Bäume. In den Alpen belauscht er die Gemsen, Murmelthiere, Dachse, Rehe, Hirschkälber, Hasen und Vögel, besonders Auer-, Birk- und Haselhühner; in der Nähe der Sennhütten macht er sich an die Schafe, Ziegen, Kälber und das Hausgeflügel. Sehr behende besteigt er die Bäume (bäumt), und lauert da auf das Wild, auf das er dann herabspringt. Immer erlauscht er die Beute aus dem Hinterhalte, niemals jagt er sie. Am Tage sitzt er gewöhnlich auf einer Felsspitze, sonnt sich und beobachtet die Gegend. Morgens und

*) Die Bezeichnung in der Jägersprache wird in Parenthese beigefügt.

**) Vgl. Dehne Jagdgang nach dem Harze (Quedlinburg und Leipzig 1819), S. 71. u. Weitmann's Feierabende, Bd. 6. S. 164.

Digitized by Google

Abends geht er auf die Beute aus, legt sich katzenähnlich auf einen Baumstrunzel oder Busch an den Wildgängen unter dem Winde. Sobald er die Beute bemerkt, thut er drei bis vier weite Sätze von 12—14 Fuß Weite auf dieselbe, faßt das Thier im Genicke und zerbeißt ihm die Luftröhre, während er die, wie bei den Katzen, ausstreckbaren Krallen einschlägt. Ein entgehendes Wild verfolgt er nicht, sondern legt sich nach einem Fehlsprunge von Neuem auf die Lauer. Dem gefangenen Thiere saugt er das warme Blut aus und frißt davon etwa 3 — 4 Pfund Fleisch, von den Schafen frißt er die Eingeweide, auch wohl etwas vom Fleische des Kopfes, Halses und den Schultern. Das übrigbleibende läßt er liegen, wenn er Gefahr fürchtet, außerdem scharrt er es ein oder bedeckt es mit Gebüsch, um im Nothfall, wenn es am andren Tage an Beute fehlt, davon wieder Gebrauch machen zu können. Länger als drei Tage benutzt er aber gewiß nur in seltnen Fällen dieselbe Beute.

Die Luchse belaufen sich (ranzen) zu Ende Februar oder Anfangs März, das Weibchen trägt 9 Wochen, so kommen zu Ende April oder Anfangs Mai 2—3, selten 4 Jungen in einer Felsenhöhle zur Welt, welche 9 Tage blind sind, wie junge Katzen spielen und bald von der Mutter auf den Fang von Geflügel und kleinen Säugthieren abgerichtet werden.

Als schädliches Raubthier wird der Luchs allgemein nachdrücklich verfolgt. In der Gefahr bäumt er und streckt sich ungewöhnlich lang auf den dicken Ast eines Baumes, so daß er sich fast dem Blicke entzieht. Hier wird die Jagd gefährlich, denn nach einem Fehlschusse springt er herab und verwundet oft die Hunde und den Jäger selbst jämmerlich, indem er sie, in der Todesangst, mit den Tatzen und Eckzähnen (Fängen) zerfleischt. Deshalb fängt man ihn am liebsten mit Tellereisen, oder man kreist ihn zum Treib- und Kesseljagen ein, umstellt ihn mit Netzen und jagt ihn mit Hunden, oder fängt ihn in Gruben. Die Anwesenheit des Luchses wird aus seiner Spur mit Sicherheit erkannt, diese zeigt Abdrücke im weichen Boden oder Schnee, welche denen der Katzenspur sehr ähnlich sind, aber weit größer. Wenn der Luchs auf Raub ausging, so findet man die Spur schränkend oder geschränkt, d. h. die Eindrücke wechselsweise von einer Mittellinie entfernt, wenn er aber trabte, so findet man sie schnürend oder geschnürt, d. h. in schnurgerader Linie hinter einander folgend. — Thunbergs Felis lupulinus dürfte wohl zu gegenwärtiger Art gehören. —

Der Winterpelz wird geschätzt, sein Haar ist sehr weich, dabei dicht und fest; das Wildpret ist ein Delicatesse, was um so merkwürdiger ist, als man andere Raubthiere nicht zu genießen pflegt. Fett und Blut werden wohl auch noch jetzt von den Jägern als Heilmittel benutzt.

40. Der Parderluchs. Felis pardina Oken.

Französisch: le lynx-leopard.

Kennzeichen der Art: Haare kurz, glänzend rothbraun, schwarze gleichförmig zerstreute Flecken, Schnurren und Ohrpinsel lang, Schwanz kurz, gefleckt.

Der Parderluchs unterscheidet sich auf den ersten Anblick durch die großen, mehr gleichförmig über den ganzen Körper vertheilten, schwarzen Flecken und den kürzeren, nur etwas gefleckten Schwanz. Er lebt nur in den wärmsten Gegenden Europa's, in Portugal, Spanien, auf Sardinien, Sicilien und in der Türkei. Häufig kommt er

Digitized by Google

in den spanischen Mittelgebirgen vor, und wird daselbst größer als anderwärts, auch schöner und lebhafter gefärbt. Die schönsten kommen auf der Sierra de Gredos vor. Unter den drei schwedischen Arten, welche Thunberg unterscheidet, Felis lupulinus, borealis und vulpinus, finde ich die letztere ganz ähnlich, und nach einem vor mir stehenden Exemplare könnte ich sie vom Parderluchse nicht trennen. — Nächst der alten Abbildung von Perrault, möchte vielleicht noch die in Tourneforts Reise: Voyage du Levant, Amsterd. MDCCXVIII. tom. I. p. 185. hierher zu rechnen seyn, und beiden füge ich noch zwei neue, bessere hiezu, welche nach einem schönen Oelgemälde gefertigt worden sind.

41. Der Caracal. Felis Caracal Güldenst.

Griechisch: ὁ λύγξ u. s. w. vgl. No. 38. — Altlatein.: lynx, lupus cervarius. — Franz.: le Caracal. — Engl.: the Caracal. — Arabisch: Anak el ard. — Türkisch: Kara-kulak, d. h. Schwarzohr. — Persisch: Sia-gussh, Siyah-ghush mit derselben Bedeutung. — Persischer Luchs.

Kennzeichen der Art: grauröthlich, unten blasser, Brust etwas gefleckt, Ohren außen schwarz, inwendig weißlich, Ohrpinsel lang, Schwanz ungefleckt, reicht bis zur Ferse.

Wird 2½ Fuß lang, der Schwanz 10 Zoll bis 1 Fuß, Höhe 1 Fuß 4 Zoll. Die Farbe des älteren Thieres ist fast rothgelb, die Unterseite weißlich. Ueber dem Auge zeigt sich ein blasser Wischfleck über dem obern und einer über dem untern Augenwinkel, Oberlippe, Kinn, Brust, Bauch, so wie die Innenseite der Gliedmaßen ist weiß, die Schnurren sind schwärzlich und entspringen aus schwarzen Wärzchen, der Oberrücken und die Rückseite der Ohren ist dunkelbraun, der Ohrpinsel schwarz, die Iris im Auge gelb, die Klauen gelblichweiß.

Der Caracal ist zum großen Theile gemeint, wenn die Alten vom Luchse erzählen. Er bewohnt Persien, Arabien und den Senegal, scheint sich durch ganz Afrika bis zum Caffernlande und in Asien längs des Ganges hin zu verbreiten. Indische Herrscher sollen sich in der Vorzeit seiner zur Jagd bedient haben, wie des Gepards (No. 17.), heut zu Tage kennt man darüber keinen Beleg. Das Thier zeigt sich auch in der Gefangenschaft so unbändig und störrisch, daß man kaum glauben kann, daß eine Abrichtung desselben möglich sey. Auch den Caracal nennen die Reisenden einen Löwenwächter und erzählen, daß er dem Löwen folge. Wie sich dies erklärt, ist in der Naturgeschichte des Tigers S. 27. gesagt worden. Seine Lebensweise wie sein Character dürfte mit dem des europäischen Luchses übereinstimmen, und einzig und allein durch Clima und Lokalitäten einige Abänderung erleiden. Seine Hauptnahrung besteht aus Hasen und Kaninchen und aus Geflügel, wobei er sehr behende die Bäume erklettert. Antilopen, Rehe und Hirsche jagt er mit demselben Blutdurst, wie andre Raubthiere thun. Die Caracals, welche wir bisher in Europa lebendig sahen, blieben äußerst scheu und bösartig. Sie drücken sich in den Winkel ihres Käfigs, und schnauben furchtbar, wenn man sie stört. Mißtrauen, Zorn und Blutdurst bezeichnen ihren Character. Nur ganz jung eingefangen, scheinen sie einigermaßen zähmbar zu seyn. — Es ist noch genauer zu beobachten, ob der Caracal aus Bengalen dasselbe Thier sey; ich habe diesen vor mir in einem früher lebendig gesehenen, jetzt ausgestopften Exemplare, er ist fast einfärbig aschgrau, unten blasser. Seine Abbildung werde ich noch geben. — Eine

Digitized by Google

ähnliche, noch sehr wenig bekannte Art, ist Temminck's Felis aurata, der Goldluchs, dessen Vaterland man aber nicht kennt.

42. 43. Der Stiefelluchs. Felis caligata Bruce.

Franz.: le lynx botté, lynx aux oreilles rouges. — Engl.: the booted Lynx.

Kennzeichen der Art: röthlich-gelbgrau, schwarz melirt, unten weiß, Sohle und Hinterseite des Unterfußes, einige Ringe gegen das Ende so wie die Spitze des den Hinterbeinen an Länge gleichenden Schwanzes und Ohrpinsel schwarz, Ohren auf der Rückseite röthlich.

Wird über 2 Fuß lang, der Schwanz über 1 Fuß. Der Name bezieht sich auf die unten schwarzen Beine. Die Farbe des Felles so wie dessen Zeichnung ändert ab, wahrscheinlich nach dem Alter der Thiere. Bei dem alten Männchen ist die Farbe fast bleigrau, schwärzliche Binden laufen mehr oder weniger deutlich quer über die Schenkel, eine deutlicher ausgeprägte bildet einen Halbring am Bug auf der Innenseite der Vorderbeine. Die Ohren sind mäßig lang und spitzig, außen fuchsröthlich, die Spitze schwarz, Innenseite weiß. Der Schwanz ist grau, von der Mitte an mit zunehmenden schwarzen Ringen versehen und an der Spitze schwarz. Das Weibchen hat eine gelblichere Grundfarbe, das junge Thier deutlichere schwarze Querbänder.

Der Stiefelluchs gehört nicht ausschließlich Afrika an, wo er entdeckt worden, wenigstens giebt Temminck an, daß er auch in dem südlichen Indien gefunden worden sey. In der Lebensweise gleicht er den übrigen Luchsarten. Bruce unterscheidet ihn zuerst, weshalb wir seine Originalabbildung unter No. 42. wiedergeben mußten. Er nennt ihn die kleinste Luchsart, da sein Exemplar nur 22 engl. Zoll maß, der Schwanz 13 Zoll. Seine Hauptnahrung bestand, wie Bruce *) beobachtete, aus Perlhühnern, von denen dort die Gebüsche wimmeln. Um sie zu belauschen liegt er bei den Wasserhältern, um sich ihrer zu bemächtigen, wenn sie zur Tränke gehen. Im Zorne wird er auch dem Menschen gefährlich und rettet sich bei Verfolgung auf die Bäume. Sonst verbirgt er sich im Dickicht und in Höhlen.

44. Der Katzenluchs, nordische Luchs. Felis borealis Thunb.

Französisch: le Lynx du Nord. — Englisch: the northerly Lynx. — Schwedisch: Lo. — Dänisch: Los. — Norwegisch: Goup. — Lappländisch: Albos. — Polnisch: Rys, Ostrowidz. — Russisch, Samojed. u. Ostjak.: Ryss. — Tatarisch: Slayssen od. Slylafsin. — Am Jenisei: Yhs. — Jakutisch: Ysch od. Yhs-pedaer, d. h. gefleckter. — Mongolisch: Scheleyssyn. — Burätisch: Tscheluhum. — Kalmuktisch: Zoongudai od. Schiloëssü. — Tunguisch: Tlsaeki od. Tibdshaeki, auch Nondo, am Baikal: Jelbli. — Lamutisch: Nadami. — Tschuwaschisch: Tal. — Cabalisch: Nagameida. — Caragassisch: Tschopkon. — Motorisch: Dshokom. — Camaschisch: Nagabai. — Lettisch: Lufse. — Estheniſch: Ilwis. — Mordwanisch: Kaschmarasch. — Wotiatisch: Balan od. Kurell. — Zrinzisch: Ann. — Tangutisch: Jée. — Indisch: Tschitah. — Ossetisch, am Caucasus: Istai. — Medzdschegisisch: Zoak. — Georgisch: Putschori.

Kennzeichen der Art: langzottig, bräunlichgrau mit bräunlichen Fleckchen und Strichen auf dem Scheitel und den Beinen, Ohren mit Pinsel, Schwanz fast kürzer als Kopf, mit ganz schwarzer Spitze.

*) Select specimens of natural history collected in travels to discover the source of the Nile, in Egypt, Arabia, Abyssinia and Nubia. Vol. V. Edinburg 1790. Pag. 146—148.

Digitized by Google

Der Katzenluchs erscheint wegen seines langen Pelzes von weit kürzerem, gedrungnerem Bau als der südlichere Rothluchs. Sein Kopf ist dicker und in Allem prägt sich an ihm der Habitus der Wildkatze deutlicher aus, daher die Jäger allgemein den bezeichnenden Namen Katzenluchs nur ihm beilegen. Er erreicht eine Länge von 3 Fuß und darüber, sein Schwanz ist dann 6 Zoll lang, dick und dicht behaart. Die Schnurren sind weiß, das Kinn von starren Haaren fast bärtig, die Augenbraunwarzen vielborstig, die Ohrdrüsen von langen Zotten fast bärtig, in der Mitte mit schwarzem Büschel. Das schöne gelbgrünliche Auge hat weiße Lider, deren oberes schwarze Wimpern trägt; vom Hinter-Augenwinkel geht eine schwarze Linie aus, verbindet sich mit einer andern unter dem Auge in einen Winkel, ihr läuft eine zweite parallel in einem Bogen über. Die Wangen, der Scheitel hat schwärzliche Punktfleckchen. Durch diese beiden letztern Zeichnungen schließt sich der Katzenluchs unmittelbar an den Manul. Die Ohren sind auswendig gelbgrau mit weißem Wischfleck, am Rande rostgelblich, an der Spitze schwarz, von derselben Färbung ein zolllanger, etwas zurückgebogener Pinsel. Kehle weiß, beiderseits mit schwarzem Haarbüschel unter der Kinnlade. Der Winterpelz ist oben graugelblich, obenhin mit längeren, weißlichen Haaren, welche schwarzbraune Spitzen haben, bei schönren Exemplaren mit mehr oder weniger häufigen Wischflecken, Nacken und Rücken mehr rostgelblich, mit deutlichen Flecken. Unterseits ist der Pelz weiß und langzottiger, mit zerstreuten schwarzen Büschelchen, auch die Beine sind äußerlich zierlich punktirt. Der Schwanz ist spannenlang, rostfärbig, ein großer Theil von der Spitze aus ist seidenschwarz, unterseits mit eingemischten weißen Haaren. Im hohen Norden findet er sich ganz weiß, ins Graulichte spielend. Das junge Thier hat oben eine röthliche Farbe, weißlich gewölkt, deutlicher schwärzlich gefleckt, mit drei fast parallelen Streifen auf dem Hinterrücken. — Die Größe ist beträchtlich, das Gewicht steigt auf 60 Pfund und darüber. Im Winter ist der ganze Leib von vielem, schön weißem Fett umgeben, welches bis zu 2 Zoll 10 Linien hoch auf dem Fleische unter dem Felle liegt. — Backenzähne stehen oben jederseits 2, unten 3, nämlich mit einem kleineren vorderen.

Der Katzenluchs lebt in den großen Waldungen im Norden von ganz Sibirien überall häufig, ebenso im nördlichen Rußland. In Davurien und Sajansk ist er bösartiger. In Sibirien findet er sich am schönsten am Flusse Kovyman. In Europa breitet er sich über Cur- und Liefland, Schweden, Norwegen und Dänemark aus, erscheint auch als seltner Gast in Schlesien. Vor beinahe dreißig Jahren soll *) noch ein Luchs in Oberschlesien auf der Groß-Strehlitzer Herrschaft geschossen worden seyn, der offenbar nur übergelaufen war. Ein Fall der wohl jetzt auch nicht wieder vorkommen möchte. Für einen so ächt schlemmerisch wüstenden Mörder reicht unser jetziger Reh- und Rothwildbestand schon längst nirgends mehr hin. Seine Lebensweise ist ganz die des Rothluchses. Von den Bäumen springt er auf Rehe, Hirsche und Rennthiere, und schlägt ihnen seine Klauen und Fänge in den Nacken. Vorzüglich jagt er Füchse, Hasen und Auerhühner. Er ranzt im Februar, das Weibchen trägt neun Wochen und gebiert in einer Felshöhle vier blinde Junge. Auch jung aufgezogen ist der Luchs nicht zähmbar. Er ist wie die Katze ein sehr reinliches Thier; von den erlegten Thieren streift er sorgfältig das Fell ab und geht mit der äußersten Vorsicht zu Werke, um sich

*) Vergl. Gloger „Schlesiens Wirbelthier-Fauna." S. 10.

Digitized by Google

mit dem Blute nicht zu benetzen. Die Jakuten vergleichen deshalb einen Menschen, der seine Kleider reinlich hält, mit dem Luchse. Im Freien ist er furchtsam, flieht den Menschen und rettet sich vor den Hunden auf Bäume.

Der Winterpelz der schönen sibirischen Luchse wird besonders geachtet. Die reicheren Jakuten zahlen für das Stück 6 bis 8 Rubel und kleiden sich in Luchspelze. Das Fleisch ist sehr wohlschmeckend, die Jakuten halten es nächst dem Fohlenfleische für den ersten Leckerbissen, so wie die Zinganer das Katzenfleisch.

Die vor mir stehenden Exemplare erhielt ich aus Liefland.

45. Der Kirmyschak oder Sumpfluchs. Felis Chaus Güldenst.

Franz.: le lynx des marais. — Engl.: the Kirmyshak or lynx of marshy regions. — Russisch, am kaspischen Meere: Dikaja Koschka, d. h. wilde Katze. — Tatarisch: Kir-myschak, d. h. wilde Katze, oder Pulän. — Tscherkessisch: Moes-gedu. — Felis Catolynx Pallas.

Kennzeichen der Art: ungefleckt, oben graulich, unten röthlich, Schwanz fast so lang als die Hinterbeine, außerhalb der Mitte schwarzgeringelt.

In der Größe hält er das Mittel zwischen der wilden Katze und dem Caracal, also von der Größe des Schakals, 2 Fuß 1 Zoll 8 Linien Länge, Schwanz 9 Zoll 3 Linien, Schulterhöhe 12 Zoll, Kruppenhöhe 13 Zoll 6 Linien, Kopf 4 Zoll 10 Linien, Ohren vom Scheitel aus 1 Zoll 10 Linien, am Außenrande 2 Zoll 4 Linien. Die Färbung nähert sich auch der des Schakals. Der Wuchs ist weniger schlank als am Caracal, mehr dem der Katze ähnlich, aber stärker. Der Kopf verhältnißmäßig klein, die Nase länglich und wie bei der Katze durch einen Streifen getheilt, welcher als eine nackte Linie in die Lippe übergeht. Das Ohr ist im Umkreise weiß. Die Vorderzähne sind klein, stumpf, ziemlich gleich, jederseits der äußre ziemlich groß, kegelförmig; von den Backzähnen ist oben der erste klein, der mittlere dreieckig, der hinterste am größten und dreispitzig, nach hinten sich fortsetzend; unten gleichfalls drei, der erste kegelförmig, etwas kleiner als die andern. Schnurren in 4 Reihen, die meisten und größten Borsten weißlich, die obersten schwärzlich. Eine zweischenkelige Nath beugt sich über die Nase beiderseits vor dem Augenwinkel hin. Die Augenbraunwarze trägt 5 schwärzliche Haare und eine weiße Borste, Backenwarzen mit einer großen weißen Borste, Warzen über der Ohrdrüse mit zwei Borsten. Ohren groß, zugespitzt, an der Spitze schwarz, mit kurzem, schwarzem Haarpinsel, außen röthlich, inwendig die Höhlung mit blaßen Haaren umstellt. Der Leib ist kräftig gebaut, die Glieder mäßig dünn, die Klauen hornfarbig gelblich. An den Vorderbeinen befindet sich hinten an der Pfotenwurzel und etwas nach außen eine warzenartige Schwiele, welche nackt ist und sehr hervorragt. Die Klauen sind zolllang und ziehen sich gänzlich in ihre Scheiden zurück, die Ballen sind schwarz und ebenso wie der Streif, welcher von den Ballen nach dem Fersenbeine aufsteigt, wie bei den Hasen mit dichten, rückwärtsgerichteten Haaren besetzt, welche nach dem Fersenbeine hin rothgelb werden. Der Schwanz ist dünn wie bei den Katzen, mit dem Rücken gleichfarbig, die Spitze schwarz und von derselben gegen die Mitte hin drei und ein halber schwarzer Ring sichtbar. Oberlippe und Kinnlade ist weiß, die Kehle gelblich, Hals und Leib unterseits blaßrostgelblich, ebenso der Umkreis der Augen, mit untermischten schwärzlichen Haaren; die Beine rostgelb, sehr verloschen wellenstreifig, Rumpf oben aus dem bräunlichgrauen aschgraulich, die längeren Haare an der Spitze

Digitized by Google

schwarz, blaß geringelt. Unterhaar bräunlichgrau-aschgraulich; die Haare etwas straffer als bei der Katze, auf dem Rücken im Winter anderhalb Zoll lang und darüber.

Der Kirmyschak findet sich häufig im Schilfe der Sümpfe in den subalpinischen Waldungen am kaspischen Meere und am See Aral, dann am Flusse Terek, besonders aber im nördlichen Persien. Er lebt wie die Luchse und wilden Katzen, nährt sich von Geflügel, welches im Schilfe übernachtet, von Mäusen und auch von Fischen. Die Perser nennen ihn wilde Katze, und auch in der Gefangenschaft legt er seine Wildheit nicht ab.

46. Der Rüppelsche Luchs. Felis Rüppelii Brandt.

Franz.: le lynx Ruppel. —

Kennzeichen der Art: röthlichgrau, Beine rostgelb, Schwanz kaum länger als Kopf, mit schwarzer Spitze und zwei schwarzen Ringen vor der Spitze.

Das bekannt gewordene Weibchen, welches der berühmte Reisende Rüppel erlegte, hatte 2 Fuß 1 Zoll Länge, der Schwanz betrug 8 Zoll. Der Herausgeber des Rüppelschen Atlas, D. Crezschmar, giebt die genaue Beschreibung. Die Behaarung ist stark, das wollige Grundhaar ist sehr weich und bedeckt den Körper in großer Menge, die Borstenhaare sind seltner und rauch. Das wollige Haar hat überall eine schmutzige hell ockergelbe Farbe, die auf dem Rücken dunkler, auf dem Leibe heller ist. Die Borstenhaare haben am Grunde dieselbe Farbe, in der Mitte einen schwarzbraunen Ring, und sind an der Spitze im Allgemeinen graugelb oder weiß oder saffrangelb, wodurch das ganze Farbenkleid ein graugelb und weiß gemischtes Ansehen erhält. Viele Borstenhaare sind mit einer schwarzen Spitze versehen und bilden an den Seiten des Leibes, wo mehrere beisammenliegen, schwache schwarze senkrecht oder schräg laufende Wellenlinien, auch hier und da einzelne schwarze Punkte. — Die Borstenhaare des Rückens haben hell ockergelbe, beinahe saffranfarbige Spitzen, und bilden längs desselben von den Schultern bis zu dem Schwanze einen gelben Streifen, der auf dem Kreuze am stärksten gefärbt ist. Die Schnautze ist ziemlich stumpf, die Nase schwarz und auf ihrem Rücken ockergelb; über jedem Auge ist ein größerer und unter demselben ein kleinerer weißer Fleck. Von dem innern Augenwinkel zieht ein schwarzer Streifen zur Nase hin. Die Lippenränder sind schmal und schwarz eingefaßt, so wie ober- und unterhalb mit einem schönen weißen Ringe umgeben; die Augenbraunen, Backen und Bartborsten sind weiß, und bei den letzteren befinden sich einige glänzend schwarze. Die Ohren sind an dem innern Rande der vordern Seite mit weißlich gelben Haarbüscheln eingefaßt, an der hintern Seite graubraun, an der Spitze braun, und endigen mit einem schwarzen, einen halben Zoll langen Büschel. Wangen, untere Kinnlade, Kehle, Hals und Brust sind ockergelb; der Leib spielt ins Weißgelbe mit dunklen Flecken. Die äußere Seite der vorderen und hinteren Gliedmaßen behält die allgemeine Farbe bis zu den Fußwurzeln, welche schmutzig ockergelb und hinten schwarz sind, auch bemerkt man auf deren Fläche 4 oder mehr schwarze Querbänder. Die innere Seite der Extremitäten ist gelb, an den vorderen ist ein runder, großer, schwarzer Fleck. Der Schwanz beträgt den vierten Theil der Körperlänge, und ist im Ganzen cylindrisch und graulich. Die Spitze desselben ist schwarz und stumpf; zwei schwärzliche Ringe, die hier nahe liegen, sind durch eben so viel grauweißliche getrennt, beide jedoch nicht vollkommen deutlich. Diese

Digitized by Google

Art bewohnt das nördliche Afrika, das beschriebene und abgebildete Exemplar wurde am See Menzale erlegt.

Der Herausgeber des Rüppelschen Atlas hielt das Thier für den Kirmyschak; H. D. Brandt hatte Gelegenheit mehrere Exemplare des Kirmyschak zu vergleichen, und machte zuerst *) darauf aufmerksam, daß das gegenwärtige eine gänzlich verschiedene, neue Art sey, welche sich durch bedeutendere Größe und weit kürzeren Schwanz, schon ohne nähere Vergleichung, leicht unterscheidet.

47. Die Fuchskatze. Felis planiceps Horsf. et Vigors.

Franz.: chat à tête applatie. — Engl.: the flat-head Cat.

Kennzeichen der Art: rothbraun, Seitenhaare weißgespitzt, zwei Stirnstreifen, die Wangen, Kehle, Brust und Bauch weiß.

Diese, von den übrigen merkwürdig abweichende, durch ihre Kopfbildung einen Uebergang zu den Füchsen eröffnende Katze wurde erst neuerlich durch Sir Stamford Raffles in Sumatra entdeckt. Ihr Haare sind über den Rücken hin dunkler, deren Farbe ist überhaupt genommen ein dunkles Braun, nur an der Basis und Spitze sind die einzelnen Haare rothbraun. — Diese kleine Katze hat 18 engl. Zoll in der Länge, der Schwanz hält 5½ Zoll, der Kopf 4 Zoll, die Schulterhöhe 7½ Zoll, die Kruppenhöhe 8 Zoll. Sie zeichnet sich aus durch den außerordentlich flachen Schädel; diese Flachheit geht von der Nase nach dem Maule, an den Seiten ist er breit. Der Kopf selbst ist gestreckt fast walzenförmig, die Entfernung zwischen Augen und Ohren verhältnißmäßig groß. Die Breite zwischen den Ohren 2¼ Zoll. Die walzige Gestalt und seitliche Zusammenziehung des Kopfes contrastirt sonderbar mit der ungewöhnlichen Länge der Zähne. Die Spitzzähne besonders sind fast so lang als bei andern Katzen von doppelter Größe. Die Spitzzähne stimmen in der Zahl mit denen der übrigen, sind aber mehr als gewöhnlich zusammengedrückt und die Seitenspitzen mehr entwickelt. Das Thier ist schlank, die Gliedmaßen lang und zart. Zehen sind ebenso viele als bei den übrigen Katzen. Die Zungenwärzchen sind hervorragend und scharf; der Schwanz verhältnißmäßig kurz. Die Herrn Horsfield und Vigors verglichen zwei Exemplare in Spiritus, wornach sie die Beschreibung und Abbildung gaben.

Die Art weicht schon in mehren Stücken von den wahren Katzen ab. Gestalt des Kopfs, Länge der Eckzähne, die zusammengedrückten Mahlzähne (grinders) mit starken Spitzen, nähern sie der Gattung Prionodon, doch fehlt die spitzige Nase, der überzählige Zahn und der lange Schwanz, das bemalte Fell und noch andre Eigenheiten dieser Gattung. In Gestalt und Ansehn nähert sie sich auch den Mardern, aber das Gesicht und der Wuchs kommt doch wieder mehr mit dem der Katzen überein. Erst eine genauere Kenntniß, welche aus Beobachtungen ihrer Lebensweise hervorgehen wird, kann ihren festen Platz im Systeme bestimmen.

Während ich dies schreibe, erhalte ich eben auch die Felis Jaguarundi in Natura, und kann nun auch von dieser seltnen und in neueren Zeiten nicht wieder abgebildeten

*) im Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou. 1832. IV. p. 209.

Digitized by Google

Art eine getreuere Darſtellung geben. Auf ein paar Nachtragstafeln folgen dann zur Vervollſtändigung die indeſſen erhaltenen zuſammen: **Felis leo senegalensis, asiaticus, leo-tigris, Irbis (Uncia), catenata, elegans, undata, javanensis, sumatrana, bengalensis (neu) Diardi in beiden Geſchlechtern, himalaiana, servalina (ornata), Jaguarundi, angorensis, catus carthusianorum, Foina-domestica, Caracal bengalensis, canadensis.** —

Hundegeſchlecht. Canis.

a. Füchſe: mit länglicher Pupille, fortlaufendem Oberrande der Schneidezähne, keulenförmig langbehaartem Schwanze (Standare). Graben ſich Höhlen.

b. Schakals und Wölfe: mit runder Pupille und Schneidezähnen mit tiefen Einſchnitten, obere dreiſpitzig, untere zweiſpitzig; Schwanz hängend, weniger buſchig.

c. Hunde: mit runder Pupille und an der Spitze aufwärtsgebogenem kurzharigem (Ruthe) oder mähnenartig behaartem (Fahne) Schwanze. *)

a. Füchſe.

48. Der Fennec. Canis Zerda Zimmerm.

Franz.: le Renard Fennec. — Dongolaniſch: Abu ruhf. — Arabiſch: Fennec nach Bruce. Zerda, Jerd oder Jerda, Benennung der Mohren nach Sköldebrand. — Vulpes minimus Saharensis Sköldebr. — Zerda Sparm. — Animal anonyme Buff. — Viverra aurita Blumenb. — Megalotis Cerdo Illig. — Canis pygmaeus oder Saharensis oder C. Megalotis Leuckart. — Fennecus Desmar. Desmoul.

Kennzeichen der Art: ſtrohgelblich, Kopf und Unterſeite weißlich, ein Fleck unter den Augen ſtrohgelb, Schwanz von der Länge des Rumpfes, außerhalb der Mitte und an der Spitze ſchwärzlich, Ohren ſo lang als der Kopf, außen gelblichgraulich.

Ein, wie die obige Aufzählung der Namen angiebt, von den Schriftſtellern ſehr verſchieden beurtheiltes und deshalb in verſchiedene Gattungen geſtelltes Thier, deſſen wahre Verwandtſchaft eigentlich erſt durch den Dr. Cretzſchmar, Herausgeber des den Rüppelſchen Thieren gewidmeten Atlas berichtigt und am beſten beſchrieben worden iſt.

Die Länge beträgt 1 Fuß 11 Zoll 4 Linien, davon der Schwanz 8 Zoll 6 Linien, Kopf 3 Zoll 6 Linien, Ohrenhöhe von innen 3 Zoll 6 Linien, größte Breite der Ohren 2 Zoll, Entfernung derſelben eben ſoviel, Schulterhöhe 7 Zoll 9 Linien, Kreuzhöhe 8 Zoll 2 Linien. Die Hauptfarbe iſt ſtrohgelb, in's iſabellfarbige ziehend. Die wolligen Haare ſind an der Wurzel ſchmutzig weiß, gehen an den Spitzen in iſabell über und ſind äußerſt weich und zart. Die meiſten Borſtenhaare haben die letztere Farbe, ausgenommen den ganzen Lauf des Rückens und die Hinterbeine, auf welchen Theilen ziemlich viel ſchwarze und einzelne weiße durchſchimmern. Am Kopfe ſind einzelne Stellen ganz weiß, als: ein Fleck über und einer unter dem großen dunkelbraunen Auge, ſo wie die Seitentheile der Schnauze, welche ſehr ſpitz zuläuft und ſelbſt glänzend ſchwarz iſt;

*) Bei Betrachtung der Gattungen folgen die Kennzeichen, welche ſich am Schädel darbieten.

Digitized by Google

von dem innern Augenwinkel zu dieser läuft ein bräunlicher Streifen. Die sehr langen Bartborsten, die Augenbraunen und Backenborsten sind glänzend schwarz. Die Ohren sind weit aufstehend, im Eingange fand Cr. bei 3 untersuchten Exemplaren einen röthlichen feinen Sand, der denselben wie eine Kruste bedeckte. Das Ohrläppchen ist stark ausgebildet und ragt 4 Linien über den äußern Rand des Ohres hinaus. Die hintere Fläche des in Beziehung auf den Körper überaus großen Ohres hat die oben angegebene allgemeine Farbe; die vordere und innere ist fleischfarben und an dem innern Rande mit 1 Zoll langen weißen Haaren besetzt; die Lippenränder sind schwarz eingefaßt, das Kinn ist weiß und von der untern Kinnlade an vermischt sich das Weiße mit dem Isabellfarbigen dergestalt, daß die Gränze des Uebergangs dieser Mischung zum weißen Unterleibe nicht bestimmt werden kann. Der Schwanz fällt im Ganzen mehr in das ockerfarbige, ist stark buschigt, wie bei den Füchsen im Allgemeinen; hat 1½ Zoll von der Wurzel oberhalb einen schwarzen, dreieckigen Fleck, dessen Spitze nach vorn gerichtet ist, schwarze Borstenhaare auf der ganzen obern Länge desselben, welche an der Spitze näher zusammentreten und einen schwarzen Büschel bilden. Die Fußsohlen sind durchaus mit einem starken wolligen Haare bedeckt, so daß das Thier auf diesem wirklich auftritt. Die stark und beinahe gerade herausstehenden Nägel, welche an den Vorderbeinen 4 Linien, an den Hinterbeinen 3 Linien lang sind, haben eine weißliche Farbe, und sind offenbare Grabenägel. Die Zähne sind wie bei den Hunden vertheilt, oben und unten 6 Schneidezähne und 2 Eckzähne, oben zusammen 12 und unten 14 Backenzähne.

Rüppel erlegte das, dem nördlichen Afrika angehörende Thier in den Gegenden von Ambukol und der Wüste von Korti. Die Einwohner nennen das niedliche Thier nach eingezogenen Erkundigungen Fennek, und sagen, es fände sich bis zur Grenze von Egypten. Der Fennek hält sich in Sandwüsten auf, wo er sich Höhlen gräbt, wohl nicht auf Bäumen, wie Bruce berichtete. Derselbe Reisende erzählt *), er habe erfahren, daß das Thier in Biscara nicht ungewöhnlich sey, häufiger in der Nachbarschaft der Districte von Beni-Mezzab und Werglah, den ehemaligen Wohnplätzen der Melano-Gätulen, wo man den Fennek auch um seines Felles willen zu jagen pflege. Die Felle bringt man nach Mekka, und von da auch nach Indien. Bruce hielt, als er Consul in Algier war, ein Exemplar lebendig im Käfig.

49. Der großöhrige Fuchs. Canis megalotis Desmar.

Franz.: le Renard de Lalande, aux grandes oreilles.

Kennzeichen der Art: graulichbraun, Rücken und Beine dunkler, Ohren wenig kürzer als Kopf, weißgerandet, Schwanz an der Wurzel sehr lang behaart.

Diese Art hat den Wuchs des gemeinen Fuchses, der Kopf ist verhältnißmäßig kleiner, die sehr großen Ohren haben am Außenrande unten einen doppelten Umschlag, der Schwanz ist besonders dadurch ausgezeichnet, daß er an der Basis so lang behaart ist, als an der Spitze. Der ganze Pelz ist wolliger als bei irgend einer Fuchsart, am meisten unterseits; die Vorderseite der Beine fast schwärzlich, ebenso der Rücken und die Schwanzspitze. Auch die Pfoten tragen ein etwas gekräuseltes Haar. — Delalande entdeckte diesen Fuchs im Lande der Caffern.

*) in der oben von mir citirten englischen Ausgabe S. 128.

Digitized by Google

50—52. Der Nilfuchs. Canis niloticus Geoffr.

Franz.: le Renard d'Egypte. — Arab.: Taleb, Tsalib (in Aegypten der Name des Canis Anubis). — Arab. in Aegypten: Abu Hagsehn und Abu el Hossehn, oft Abuhossehn, Abelhossehn und Abelhasseln. — Berbern in Dongola: Abuhessinga.

Kennzeichen der Art: rothgelb, Lippen und Schwanzſpitze weiß, Unterhals und Bauch graulich.

Der Nilfuchs iſt von Wuchs etwas ſchlanker, doch wenig kleiner als der gemeine Fuchs; Ehrenberg giebt die genauere Ausmeſſungen mehrer Individuen, ein männliches maaß im Ganzen 2 Fuß 11 Zoll 3 Linien, mit Abrechnung des Schwanzes 1 Fuß 10 Zoll 9 Linien, die Schwanzruthe etwa 1 Fuß, mit der Behaarung 1 Fuß 3 Zoll 3 Linien. Die Beine und der Pelz und ſelbſt die Knochen ſind dünner, als am gemeinen Fuchs, er erſcheint deshalb hochbeiniger, doch ſind die Beine nicht länger. Der Kopf hat ein Viertheil von der Körperlänge. Die Ohren ſind länger als der halbe Kopf. Die Vorderbeine ſind vom Ellenbogen aus um ein Drittheil der Kopflänge länger als der Kopf. Dieſer iſt faſt um einen Zoll länger als die Hinterpfoten. Die Schwanzruthe hält etwa zwei Kopflängen. Die Vorderpfoten ſind nicht viel über halb ſo lang als die hintern. Die Schnurren ſind halb oder faſt zwei Drittheil ſo lang als der Kopf. Die Rückenhaare ſind 1 — 1½ Zoll lang, haben viel Wollhaar um ſich, ſind weich und bunt, die dünne Baſis iſt kraus und weiß, die Mitte breit ſchwarzbraun, nach oben geht das Weiße in Rothgelb über, die Spitze iſt ſchwarz. Das Wollhaar iſt kraus, unten grau, oben rothgelb, in der Nähe der Schulterblätter und der Ohren gelblich-weißlich. Das Schwanzhaar iſt etwa zwei Zoll lang, nach dem Ende hin noch länger. Die Schnurren alle ſteif und ſchwarz. Die Farbe iſt im Allgemeinen graulich-rothgelb, an den Seiten graulich, über den Rücken läuft ein breiter röthlichgelber Streif. Der Kopf iſt gelblich, die Seiten der Naſe und ein Fleck um die Augen iſt höher rothgelb, die Naſenſpitze ſchwarzbraun. Der Maulwinkel iſt ſchwarz, der Maulrand nach vornhin weiß, die Unterkinnlade in der Mitte der Spitze graulich-braun. Die Beine ſind außen rothgelb, vorn ſchwarz überlaufen. Unten überall braunſchwärzlich mit weißgefleckten Haaren. Der Bauch und der Schwanz überhaupt iſt ſchwarz geſäumt. Die Oberarme und Scheinbeine ſind innen weißlich, nach oben jedoch ſchwärzlich. Die Ohren inwendig weiß, außen ganz ſchwarz, nur die Winkel am Grunde beiderſeits und der dünne Außenrand ſind blaßgelblich. Die Klauen hornfarbig-weißlich. Der Schwanz dicht behaart, dick, oberhalb an der Wurzel rothgelb, nach der Spitze und unterſeits gelb, die Spitzen der Haare unten in längerer Ausdehnung ſchwarz, die Schwanzſpitze blaſſer, nicht eigentlich weiß. Drei Zoll unter der Schwanzwurzel oberſeits ein ſchwärzlicher, verloſchner Fleck. Der lockre Schwanz iſt über 3 Zoll dick. Die Iris im Leben braun und goldfarbig geſcheckt.

Der Fuchs Aegyptens wurde ehedem nicht von dem Europa's für verſchieden gehalten; Ariſtoteles, Proſper Alpin, auch Georg Cuvier und Desmoulin hielten beide für einerlei, Geoffroy St. Hilaire und Friedrich Cuvier unterſchieden beide Arten zuerſt, was in Deutſchland durch die von Ehrenberg und Rüppel geſendeten Exemplaren beſtätigt worden iſt.

Digitized by Google

52 b. Der Blaßfuchs. Canis pallidus Rüpp. et Cretzschm.

Franz.: le Renard paille. — Dongol.: Abu suhf.

Kennzeichen der Art: Kopf, Nacken, Halsband, Rückseite und Schwanz aus dem strohgelben röthlich, Ohrdrüsengegend, Unterhals, Brust und Bauchseite weißlich; Rücken aus weiß, schwarz und röthlich bunt, Schwanzspitze schwarz.

Der Blaßfuchs ist wie der Fennek eine niedliche, schlanke Fuchsart. Die Länge beträgt 1 Fuß 7 Zoll 8 Linien, die des Schwanzes überdies 10 Zoll; der Kopf ist 4 Zoll 6 Linien, die Ohren 2 Zoll lang, die Schulterhöhe beträgt 9 Zoll 3 Linien, die Kreuzhöhe 9 Zoll 10 Linien. Die Hauptfarbe ist ein blaßröthliches Strohgelb. Die Wollhaare sind durchaus von derselben Farbe, nur auf dem Rücken an ihrer Wurzel grau, überaus zart und dicht. Die Oberhaare ziemlich rauch und zahlreich genug um ersteren ganz zu verdecken. Nase, Augenlieder, Schnurren und Augenbraunen sind schwarz, die Iris hellbraun. Auf dem ganzen Kopfe sind weiße Haare eingemischt. Die Ohren mittelmäßig, spitz, weißlich gesäumt, innerseits kahl, am Eingange steht ein kleiner Haarbüschel. Die Hinterseite mit kurzen Häärchen von der allgemeinen Farbe bekleidet. Schläfegegend, Kehle, Hals, Brust und Unterleib weißlich. Den Hals umschlingt ein blaß-strohgelbes Band. Auf der ganzen Länge des Nackens und Rückens ist eine gleiche Mischung von röthlicher, schwarzer und weißer Farbe vertheilt. Diese entsteht dadurch, daß die Borstenhaare dieser Theile einen weißen Ring haben und bald mit schwarzer, bald mit röthlicher Spitze endigen. Auf der Rückseite des Schwanzes ist einen Zoll unter dessen Wurzel ein schwarzer, ungleicher Fleck bemerkbar. Viele Borstenhaare desselben laufen in schwarze Spitzen aus und sind an dessen Ende zu einem schwarzen Büschel vereinigt. Die innere Seite der Füße, so wie die vordere der Läufe sind weißlich, die äußere Seite des ganzen vorderen Fußes, ein Fleck auf der Schiene und der hintere Theil der Fußwurzel an den Hinterbeinen rothbraun. Die Fußsohlen ziemlich mit Haaren bedeckt, die weißen Nägel lang und etwas gekrümmt.

Rüppel sammelte drei Exemplare am Brunnen Nedger im Kordofan, auch im Darfur schien er überall gekannt. Die Benennung der Araber Abu Hossein fand Ehrenberg, wie wir gesehen haben, zu einer andern Art gehörig. Der Blaßfuchs gräbt Höhlen, die er am Tage bewohnt, und jagt zur Nachzeit kleinere Säugthiere und Vögel. Er ist ein überaus gewandtes, schlaues Thier, das sich nur selten in Fallen fangen läßt.

53. Der Schmalfuchs. Canis famelicus Rüpp. et Cretzschm.

Franz.: le Renard grêle. — Dongol.: Sabbar.

Kennzeichen der Art: Kopf ockerfarbig, Rückenstreif kastanienbraun, Rumpf oben graulich-gelblich, unten aus dem weißen gelblich; Ohren zwei Drittheil so lang als Kopf, aufrecht.

Der Schmalfuchs hält 1 Fuß 8 Zoll Länge, der Schwanz überdies 1 Fuß 2 Zoll, der Kopf 3 ½ Zoll, die Ohrenhöhe 3 Zoll 10 Linien, die Breite der Ohren nur 1 Zoll 10 Linien. Das Wollhaar ist äußerst zart seidenartig und dicht, isabellfarbig, nach dem Rücken hin grau. Die Oberhaare haben auf dem Rücken einen weißen Ring, und endigen mit einer glänzend kastanienbraunen Spitze, wodurch der Längsstreif entsteht.

Digitized by Google

Die langen Schwanzhaare sind oben schwarz, unten so wie die Spitze des Schwanzes isabellfarben. Hals, Brust und Unterleib sind weißlich isabellfarben; den ersteren umgürtet an der Brust ein Ring von dunklen Borstenhaaren. Die schwarze Schnauze des spitz zulaufenden Kopfes ist weiß eingefaßt. Die Lippen sind weiß; die obere schneidet scharf ab mit einem röthlichen Streifen, der von dem Auge bis zu einem schwarzen Flecke zieht, aus welchem die Bartborsten entspringen, die, so wie die Augenbraunen und Backenborsten schwarz sind. Der ganze übrige Kopf ist bis zum Nacken hell ockerfarbig. Die Augen sind braun. Die sehr langen aufrecht stehenden Ohren sind an der äußern Fläche graulich, an der innern nackt und fleischfarbig, am innern Rande mit langen weißen Haaren besetzt, und der ganze Rand mit einem gelben niedlichen Saume eingefaßt. Die Vorderbeine sind auf der äußern Seite röthlich ockerfarben, an der innern blaßgelb mit einem grauen Streifen längs der vordern Seite. Die hintern sind bis zum Knie mit der allgemeinen Haarbekleidung bedeckt, unter demselben ist ein röthlicher Fleck, der bis zur Fußwurzel reicht, welche, so wie die ganze innere Seite, blaßgelb ist. Die Zehen und Sohlen sind in ein dichtes, langes, welliges, gelbes Haar eingehüllt, aus dem die langen, weißen Nägel hervorstehn. Am jungen Thiere sind die Farben greller, die Rückenstreifen breiter, die schwarzen Oberhaare häufiger und die Schwanzspitze ganz weiß.

Rüppel fand diese Art in den nubischen Wüsten und im Kordofan; sie lebt in sandigen Wüsten, gräbt Höhlen und jagt Vögel und kleinere Säugthiere. Nach ihm nennen sie die Araber: **Sabora.** Cretzschmar macht auf die Aehnlichkeit dieses Thieres mit dem auf den ägyptischen Tempeln und Königsgräbern abgebildeten Schakal aufmerksam.

54—60. Der Fuchs, Birkfuchs. Canis Vulpes Linn.

Griechisch: ἡ ἀλώπηξ, -εκος. — Alt- und Niederdeutsch: Vos, Voss, port. Reineke. — Franz. Renard commun. — Ital. volpe. — Engl. the Fox. — Britann. Llwynog, Llwynoges. — Schwed. Räf. — Spanisch Zorra. — Portug. Rapoza. — Polnisch Lis, Liszka. — Russ. Lissitza, Liska, auch nach dem Tatarischen: Tulke. Tatar. Tulko oder Tylki, am Jenisei Tilge. Tschuwasch. Tihle: Jakuten: Ssassil, rothe: kysil-Ssassil, schwarze: kara-Ssassil, im Allgemeinen: Tylgiak und Achass. Mongol. Ochoegae. Burät. und Kalmukk. Unegoen, bei letztern auch Aratu. Tunguf. Seulaki. Dauur. Solaki. Lamut. Sjuli. Jucagir. Tschadala. — Esthen. Rebbane. Lett. Lapsa. Finn. Repo, Rewon, kettu, Ketun. Permiens. Butsch. Mordwin. Killas, Kelas. Wotjak. Zussi und Dshitschi. Wogul. Tolmach (d. i. Dieb), auch Okschar. Tscheremiss. Rebesch. — Wotjak. Ostjak. Wochsar oder Uachsar. Surgutsk. Wokai. Narymens. Locha. Wasjugan. am Jenisei: Wokkai, am Fl. Kas Kotan, der schwarze: Tomkan. — Samojed. am Petschora: Tunke, am Ob: Tjune. Jurák. Tocne, am Mangazea: Todde. Tawgy. Tunte Karagass. Locka und Lui. Kotkal. Mingei. Narymk. Löga. — Armger am Jenisei: Kaogon, Chorgen und Ljene. Kamatschdy. Mingi — Tunguf. Schulaki; in Daurien: Solaki. Lamut. Sjuli. Kerák. Jajun od. Jajuhl. Kamtschadal. Eschingasch, bei andern Tschaschtual: am Fl. Ukt: Eschitsch, am Ital: Tschael. Karagass. Jacjolbil. — Kamt. Yabr und Kimultpe, (der schwarze Fuchs): Sollukpeer. Japon. Kisne. Aleut. Jers. Kokiak. Koschak. — Tunguf. Wa. Indisch Lobaeri. — Armen. Achwell. Georgisch Mela. — Osset. Bunsch. Tschetschens. Zozal. Tscherkess. Badsche. — Deutsche Jägernamen sind noch: Feldfuchs, Waldfuchs, Hundfuchs.

Kennzeichen der Art: fuchsroth, unten blasser, Ohren hinten schwarz, Schwanz keulenförmig, sehr stark behaart, an der Spitze weiß.

Die gewöhnliche Länge des ausgewachsenen Birkfuchses ist 2 Fuß und etliche Zoll, der Schwanz über 1 Fuß 3 Zoll. Auf dem gelbrothen Grunde des Pelzes sticht die Oberlippe, Unterkinnlade, Kehle und Brust durch weißliche Farbe hervor, an den Ohren ist wenigstens die Spitze schwarz. Die Hinterbeine sind innerseits weißlich, die Zehen

Digitized by Google

und ein Theil des Mittelfußes ist schwarz, die Schwanzhaare an ihrer Spitze schwärzlich, die Schwanzspitze weiß. Das Wollhaar ist gelbgrau. Auf dem Schwanze steht oberseits etwa dritthalb Zoll von der Basis eine Drüse (die Viole), welche eine wie Veilchen riechende Feuchtigkeit absondert. Im Ganzen hat das Thier überdies einen eigenthümlichen, wiedrigen Geruch.

Das Vaterland des Birkfuchses ist auch nach Absonderung einiger sonst mit zu ihm gerechneten, wahrscheinlich specifisch verschiedener Thiere, noch sehr ausgedehnt. Er bewohnt erstens ganz Europa, ist auch sowol im ganzen europäischen Rußland als in ganz Sibirien häufig bis zum östlichen Ocean, und findet sich auch in Amerika über die Inselkette, welche sich vom Vorgebirge Alaeska hinzieht. In den südlichen Niederungen ist der Fuchs von Pelz und Farbe schlechter, schöner in den kalten, nördlichen und östlichen Gegenden, am allerschönsten, vorzüglich rothschillernd, in Kamtschatka, wo er deshalb Oynaepki, d. i. Feuerfuchs, genannt wird. Die Caucasischen und Taurischen sind blasser und unansehnlicher. Abänderungen giebt es vorzüglich in Sibirien viele. Bei dem rothen ist bisweilen das Rückrath und ein breiter Querstreif über die Schultern kreuzförmig, dies sind die dortigen Kreuzfüchse: Krestovky, deren es auch in Lappland giebt. Bei andern sieht Brust und Bauch längshin mehr dunkelbraun oder schwärzlich, diese nennt man Siwoduschky oder Tschernoduschky, und bei diesen finden sich wieder, aber sehr selten, Bauch und Beine weiß und schwarz fleckig gescheckt, der Schwanz fast zur Hälfte weiß. Auch kommen rothglänzende vor, welche unten ganz weiß sind. Seltner und kostbarer ist die ganz schwarze Abänderung, an welcher nur die Schwanzspitze weiß ist; und von dieser wieder ausgeartet, die halbschwarze, an der die Seiten des Nacken und Rumpfes mehr oder minder breit mit weißen oder weißgrauen Haaren untermischt sind. Sie heißen dann je nach der Breite der Schwärze auf dem Rücken Burajá oder Tschernoburajá, oder, wenn der ganze Rücken grau ist und nur der Nacken und die Vorderseite des Rumpfes schwarz: Burinkajà, auch Tschalaja. Bei diesen sind oft die Spitzen der Hinterzehen weiß, der Schwanz hat immer seine weiße Spitze. Es giebt auch eine ganz weiße Abänderung, welche wieder, wie Pallas an zahlreichen Fellen sahe, vielfach ändert; ganz schneeweiß oft mit einigen schwarzen Haaren an der Schwanzspitze, auch mit gelblichen Ohren und Beinen, bisweilen mit einem oder dem andern verloschenen, rothgelben oder gelben Flecke an der Seite des Nacken oder Kopfes. Auch sahe Pallas einen schneeweiß mit schwarzem Rande der Augenlieder, einen andern mit drei röthlichen Wischflecken, nämlich über den Schultern, auf der Mitte des Rückens und über den Hüften, der Kopf zugleich weiß-röthlich, die Ohren an der Basis weiß, dann halb fuchsroth, an der Spitze schwarz, die Vorderbeine röthlich, nach außen längs schwarz, Hinterbeine hinterwärts längs roströthlichbraun. Güldenstedt sahe bei Kislar eine mit sechs Jungen gefangene Füchsin, unter denen ein männliches ganz weiß war. Dergleichen weiße Füchse dürfen ja nicht mit den Eisfüchsen (No. 74—79) verwechselt werden. Auf den von den Russen sogenannten Fuchsinseln ist die schwarze und halbschwarze Abänderung häufiger als die fuchsrothe, sie ist größer, der Pelz straffer und grober, was vielleicht davon herrühren mag, daß sie mehr von Seethieren leben und sich zwischen Felsen aufhalten. Jene schwarzen Inselfüchse, bei denen außer der Schwanzspitze meist noch ein Fleck an der Kehle, auch wohl am Bauche (wie bei den sibirischen) weiß ist, schätzt man in Rußland gar nicht, man erkauft sie weit wohlfeiler als jene an die Chinesen. Auf den Inseln zunächst Kamtschatka fehlen die eigent-

Digitized by Google

liche Füchse und sind dort durch die häufig vorkommenden Eisfüchse ersetzt. In Amerika sind eigentliche weiße Füchse äußerst selten. Pallas sahe von dorther ein Fell, welches weißlich war, über den Rücken hin und am Schwanze röthlich, unten so wie die Beine schönweiß, aber die Hinterpfoten mit schwarzen Längsstreifen. Im südlichen Europa hat der Pelz meist eine höhere Färbung und im Winter mehr Schwarz. Der Prinz von Musignano, Carlo Luciano Bonaparte, beschreibt den in Toskana, Neapel, Sicilien und Sardinien vorkommenden Fuchs mit weißer Schwanzspitze unter dem Namen „Volpe di ventre nero," Canis melanogaster: fuchsroth, unten schwärzlich; Gliedmaßen vorn, Ohren hinten schwarz; Schwanzspitze weiß. Er hält ihn von dem in Piemont und der Lombardei vorkommenden Fuchse für wesentlich verschieden und bildet ihn ab. *)

Zum Aufenthalte liebt der Fuchs die Wälder, vorzüglich in der Nähe der Dörfer, wo er einsam oder paarweise sein Revier hält, obwohl er nie in der Nähe seines Baues jagt. Junge, weniger vorsichtige Füchse bauen bisweilen in's freie Feld. Man bemerkt, daß die Füchse aus Rußland in manchen Jahren nach der Gränze von Sibirien, vorzüglich nach Kamtschatka wandern. Treffen sie dabei auf Züge von Wandermäusen, welche oft in so ungeheuerer Menge erscheinen, daß sie überall den Boden durchwühlen, so kann man sagen, daß ihre Zahl nicht geringer ist, als die dieser Mäuse. Die Flüsse setzen ihnen dann ungeheure Züge von Fischen an den Ufern ab; der Geruch der Fische scheint sie gleichsam von fernher anzulocken. In andern Jahren ziehen sie wieder fort, und nur wenige bleiben zurück. Nach ihrer Ankunft ist es eine ganz eigenthümliche Erscheinung, daß sie unabläßig einzeln herumrennen, welchen Zustand die Jäger Pripusk nennen. Im entfernten Sibirien, besonders in Kamtschatka, waren sie vor der Ankunft der Russen, welche wegen der kostbaren Felle eine große Niederlage unter ihnen anrichteten, so häufig und zudringlich, daß sie um die Hütten herum Alles wegstahlen. Anderwärts finden sie sich unverzüglich ein, wenn sich die Hasen sehr vermehrt haben, deren Jagd sie vorzüglich lieben.

Die Wohnung des Fuchses ist ein von ihm gegrabener Bau, oder ein von ihm bezogener Dachsbau. Dieser Bau findet sich meist an abhängigen Niederungen oder unter Baumwurzeln, wo der Boden gewöhnlich trockner ist, hat einen großen, weiten, oft über 50 Fuß im Umfange, 3—6 Fuß in der Tiefe haltenden Mittelraum mit Kesseln und Kammern, und röhrenartige, oft sich durchkreuzende Ausgänge. Es giebt Beispiele, daß in einem solchen Baue ein Kessel von einem Fuchs und ein zweiter von einem Dachse bewohnt wird. In der Nähe dieses Baues legt sich der Fuchs wohl auch noch Fluchtlöcher oder Nothbaue an, welche einfache Röhren sind. Die Kammern befinden sich vor dem Kessel, sind meist oval, etwa 3 Fuß im Durchmesser, und haben gegenseitige Gemeinschaft. Der Fuchs ist ein nächtliches Thier, welches im Winter und dann wieder vom Mai an, während des Aufwachsens der Jungen, den Tag über im Baue zubringt, im März und April, so wie im Herbste, am Tage gewöhnlich außerhalb des Baues sich im Dickicht versteckt hält, und nur bei Verfolgung zum Baue flieht. Gern sonnt er sich und besteigt auch schiefstehende Bäume, auf welche ihm der Anlauf nicht schwer wird. Mit großer Schnelligkeit wechselt er unbemerkt seinen Platz. Vermuthet man ihn im dicken Waldgebüsch, so liegt er oft in einer Hecke im Dorfe

*) Iconografia della Fauna Italica. Fasc I. 1.

Digitized by Google

und lauert auf Hühner, und spürt man ihm im Felde nach, so hat er sich oft schon wieder im Walde verborgen oder liegt ruhig im Baue. Auf den Raub geht er in der Regel zur Nachtzeit aus, während er Junge hat auch am Tage. Die Beute besteht aus Wald-, Feld- und Hausgeflügel, jungen Hasen, jungen Rehen und Hirschen; er liebt aber auch sehr den Genuß von Honig, Eiern, Waldbeeren und Obst, vorzüglich Weintrauben. In Ermangelung dieser Nahrung nimmt er seine Zuflucht zu Amphibien, frißt Frösche und Eidechsen, auch Heuschrecken, Käfer und nackte Waldschnecken, Fische und Krebse, wobei man gefabelt hat, er fienge letztere mit dem Schwanze. Auch Aas verschmäht er nicht; im Winter frißt er sogar bei großem Hunger Menschenkoth. Alles Lebendige beschleicht er nach Katzenart; seine große List beurkundet sich in seiner Aufmerksamkeit auf alle Gegenstände seiner Umgebung, aus dem Vermeiden und Umgehen alles dessen, was ihm fremdartig dünkt, und aus dem Auffinden der noch so versteckten Gegenstände, welche dazu bestimmt waren, seinen Untergang zu bereiten. Selten verleitet ihn der Hunger auf den Köder einer Falle zu gehen, aber ein anderes Opfer in zugeschlagener Falle oder zusammengezogener Schlinge löst er geschickt aus und verspeißt es. Auch wenn ihm ein Sprung auf den Fang mißlungen ist, beträgt er sich wie eine Katze und schleicht beschämt von dannen. Seine Sinne sind sehr scharf, er hört (vernimmt), sieht (äugt) und riecht (wittert) ausnehmend gut und hat einem schnellen Lauf, wobei er den Schwanz (die Standarte) horizontal ausgestreckt trägt, bei ruhigem Gange hängt derselbe abwärts. Er macht im Nothfall weite Sätze und weiß nach Art der Wiesel und Marder in enge Räume und Spalten einzudringen und durch solche sich zu retten. Mit dem scharfen Gebiß schlägt er tiefe, schwerheilende Wunden. An einem Beine gefangen beißt er dies ab und läuft auf dreien davon. Was Menschen berührt haben erkennt er leicht durch seine Witterung und flieht es vorsichtig. Findet er sich sicher, so raubt er Vorrath und häuft ihn auf, ihn dann in Ruhe zu genießen. Um zu ruhen legt sich der Fuchs auf den Bauch und streckt die Vorderbeine nach vorn, die hintern nach hinten gerade aus, um zu schlafen krümmt er sich aber zusammen wie die Hunde. In ersterer Lager trifft man ihn auch auf der Lauer, wenn er Vögel beobachtet. Er bemächtigt sich der Beute durch den Sprung, wie die Katzen. Er durchsucht Gebüsche, Gras und Getraide mit Sorgfalt, und legt sich an den Wildbahnen auf die Lauer. Vogelschneusen entleert er systematisch nach der Reihe. Im Winter verfolgt er gesellschaftlich selbst erwachsene Rehe. Die Hummeln und Bienen treibt er mit dem Schwanze weg, wenn er ihnen den Honig nimmt, und was er nicht zu seinem Baue bringen kann, pflegt er auch zu verscharren. Die Stimme des Fuchses ist ein langgedehntes Bellen, man hört dies vor dem Eintritt der Stürme und bei großer Kälte. In der Angst schreit er jämmerlich, man hört wohl auch dann und wann eine murrende, keckkernde Stimme.

Die Füchse *belaufen* sich (ranzen, rollen) im Februar, gewöhnlich im zweiten Lebenszahre zum erstenmale. Das Weibchen läßt um diese Zeit einen heiseren Lockton hören; sie halten sich nur paarweise zusammen, und die Begattung scheint ruhig vor sich zu gehen. Die Füchsin trägt 9 Wochen, und wirft in ihrem Kessel auf ein weiches Lager aus Moos und Haaren 3 — 7 Junge, diese bleiben 10 — 14 Tage blind, sehen weißlichgelb aus, plump und wollig. Die Mutter liebt sie zärtlich, und während sie sie säugt, trägt ihr der alte Fuchs Nahrung zu. Nach einem Monate folgen sie der Alten vor die Höhle, wo sie mit einander spielen und abgerichtet werden, Mäuse u. a. kleine

Digitized by Google

Thiere zu haschen. Ein größeres Thier, z. B. ein Rebhuhn, zerreißen sie, nachdem sie es getödtet, in Stücken; jeder nimmt sein Stück, und verzehrt es knurrend in seinem Winkel. Bei herannahender Gefahr trägt die Mutter die Jungen im Maule davon, sonst fahren diese gewöhnlich plötzlich in die Höhle zurück. Sie fangen auch an zu bellen, wenn sie die Alten zu lange in der Höhle erwarteten. Im Juni spazieren sie weiter, im Juli verlassen sie das Vaterhaus und treiben sich auf dem Felde umher, wo sie sich mit dem Fange junger Häschen, Mäuse und Insecten beschäftigen. Nach der Ernte ziehen sie sich in das Dickicht, in Heiden oder Röhricht, und im Spätherbste vereinzeln sie sich; jeder bildet sich sein Revier und gräbt sich seinen eigenen Bau. Ihr Betragen ist das der jungen Hunde; sie wachsen 15 Monate lang, und erreichen ein Alter von etwa 14 Jahren. Begattung mit Hunden geschieht äußerst selten, doch sollen auch fruchtbare Bastarde vorgekommen seyn.

Krankheiten fehlen den Füchsen nicht. Die Tollheit ist die fürchterlichste von allen und bei den Hunden näher zu beschreiben. Die Raude erscheint oft in Folge ihres unterirdischen Lebens, und befällt mehr die Weibchen, so wie erstere Krankheit mehr die Männchen. Nächst Flöhen, welche sie nach einer alten Jägerfabel dadurch von sich trieben, daß sie rückwärts in's Wasser gingen und dieselben endlich von der Schnauze in ein Moosbündel laufen ließen, das sie dann dem Wasser übergäben, sind innere Feinde mehrere Arten von Eingeweidewürmern; der ernsteste Feind aber ist der Mensch.

Die Jagd auf den Fuchs ist mannigfaltig. Das Ausgraben, so wie in der Nähe eines Wassers das Ausgießen, geschieht besonders wenn er Junge hat; außer dieser Zeit läßt man ihn durch gute, krummbeinige Dachshunde austreiben und schießt ihn vor dem Baue oder fängt ihn in mit größter Ruhe aufgestellten Netzen. Will er nicht herauskommen, so muß ein Einschlag gemacht werden, worauf man ihn lebendig mit der Zange packt. Das Einschlagen verbietet sich indessen von selbst in felsigem Boden oder tief unter Baumwurzeln. Um sich auf ihn anstellen zu können, verrammelt man die Eingänge zum Bau, wenn er ausgegangen, mehrere Jäger stellen sich schußrecht, sorgfältig verborgen, die Spürhunde treiben ihn nach dem Baue, wo ihn die Jäger erwarten. Fehlt der erste Schuß, so kehrt er nur nach einem großen Umwege zum Baue zurück; wird er auch zum zweitenmale verfehlt, so rettet er sich durch eine weitere Flucht. Nachgeschickte Windhunde ermüdet er durch Kreuz- und Querlaufen und durch Durchfegen des Dickichts. Sonst schießt man auch die Füchsin vor dem Baue, wenn sie den Jungen Nahrung zuträgt, wo man sich auf einem Baume versteckt. Man pflegt aber auf solchen Anstand auf Stelzen zu gehen, indem die Füchsin die frische Menschenfährte meidet, auch wohl ihre Jungen in der nächsten Nacht fortbringt. Im Winter werden die Füchse geludert, d. h. man wirft Aas vor eine Art verborgene Hütte, in der man sich bei hellem Mondschein aufhält. Auf dem Anstande lockt man sie durch eine Hasenquake (ein den Hasenton nachahmendes Instrumentchen), oder ahmt den Ton eines Hasens oder einer Maus mit dem Munde nach. Auf Treibjagden kommt er nicht selten zum Schuß. Die Hunde gehen sehr gern auf ihn, obwol er sie bisweilen durch seinen stinkenden Harn abwehrt. Wird er gehetzt, so geht er zum Baue. Im Winter sucht man den Bau nach der Spur auf; diese ähnelt der eines Spitzhundes von gleicher Größe, der Tritt des Fuchses ist aber mehr länglich, die Zehen mit den Klauen, besonders die mittleren, vorn hinausgezwängt, der Ballen weit kleiner. Im Schleichen schränckt (s. oben) der Fuchs, die Schritte stehen schräg vor einander, im Trabe schnürt

Digitized by Google

er, in der Flucht stehen die Vorderläufe einander gerade über, von den Hinterläufen der eine etwas mehr vor, als der andere. In der Nähe seines Wechsels kirrt man ihn eine Zeitlang, um dann eine Falle anzubringen; von dieser aus hängt man ein Stückchen Lockspeise an einen Faden, und zieht es auf der Erde herum in verschiedener Richtung (Schleppe), läßt auch kleine Brocken davon hier und da fallen, um den Fuchs vertraulich zu machen. Grausam ist der Fang mit der Angel. Der Angelhacken wird in dem Bauche eines kleinen Vogels verborgen und da aufgehangen, wo der Fuchs gewohnt ist, Vögel aus der Schneuße zu hohlen. Man nimmt zum Köder auch wohl ein Stückchen Rehleber, Hasengescheide u. dergl. Er fährt springend darauf zu, und nach dem Anbiß schnappt die Angel in seinem Rachen aus einander, und hält ihn so schwebend bis er abstirbt. Schwanenhals und Tellereisen fangen ihn vom Anfang November bis Ende Januar. Doch richtet man schon früher die Fangplätze ein, wie dies Lenz vorzüglich deutlich und praktisch folgendermaßen beschreibt. Man macht einen Einschnitt in den Boden, wo das Eisen gerade hineinpaßt, ohne an den Seiten die Erde zu berühren. Die ausgegrabene Erde wird weit fortgeschafft. Zur Fangzeit wird die frische Wittrung angebracht. Man bereitet diese so, daß man ein halbes Pfund reines Gänsefett oder frische ungesalzene Butter in einem neuen Tiegel zerfließen läßt, drei Loth zerstoßene Kuhhornsaamen (semina foenu graeci) dazuthut, einige Minuten nachher einen Fingerhut voll von der grünen Unterschale des Mäußeholzes (stipites Dulcamarae), dann ein halbes Loth gestoßene Violenwurzel (rad. Iridis florentinae); nun nimmt man den Tiegel von den Kohlen, und mischt dazu ein halbes Loth Anis, dann zwei Skrupel Kampfer, rührt alles tüchtig um, und seihet es endlich durch ein ganz reines Läppchen in eine neue Büchse, bindet diese mit einer Blase zu und verwahrt sie an einem kühlen Orte. Als Lockspeise (Vorwurf) nehme man ein Stück nur mit etwas foenum graecum eingepöckeltes Katzenfleisch, man schneidet es in zollange Bissen und bratet es in einem ganz reinen Tiegel mit reinem Gänsefett oder frischer Butter. Zur Schleppe verfährt man wie oben gesagt. Sobald alle jene Vorbereitungen getroffen sind, nimmt man eine Mischung von Heusaamen und Roggenspreu, und reibt sie, nachdem man die Hand leicht verwittert hat, tüchtig durch. Mit dieser Füllung, dem Abzugsbissen, den Brocken, der Witterung und der Schleppe versehen, geht man gegen Abend nach dem Platze, und nimmt unterwegs einen frischen, buschigen Zweig mit sich. Vor Annäherung an den Platz müssen noch die Stiefeln, vorzüglich die Sohlen, verwittert werden, um sich nicht zu verrathen. Man verwittert auch ebenso nochmals die Hände, und füttert nun den Einschnitt in der Erde ganz aus, legt das beste Stück vom Vorwurfe (den Abzugsbissen) darauf, wirft die Bröckchen rings umher, reinigt den Ort durch Kehren mit dem Zweige, legt die Schleppe an und zieht sie am Boden hin von mehreren Seiten. Man besucht von hieran jeden Morgen früh mit verwitterten Stiefeln den Platz, um zu untersuchen, ob der Fuchs davon abgenommen hat. Ist dies nicht geschehen, so überdeckt man Abzugsbissen und Brocken mit Zweigen, um sie vor Raben u. a. Thieren zu sichern, und nimmt jene gegen Abend wieder weg. Wenn aber der Fuchs mehrere Nächte abgenommen hat, so wird das Eisen in reinem heißen Wasser abgewaschen und mit einem reinen Läppchen, welches mit etwas Wittrung bestrichen ist, ganz fein abgerieben, dann fangbar aufgestellt, und zum Fangplatze getragen, nachdem man sich mit frischer Füllung und frischem Vorwurfe versehen hat. Dort leert man die alte Füllung aus, stellt das Eisen wieder fest in den Einschnitt, und überdeckt es mit

Digitized by Google

Erde, so daß es der Erde gleich ist. Man bringt den Abzugsbissen an, wirft die Bröckchen, reinigt den ganzen Platz vollkommen und legt die Schleppe an. Bei Schnee pflegt man noch den Platz durch ein verwittertes Sieb mit Schnee zu übersieben. Vorgefundenen Koth (Losung) vom Fuchs läßt man ungestört an seinem Platze liegen. Zeigt sich nun am andern Morgen, daß der Fuchs dagewesen, sich aber doch nicht gefangen hat, so wirft man Abends wieder Bröckchen aus, deren jedes mit einem Tropfen Bilsenkrautöl (oleum hyoscyami) betropft worden. Dies wirkt benebelnd und veranlaßt ihn in die Falle zu gehen. Zu demselben Zwecke läßt man auch Fischkörner oder Kokkelskörner mit der Lockspeise braten. Tellereisen legt man auch in seichte Bäche, bedeckt sie mit Wassermoos (Fontinalis antipyretica), und hängt an einem übergebogenen Zweige den Köder auf. Fest anketten darf man die Fuchseisen nicht, sonst geschieht es, wie oben bemerkt, daß der Gefangene sich das Bein abbeißt und entflieht. Lebt der gefangene Fuchs noch, so wird er durch Hiebe über die Nase getödtet. — Die Salzmannische Fuchsjagd, welche Lenz bekannt macht und sich allgemein anwenden läßt, ist folgende. Man errichtet einen künstlichen Fuchsbau, welcher nur aus einer einzigen Röhre besteht, die in einem Bogen hufeisenförmig, doch so angelegt wird, daß die beiden Enden der Röhre vorn nur einen gemeinschaftlichen Eingang haben; der hinterste Theil dieser Röhre kann, als Kessel, ein wenig erweitert werden, muß aber jedenfalls etwas höher liegen, als der Ausgang, damit sich kein Wasser ansammele. Bei der Anlage wird die Röhre etwa 2¼ Fuß tief und eben so breit ausgegraben, und wenn man Steinplatten zur Hand hat, sowol zu beiden Seiten damit ausgesetzt, als auch damit bedeckt. Die Seitenplatten läßt man gewöhnlich noch etwa 6 Zoll tiefer in den Erdboden ein, damit die Füchse nicht so leicht neben ausgraben, was dennoch zuweilen geschieht. Die obere Steindecke wird etwa eine Hand tiefer als die äußere Erdoberfläche gebracht, und durch Erdbedeckung derselben gleich gemacht. Hat man keine Steinplatten, so legt man die Seitenwände der Röhre gar nicht aus, bildet aber oben eine Decke von Aesten, die etwa handbreit von einander entfernt querüberliegen und mit Reisig und Erde überworfen werden. Auch der Dachs liebt solche künstliche Baue, und benutzt sie gern. Sobald man nun sicher ist, daß der Fuchs oder der Dachs ausgegangen, so verstopft man seinen eigenen Bau, wodurch er veranlaßt wird, sich in den künstlichen Bau zu begeben, woselbst er leichter zu erlegen ist, und man den Vortheil hat, den natürlichen Bau nicht zerstören zu müssen.

In den öden, kalten Ländern ist der Fuchs leichter zu fangen als in den mehr bewohnten und gemäßigten. Die Kamtschadalen fangen ihn in Garnen, in deren Mitte an einem Pfahle sie einen lebendigen Vogel anbinden. Sie verstecken sich in einer Grube, und ziehen das Garn zu, wenn der Fuchs den Vogel annimmt. In Grönland baut man von Steinen eine Art Kasten oder Ofen, hängt darin ein Stück Fleisch an einen Stock auf, welcher, wenn er berührt wird, einen breiten Stein am Eingange niederfallen läßt, der den Fuchs erschlägt. Die Grönländer fertigen auch Schlingen von Fischbein, und legen diese über ein Loch im Schnee, worin sie Heringe als Köder auswerfen. Desselben Köders bedienen sie sich auch in Gruben, die sie in Schnee ausgraben, um den Fuchs hineinzulocken.

Der Schaden, den der Fuchs anrichtet, ergiebt sich aus seiner Nahrung. Sowohl für das kleine Wild als für das Hausgeflügel ist er ein böser Gast. Man soll ihn durch Stockfischgeruch von den Hühnerställen abhalten können. Die Nachstellungen

Digitized by Google

nach dem Fuchse betreibt indessen ein verständiger Jäger stets nur um die Art zu vermindern, niemals um sie auszurotten, wodurch auf anderer Seite neuer Nachtheil entstehen würde. Durch die Raude, so wie durch die Wuth, gehen fast jährlich viele zu Grunde; bei einem geringeren Grade von Wuth laufen sie oft dumm in die Dörfer und beißen sich mit Hunden herum, oder lassen sich leicht todtschlagen.

Der Nutzen des Fuchses ist nicht unbedeutend. Die Vertilgung der Fledermäuse wird durch wenige Thiere so nachdrücklich geübt, als durch den Fuchs. Die Jagd auf denselben wird wegen seiner Schlauheit fast überall als Vergnügen betrachtet, welches in England sich zur Leidenschaft steigert. Die grausamen Spielereien dabei, wie das Fuchsprellen, haben sich mit der höheren und humaneren Bildung des Forstpersonals in den gesitteten Staaten verloren. Das Fleisch genießen die Völker des hohen Nordens, besonders Grönländer, Lappländer, Tunguſen und Ostjaken. Es gehört unter die Jägerspäße, aus demselben Fuchswürste zu bereiten, und diejenigen auszulachen, welche davon gegessen haben. Der Aberglaube hielt mehrere Theile des Fuchses, vorzüglich Lunge, Leber und Fett, für arzneilich oder magisch wirksam. Zähmen kann man den Fuchs nicht vollkommen, da er immer etwas von seiner Wildheit behält und gefährlich verwundet, weshalb man ihm meistens die Zähne abfeilt. Er sucht auch auf alle mögliche Weise sich der Gefangenschaft zu entziehen, wobei er sich bewundernswürdig leicht aus dem Halsbande zu ziehen und die Kette abzustreifen weiß. Ich sahe dies von einem jungen Fuchse, nach mehrmaligen Einfangen, wiederholen; seine Freiheit benutzte er zu Besuchen in den benachbarten Hühnerställen, und verbarg sich endlich in einem unterirdischen Gewölbe, worauf er durch Eingraben dem weiteren Einfange entging. Von einem andern erzählt man, er habe sich zur Nacht befreit, und vor Tages Anbruch jedesmal selbst wieder gestellt und das Halsband wieder übergezogen. Den größten Nutzen bereitet der Fuchs durch seinen Balg. Vom Anfang Mai bis September benutzt nur der Hutmacher die Haare. Der Balg aber wird vom Kürschner in den übrigen Monaten geachtet. Die meisten und besten Fuchspelze erhalten wir aus Rußland. Man jagt daselbst die Füchse am zweckmäßigsten im November und December, wo der Pelz vollständig und eben von der rechten Dichtigkeit ist; im weiter vorgeschrittenen Winter wird er gar zu dicht und verfilzt. Im ersten Falle nennen ihn die Kürschner in Rußland Pyschny, im letztern Plotnye. Die Jungen erhalten im Februar des nächsten Jahres ihren vollständigen Balg. Bei den russischen Fuchspelzen findet sich das Unterhaar nächst der Haut blaß, bei den sibirischen aber dunkelbraun, um Anadyr und in Kamtschatka ist es fast fuchsroth. Die sibirischen Fuchspelze haben noch das eigene, daß sie, wenn man sie im Finstern klopft, Funken sprühen. Die Kürschner pflegen die Fuchsbälge zu zerschneiden, wobei sie sie in acht Theile theilen, welche in eben so viele verschiedenartige Pelze wieder zusammen genäht werden, und in sehr verschiedenem Preise stehen. Der erste und am meisten geschätzte Theil ist der Nacken, ein daraus zusammen genäheter Pelz: Savoitschatyi mjech, steht im höchsten Preise; dann folgt das Mittelrückenstück; der Pelz aus solchem: Chreptovyi mjech, steht im zweiten Preise. Drittens die Hüften, die Theile neben dem Schwanze, welche wenig geschätzt werden; viertens der Bauch: Tscherevyi mjech, steht im dritten Preise; fünftens die Kehle: Duschki, der leichteste Theil, mit wenig Pelz, deshalb von den Türken und Pohlen am meisten gesucht; sechstens werden noch die Vorder- und Hinterbeine zusammengenäht, solcher Pelz heißt: Laptschatoi mjech; siebentens das Kopfstück, das am allermindesten ge-

Digitized by Google

schätzte; achtens werden die Schwänze auf Riemen aufgenäht, und bilden Reisedecken. Auch die Ohren pflegt man zusammenzunähen, und Pelze für die gemeinsten Leute daraus zu fertigen. So werden aus 120 Fuchsfellen die zerschnittenen Stücke vernäht; die drei ersten Pelze machen die Felle bezahlt, die übrigen bilden den Ueberschuß. Die schönsten schwarzen Bälge werden am theuersten, oft mit hohem Preise, bezahlt, ausgezeichnet schöne Bälge überhaupt oft willkürlich von Liebhabern gekauft. Zu den Zeiten von Pallas und Gmelin kostete ein schwarzer Fuchspelz 50 Rubel, sie sind aber bedeutend gestiegen. Im Jahre 1775 erhielt die Pelzhandelgesellschaft durch ihr Schiff von den Aleutischen Inseln 1589 schwarze Fuchspelze, 1799 führte Petersburg 131 dergleichen aus.

Unsere Abbildungen stellen (54 — 57) ein Pärchen dar, welches mit den zwei Monate alten Jungen zu Felde geht; ferner 58 — 59 ein Pärchen, welches aus dem Baue geht, der Fuchs geht voraus und wittert nach dem Winde, die Füchsin folgt ihm scheu nach; 60 ist ein französischer Birkfuchs im Sommerpelze.

61. Der Brandfuchs, Feldfuchs. Canis alopex Linn.

Franz.: le Renard charbonnier. — Uebrige Namen wie bei vorigem.

Kennzeichen der Art oder Abart: wie voriger, aber die Schwanzspitze schwarz.

Der Brandfuchs findet sich ziemlich durch dieselben Länder verbreitet, wie der Birkfuchs, vorzüglich indessen im Elsaß und in Burgund. Außer der ganz schwarzen Schwanzspitze hat er auch meistens mehr Schwarz an den Beinen und auf der Unterseite des Rumpfes. Alte Jäger behaupten, daß, nach ihren Erfahrungen, niemals Brandfüchse durch Birkfüchse, oder umgekehrt, erzeugt würden, oder daß dieselben sich gegenseitig paarten, so daß dieselben, wenn auch wegen Geringfügigkeit der Unterscheidungskennzeichen nicht als eigentliche Arten, doch als in der Natur begründete Abarten wohl unterschieden werden müssen.

62. 63. Der Steppenfuchs, Pudelfuchs. Canis melanotus Pallas.

Franz.: le Renard-barbet. — Russisch: Stepnaja Lisiza (Steppenfuchs) oder Karaganka. — Kirgis. Tatar.: Karagan. — Tatar. am Jenisei: Karakulak (Schwarzohr).

Kennzeichen der Art: gelbgrau, Ohren schwarz, an deren Innenrande ein weißer Fleck, am Außenrande ein rother.

Größe eines kleinen Fuchses, Kopf mit spitzer Schnauze, nackter Hundsnase, Scheitel gelblich, Augen im Umriß röthlich, die Wimpern schwarz. Schnurren schwarz und die Schnauze oberhalb der Schnurren mit dreieckigem schwarzen Wischfleck, mit grauen Härchen melirt. Die Haare vor den Ohren häufig, lang, nach vorn weiß; die Ohren schwarz, an der Basis am Vorderrande mit weißem Flecke, außen so wie an der Basis fuchsroth. Der Rumpf hat ein weit strafferes, pudelartigeres Haar, als der Fuchs, doch ist es immer noch ziemlich weich, von Farbe fast mehr wie das des Wolfes; obenhin gelblichgraue, dazwischen längere, schwarze Haare, in der Tiefe ist das Haar aschgraulich, über den Schultern ein schwarzbraunes Feld, und von da eine röthliche Binde bis zum Schwanz vorlaufend. Ein schwarzbraunes Längsfeld zieht sich ferner von der Kinnlade über den Hals nach unten über die Brust bis zum Nabel, und ist mit weißlichen Haaren melirt, der Bauch ist graulich weiß. Die Weibchen haben daran noch

Digitized by Google

eine doppelte, fast nackte Stelle, welche längs verläuft und in einer Doppelreihe 8 Saugwarzen enthält. Der Schwanz ist sehr buschig und hat eine schwarze Spitze.

Die Steppenfüchse werden im Süden der Steppe gefangen; Pallas traf das Thier, welches auch in der Songarei und am obern Jenisei vorkommt und sich auch im Norden findet, nicht selbst an, erklärt es aber sehr bestimmt für eine eigne Art. Die Kirgisen bringen die Felle zu höchst billigen Preisen nach Orenburg und auf andere benachbarte Märkte.

Die Abbildung ist nach dem Thiere gemacht, welches ich in der Natur vor mir habe.

64—67. Der Rothfuchs. Canis fulvus Desmarest.

Franz.: le Renard rouge d'Amérique, Renard de Virginie Pal. Beauv. — Engl.: the red Fox Sabine, Frankl.

Kennzeichen der Art: fuchsroth und rothgelb, Hals und Unterbauch weiß, Brust aschgrau, Vorderläufe vorn und die Hinterläufe schwarz, Zehen rothgelb, Schwanz mit weißer Spitze.

Nachdem man nach früherer Weise die Natur zu betrachten den amerikanischen Rothfuchs nur als eine klimatische Abänderung des gemeinen Fuchses betrachtet hatte, so stimmen die Naturforscher gegenwärtig, nach genauerer Betrachtung des Thieres und seiner Lebensweise, darin überein, es für eine eigene Art zu halten. Er ist 20 par. Zoll lang, der Schwanz hält etwa 15 par. Zoll; die Höhe des Thieres ist auch 15 Zoll. Am Winterpelze sind alle Obertheile des Körpers schön und rein fuchsroth, von weit lebhafterer Färbung, als bei dem europäischen. Der Kopf ist blasser. Der Schwanz hat auf der Röthe schwarze Spitzen. Der Rand der Oberkinnlade, die ganze untere, die Kehle, der Hals, die Brust, die Außenseite der Schultern und Hüften, der Bauch und die Schwanzspitze sind weiß. Unter dem Halse und auf der Brust finden sich schwarze Haare unter den weißen, und das weiße Feld am Bauche ist sehr schmal. Die Vorderseite der Ohren ist gelb und die Außenseite schwarz, mit Ausnahme der Basis, welche die Farbe des Kopfes hat. Die Vorderbeine sind vorn schwarz, hinten gelblich; die Hinterbeine gegen die Zehen hin vorn schwarz, hinten gelblich mit einem schwarzen Fleck auf der Ferse. Der ganze Pelz ist sehr dicht, die Oberhaare seidenartig und das Unterhaar wollig, außer an den Gliedmaßen, wo sie sehr kurz und gleichartig sind. Die Schwanzhaare stehen perpendikulär um ihre Achse, so daß man zugleich ihr Roth und ihre schwarze Spitze sieht.

Franklin, in seiner Reise nach den Küsten des Polarmeeres, beschrieb den Rothfuchs schon sehr gut nach den Fellen, welche in den Magazinen der Compagnie der Hudsonsbai aufgehäuft waren. Auch Palisot Beauvois unterschied ihn gut. Er findet sich in allen gemäßigten Gegenden der vereinigten Staaten. Die zoologische Societät in London besitzt seit einigen Jahren dergleichen Füchse lebendig, und fand die Unterscheidung vom europäischen sehr bestätigt. Richardson in seiner Nordamerikanischen Fauna hebt vorzüglich noch einige Kennzeichen heraus. Die Fangzähne sind runder, die Nase dicker und kürzer, mehr gestutzt. Die Augen stehen näher beisammen. Die Ohren sind kürzer, das Haar an den Schenkeln ist länger und der Unterfuß ist unterseits wolliger, das Haar dehnt sich bis über die Klauen aus, diese sind kürzer als am europäischen Fuchs. Der Rothfuchs unterscheidet sich überhaupt vom europäischen,

Digitized by Google

so wie der graue amerikanische Wolf vom Pyrenäen-Wolfe. Die Schwanzspitze ist zwar nicht immer weiß, aber doch immer blasser als der übrige Theil, und niemals schwarz, es scheint also hier keine dem Brandfuchs ähnliche Race vorzukommen. — Man führt jährlich etwa 8000 Felle vom Rothfuchs in England ein. Sie sind oft in ihrem Vaterlande ziemlich häufig, bauen so wie unsere Füchse in die Erde, und verbringen den Sommer im Baue, im Winter lieben sie den Aufenthalt unter einem umgestürzten Baume um der Gefahr des Zufrierens ihrer Löcher zu entgehen. Sie jagen des Nachts, besonders auf Nagethiere, doch fressen sie auch Fische und Thiere aller Art, denen man sie auch am Tage nachjagen sieht. Man pflegt die Netze, die man ihnen stellt, mit Asa fötida, Castoreum u. dgl. zu räuchern, welche Gerüche sie sehr lieben. In seinen Manieren scheint das Thier noch weit mißtrauischer zu seyn, als der europäische Fuchs, doch weniger listig. Die Pariser Menagerie erhielt durch M. Lesueur auch ein Weibchen, welches mit dem schon im Jahre 1824 erhaltenen Männchen zusammengelassen wurde. Gegen Ende Februar 1825 kam es zur Paarung, und gegen Ende April wurden vier Junge blind geboren. Sie waren durchaus mit einem grauen Wollhaar bedeckt, auch der Kopf grau, wie der übrige Körper. Nach 30 Tagen zeigten sich rothgelbe oder gelbliche Haare, und dadurch ging die äußere Färbung immer mehr in die über, welche das Thier in erwachsenem Zustande hat. Jene graue Farbe war aber ganz dieselbe, welche das Unterhaar auch bei dem erwachsenen Thiere behält. Die Alten zeigten fortdauernd eine große Sorgfalt für ihre Jungen; sie versuchten dieselben oft den Augen der Beschauer zu entziehen, und faßten sie daher oft mit dem Maule und schleppten sie gleichsam instinktartig herum. Die Mutter säugte sie regelmäßig und hielt sie sehr rein, dennoch starben zwei davon gegen Ende des ersten Monats. Die übriggebliebenen fingen bald an Fleisch zu fressen, und befanden sich recht behaglich. Unsere Abbildung stellt dieselben in einem Alter von dreißig Tagen dar, in der Nähe sieht man die Alten, oben das Weibchen und unten das Männchen.

68—70. Der amerikanische Kreuzfuchs. Canis decussatus Geoffr.

Franz.: le Renard croisé. — Engl.: the Cross Fox.

Kennzeichen der Art (oder Abart): oben schwarz und weiß melirt, ein Kreuz über den Rücken und die Schultern so wie die Schnauze, der Unterbauch und die Beine sind schwarz, die Schwanzspitze weiß.

Es ist bereits aus der Naturgeschichte des Birkfuchses bekannt, wie sehr die Farbe des Pelzes bei diesem Thiere ändert, und S. 88 finden wir, daß auch dort die Rede von Kreuzfüchsen und von schwarzen und halbschwarzen Füchsen gewesen ist. Mit dem zuletzt betrachteten Rothfuchse steht indessen ein Thier in sehr naher Verbindung, welches in seiner schwärzlichen Färbung und oben angegebener Abzeichnung standhafter erscheint, und deshalb auch wohl als eigne Art betrachtet worden ist. Andere Beobachter und Schriftsteller halten indessen den amerikanischen Kreuzfuchs, vielleicht mit Recht, für eine Abart des Rothfuchses, namentlich ist dies die Ansicht des Dr. Richardson, welcher beide in ihrem Vaterlande beobachtete. Er berichtet allerdings auch, daß die Uebergänge in der Färbung der Felle zwischen beiden Thieren sich so unmerklich abstufen, daß der Jäger oft schwer sagen könne, ob das Thier zu einer oder der andern Art gehöre. Auch in der Lebensweise sind sich beide Thiere gleich. G. Cuvier und

Digitized by Google

Griffith (animal kingd. II. p. 370.) betrachten diese Art als Varietät vom Silberfuchs (vgl. unser No. 80.); es spricht dafür in sofern Wahrscheinlichkeit, als dieser selbst für eine Abart des Rothfuchses gehalten wird.

Der Pelz des amerikanischen Kreuzfuchses wird für feiner gehalten als der des Rothfuchses, auch ist er schon bei seiner Seltenheit und Schönheit theurer. Unsere Abbildung zeigt ein paar lebendige Thiere in vollem Pelze und Fig. 70 eins im unvollständigen, dünnen Sommerpelze.

71. Der Gris-Fuchs, dreifarbige Fuchs. Canis cinereo-argenteus Schreb.

Franz.: le Renard gris ou tricolor. — Engl.: the tri-coloured Fox.

Kennzeichen der Art: oben grauschwarz melirt, Kopf grauröthlich, Ohren auswendig und Halsseiten und Bauch lebhaft gelbroth, Kehle, Wangen und Brust weiß, Kinn schwarz, Schwanz schwarz und gelbroth gewässert.

Der buntgezeichnete Grisfuchs ist kleiner als die bisher betrachteten Füchse. Das schöne Exemplar, welches vor mir steht, hält 1 Fuß 8 Zoll Länge, der Schwanz 1 Fuß, dessen Haare stehen 3 Zoll über die Spitze der Ruthe hinaus. Griffith kennt das Thier nur aus Schreber's Abbildung und Beschreibung; an die Pariser Menagerie sendete M. Milbert ein Exemplar lebendig, aber die Art wurde noch immer für Azara's Aguarachay gehalten, bis der Prinz Maximilian diesen als eigne Art (unsere No. 97—98.) als Azara's Fuchs bestimmte.

Im äußern Ansehen weicht dieser Fuchs von den gewöhnlichen Formen der Rothfüchse ab, er ist gedrungener und kurzbeiniger gebaut, die Schnauze kürzer, die Stirne höher. Die Färbung ist oben unter den Kennzeichen im Allgemeinen angegeben worden. Das Wollhaar ist zunächst dem Felle aschgrau, nach oben weiß, das Oberhaar auf dem Rücken über zwei Zoll lang, von der Basis an weiß, dann schwarz, wieder weiß, und die lange, feine Spitze ist wieder schwarz. Der Schwanz ist sehr dickbuschig, über seinen Rücken hin glänzend schwarz, unterseits röthlich, an den Seiten weiß und schwarz melirt, die Haare des Schwanzrückens sind über vierthalb Zoll lang, von der Basis an einen Zoll weit weiß, übrigens schwarz, die Seitenhaare des Schwanzes sind den oben beschriebenen Rückenhaaren ähnlich, mit Weiß und Schwarz abwechselnd gefärbt. Die Beine sind sehr dicht kurz behaart, die Vorderseite schwarz, weiß und braun melirt, zwischen den Zehen und um die Sohle ragen dichtstehende, bräunlichgraue, vorn auch weißliche Haare hervor; vom Knie bis zum Fersengelenke innerseits weiß, nach hinten fuchsroth, Hinterbeine innerseits fuchsroth mit weißem Längsstreife. Die Nägel sind 6 Linien lang, wenig gekrümmt, hornbraun. Die Zähne sind ungemein schmal und fein gebaut, die Vorderzähne stehen weit von einander ab, oben haben die beiden äußersten am Außenrande ihr Spitzhöckerchen, neben welchem die Schneide des äußersten paraboliſch vorgezogen, bei dem zweiten aber quer abgestutzt ist, die beiden mittleren sind quer abgeschärft und ohne Spitzhöckerchen; unten haben die beiden äußern gleichfalls ihr Spitzhöckerchen, sind aber beide sehr kurz abgeschärft, ohne hervorgezogen zu seyn, die mittleren scharf abgestutzt. Von den Eckzähnen sind die obern dünn und wenig gebogen, mit sehr abgestumpften, breiten Hinterhöcker, die untern dicker, mit spitzigem Hinterhöcker und einer stumpfwinklichen Ecke am Innenrande. Von den Reißzähnen ist oben der einspitzige sehr weit vom Eckzähne entfernt, der zweite wieder

Digitized by Google

entfernt, neben der Hauptſpitze nach vorn mit einem Eckchen und nach innen mit einer kurzen Spitze; unten iſt der erſte Reißzahn ebenfalls entfernt und einſpitzig, mit kaum angedeuteten Vorderſpitzchen, der zweite mit einem kleinen Vorder- und zwei größern Hinterſpitzchen. Der nächſte Backenzahn in beiden Kinnladen liegt am vorigen an und iſt der obere ziemlich gleichförmig vierſpitzig, der untere hat eine ſehr lange, dann eine vordere kürzere und drei hintere niedere Spitzen, von denen eine mehr nach innen gerichtet iſt.

Dieſe Art gehört Nordamerika an, ſcheint aber ſeltner vorzukommen als die meiſten übrigen Arten. Nach G. Cuvier (ossem. foss.) und nach C. Lud. Bonaparte ſoll der virginiſche Fuchs: Canis virginianus Schreb. mit der gegenwärtigen Art einerlei ſeyn, wenigſtens giebt es in den vereinigten Staaten außer dem Rothfuchſe (No. 64—67.) nur noch dieſe gegenwärtige Art.

97—98. Azara's Fuchs. Canis Azarae Maximil. Pr. N. W.

Franz.: le Renard d'Azara. — Engl.: the Fox of Azara. — Im öſtl. Braſilien: Cachorro do mato (Waldhund); — im Sertong von Bahia: Raposa, Agouarachay Azara.

Kennzeichen der Art: Körper fahl graugelblich, Rücken und obere Theile ſchwärzlich; ein ſchwärzlicher Streif an der Vorderſeite des Vorderbeins; Spitze der Lippen weiß; Unterkörper ſchwärzlich-graubraun, untere Theile weißlich; Schwanz am Ende ſchwarz.

Dieſer Fuchs gehört ebenfalls unter die kleineren Arten und hat 21 Zoll Länge, der Schwanz hält noch 13 Zoll und 3 Linien. Das Ohr iſt am Innenrande 1 Zoll 9 Linien, die Länge von der Naſenſpitze bis zum vordern Ohrrande 4 Zoll 6 Linien, der längſte Vordernagel iſt 3 Linien lang. Der Prinz Maximilian N. W. beſchreibt dieſe Art ſo: An den Vorderfüßen befinden ſich fünf, an den hintern vier ſtark behaarte Zehen; die Nägel der Vorderzehen ſind weißlich und in den Haaren etwas verborgen, wovon der längſte 3 Linien mißt, die der Hinterzehen ſind länger, ſie meſſen beinahe 5 Linien, ſind bräunlich von Farbe und mehr entblößt. Körperhaar ziemlich dicht und etwas wollig; betrachtet man die einzelnen Haare, ſo ſind ſie an der Spitze ſchwarzbraun; darunter befindet ſich eine weiße Binde, alsdann folgt wieder Schwarzbraun und der übrige Wurzeltheil iſt graugelblich. — Dieſe bunte Zeichnung der Haare giebt im Allgemeinen dem Thiere eine fahl graugelbliche, weißliche und ſchwärzliche Miſchung; der Rücken und die obern Theile fallen mehr in's Schwärzliche; an den Schenkeln und Vorderblättern herrſcht die graue Farbe etwas vor, an den Seiten des Halſes und den äußern Beinen die fahlgelbliche oder blaß röthlichgelbe; ein mehr ſchwärzlich gemiſchter Streif läuft auf der Vorderſeite des Vorderbeines bis zu dem Fußwurzelgelenke hinab; innere Seite der Vorderbeine blaß gelblich; innere Seite der Hinterſchenkel etwas bläſſer; Stirn und Oberkopf gelblichbraun und weißlich gemiſcht; Naſe von den Augen vorwärts gelblich-graubraun; Gegend unter den Augen mit ſchwärzlichen Haaren gemiſcht; Spitze beider Lippen weiß; Unterkiefer ſchwärzlich-graubraun; Kehle Unterhals, Bruſt und ganze Vorderſeite der Hinterbeine weiß, welches an der letzteren Stelle gegen die äußere Schenkelfarbe nett abſticht; äußeres Ohr gelblich-graubraun; der Schwanz iſt länger behaart als der Körper, erſcheint oben dünner als an unſerem europäiſchen Fuchſe im Sommer, er iſt graugelblich mit dunkleren Haarſpitzen, das Ende

Digitized by Google

oder die Spitze ist aber gänzlich schwarzbraun mit einigen langen, weißen Haaren gemischt. Im allgemeinen ist er dem Grisfuchs ähnlich gefärbt, nur alle Farben blasser.

In Paraguay und über ganz Brasilien verbreitet, lebt er fast wie der europäische Fuchs, in Wäldern und offenen Gegenden, trabt überall umher, verbirgt sich bei Tage in Erdhöhlen, und entflieht schnell bei Anblick des Menschen, dessen Wohnungen er zur Nachtzeit beschleicht, um Federvieh zu rauben; auch soll er an den Flußufern in der Nähe des Meeres, zur Zeit der Ebbe, Krabben und ähnliche Wasserthiere, welche in den Mangue-Gebüschen (Rhizophora Mangle) hängen bleiben, auflesen, daher vielleicht der Chien Crabier bei Buffon. Er frißt auch Aas, wirft seine Jungen in Erdhöhlen, ist listig, hat scharfe Witterung und läßt sich zähmen. Der Balg wird nicht benutzt, so daß man ihn nur als Räuber des Federviehes tödtet.

Wir geben unter Fig. 97 die Abbildung des Prinzen Maximilian N. W. und 98 die ältere von Azara, die dennoch vielleicht dem Grisfuchse gehören dürfte, da sie von jener so ziemlich viel abweicht.

72—73. Der Kithfuchs. Canis microtus Reichb.

Franz.: le Renard Kith. — Engl.: the Kith-Fox.

Kennzeichen der Art: obenher greisgrau, an den Seiten in ockergelb übergehend, unten weiß, Ohren bedeutend kürzer als die an den Seiten schwarze Schnauze.

Ein kurzbeiniger, langgestreckter, kleinerer Fuchs von 1 Fuß 7 ½ Zoll Länge, dessen Schwanz 10 Zoll hält. An den Seiten des Halses und Bauches, so wie auf den Schultern und Hüften, geht das Greisgrau in Ockergelb über, auch die Beine und Unterseite des Schwanzes führen dieselbe Farbe; Lippen, Unterkinnlade, Unterhals, Unterseite des Bauches und Vorderseite der Hinderläufe sind weiß; die Schnautzenseite schwarzbraun mit weißen Härchen gemischt, die Schnurren schwarz, die kleinen Ohren außen graulich-gelblich. Die Unterhaare auf Rücken und Seiten sind sehr weich und dicht, fast so lang als das Oberhaar und dunkelgrau, das Oberhaar auf dem Rücken ein bis anderthalb Zoll lang und unten schwärzlich, dann weiß mit feiner, schwarzer Spitze. Der Schwanz ist dichtbuschig, die längeren Haare so wie die Rückenhaare gefärbt, nach dem Ende des Schwanzes hin die Haare über die Hälfte ihrer Länge schwarz, daher die ganze Schwanzspitze schwarz erscheint. Die Nägel sind 4 Linien lang, weißlich hornfarbig, an den Vorderbeinen fast gerade, an den hintern mehr gekrümmt.

Die Bälge dieser kleinen Füchse kamen vor etwa zwölf Jahren in Leipzig im Pelzhandel in Menge vor, mit der Nachricht, sie kämen aus Nordamerika von der Hundisbay. Das Gebiß konnte ich nicht erhalten. Unsere Art scheint zwischen beiden vorigen Arten und dem virginischen Fuchse: C. virginianus Schreb. eine Mittelstufe zu bilden.

74—77. Der europäische Eisfuchs, Blaufuchs. Canis lagopus Linn.

Franz.: le Renard blanc et bleu. — Engl.: the arctic Fox. — Skandinav.: Fjäll-Räfven. — Dänisch: Hvid, graa Ræv. — Norweg.: Melrak, Fjeld-Rakė. — Lappländ.: Njal. — Finländ.: Nauli. — Isländ.: Refr, Toa.

Kennzeichen der Art: einfarbig schneeweiß, oder aschgraulich oder bräunlichgraulich, fast schiefergrau, Ohren kurz abgerundet, Schwanz keulenförmig; in der Unterkinnlade jederseits sieben Backenzähne.

Digitized by Google

Der Eisfuchs ähnelt den vorigen Arten im Wuchs und in der Größe; er wird bis 9 Pfund schwer. Die ausgewachsenen Thiere aus der vor mir stehenden Reihe sind 1 Fuß 6 Zoll lang, ihr Schwanz hat 1 Fuß und 6 Linien. Der Kopf ist kürzer als am Birkfuchs, und erscheint verhältnißmäßig breiter, wie Fig. 17. sehr genau angiebt, die Schnautze ist aber kürzer und spitzer, die Nase schwarz und kahl, die Nasenlöcher rundlich, die Scheidewand derselben schmal. Die Beine sind verhältnißmäßig kurz und der Schwanz lang und stark behaart. Die Schnurren stehen am Oberkiefer in acht Reihen, die untersten hintersten bis 3 Zoll lang, hinter dem Maulwinkel noch 2 nach oben und 3 nach unten. Am Unterkiefer jederseits kürzere Borsten in 4 Reihen, nach der Kehle zu einige längere. Die Ränder der Augenlieder sind schwarz, steif gewimpert. Das Auge ist braungelb dunkler gestreift. Noch 7 lange steife Borsten befinden sich oberhalb des innern Augenwinkels. Die Ohren sind wie abgestutzt, ihre Haare dicht, weich und sehr kurz, innerseits bedecken längere, ziemlich steife Haare die Oeffnung. Der Schwanz ist bei jüngeren Exemplaren und bei leichtem Sommerpelz fast cylindrisch, im dicken Winterpelz wulstig keulenförmig. Die Behaarung der Beine ist sehr dicht, die Ballen sind kahl. Merkwürdig ist das Vorkommen einer doppelten Färbung, indem es nämlich schneeweiße und bräunlich- oder schiefergraue, sogenannte Blaufüchse giebt. Die am meisten verbreitete Ansicht hierüber ist die, daß der Schneefuchs letztere Farbe im Sommer, die weiße aber im Winter führe. Wir haben auch oft genug Gelegenheit gehabt, diesen Farbenwechsel bei Thieren dieser Art, welche lebendig in Menagerien herumgeführt wurden, zu sehen. Indessen ist wohl zu beachten, daß dieser Farbenwechsel nicht bei allen Individuen eintritt, sondern einzelne derselben auch im Winter bräunlichgrau, andre auch im Sommer schneeweiß erscheinen. Junge Thiere sind in den ersten sechs Wochen mit weichem, wolligen, nicht ganz zolllangem Haare dicht bedeckt, die Farbe desselben ist schmuzig graubraun, wenn das Thier grau oder braun bleibt, oder Gesicht und Seiten nebst Unterleib sind weißlich bei denen, welche späterhin ganz weiß werden. Nach sechs Wochen bis gegen dem Herbst hin schießen die längeren, steiferen Oberhaare hervor, diese sind anfangs sehr einzeln und gekrümmt, werden aber dann gerade und stehen einzeln über die andern heraus, indem sie über anderthalb Zoll lang werden. Im ersten Winter vertauscht sich das Wollhaar mit einem weicheren, längeren Unterhaare, welches bei weißen, grauen und braunen Thieren zu unterst grau gefärbt ist, dann sind die Spitzen desselben weiß, grau oder braun, die Länge zwei Zoll. Die Winterhaare ragen einen halben Zoll über das Unterhaar hervor. Im zweiten Jahre ballt sich im April und Mai das Winterhaar zusammen und stößt sich ab, da das neue sich vordrängt. Darunter bildet sich ein ganz kurzes Unterhaar, mit längerem steifem Winterhaar gemischt. Dies wird zum Winterhaar des zweiten Jahres, indem das Unterhaar sich verdichtet und verlängert. Die oben angegebenen Hauptfarben finden sich in allen möglichen Uebergängen. Bei den schneeweißen Exemplaren finden sich gewöhnlich einige schwarzgraue Haare in der Schwanzspitze, bei den grauen und braunen ist die Schwanzspitze blasser oder auch dunkler als die Grundfarbe des Schwanzes, oft weiß.

Der Schneefuchs hält sich in den Einöden des hohen Nordens von Europa: Norwegen, Schweden, Lappland und Island, von früh bis Nachmittag, in vorgefundenen oder selbst gegrabenen Löchern auf. Im Winter läuft er viel umher an bewohnten Orten nach Nahrung. Im Sommer liebt er die Eier der Vögel und diese selbst, so wie

Digitized by Google

die Angelikawurzel. Im Winter stellt er den Schneehühnern nach, und sucht die animalischen Auswürfe der See, auch Fische, Mollusken und Krebse. Dabei spürt er immer mit der Nase auf der Erde. Sobald sich das Treibeis anlegt, hascht er die Vögel, die es mitbringt. Alte Schneefüchse wagen sich auch an Schaafe, und werden, sobald sie diese Kost einmal genossen, der Heerde gefährlich. Die isländischen Hunde leben mit ihnen in Feindschaft, doch soll es wahrscheinliche Bastarden beider daselbst geben. Die Paarung fällt in die Monate März und April. Das Weibchen wirft nach 9 Wochen 3 bis 5, auch noch mehr Junge, und erzieht sie durch Fütterung mit Geflügel, welches in dieser Zeit am häufigsten ist. Als schädliches Thier bemüht man sich ihn zu vertilgen, doch hat er in jenen Einöden zu viele Zufluchtsorte, z. B. auf Island in den Schluchten des vulkanischen Bodens. Im Herbste baut man ein kleines Erdhaus entfernt von den Wohnungen, und kirrt die Füchse in der Umgebung mit Fleisch von gestorbenen Hausthieren. Der Jäger bemerkt leicht, ob sie es annahmen, und legt den Fraß immer näher an die Hütte, wo er dann in mondheller Nacht die Füchse schußrecht bekömmt. Man gräbt sie auch aus dem Baue, wenn sie Junge haben, oder fängt sie in Fallen, die Alten sind aber sehr listig. Die Stimme des Schneefuchses ist ein Kläffen, wenn er bös ist, zu andrer Zeit ein Geheul, welches man in den Menagerien oft mit dem Weinen eines Kindes vergleichen hörte.

Der Pelz wird geschätzt, wenn er schön aschgrau ist, wo man ihn **Blaufuchs** nennt, während die weißen und braunen sehr wenig Werth haben.

Unter den von uns abgebildeten sind die beiden mittlern junge Thiere.

78. 79. Der asiatische Eisfuchs, Isatis. Canis Isatis Gmel.

Franz.: le **Renard Isatis**. — Engl.: the **Isatis**. — Russisch: **Pessez** (Hündchen). — Tatar. **Ak-Tylkoe** (weißer Fuchs); — Jakut. **Kyrrsa**; am Jenisei Tatar. **Dshoebkoe**; Bergtatar. **Lüi**. — Samojed. **Nogä** und **Nohó**; am Jenisei: **Sellero**. — Wogul. am Ob: **Kylm** und **Kan**. — Ostjak. Surgut. **Kyöm**, auch **Mulòg**; am Narym: **Nju-loga**, d. h. weißer Fuchs. — Tunguf. und Tschuktsch. Nomad. **Rekokalgin**; bei den anßißigen Tsch. **Kawylguraech**. — Kamtschadal. **Schippóka** od. **Schipuk**. — Aleut. **Uktschi** od. **Ukutsching**.

Kennzeichen der Art: einfarbig schneeweiß, aschgraulich oder schwärzlich, Ohren eirund zugespitzt, Schwanz gestreckt, Spitze schwarz, in der Unterkinnlade jederseits sechs Backenzähne.

Er ist, so wie der vorige, kleiner und niedriger als der Birkfuchs, bis 7½ Pfund schwer; die Länge beträgt nach Pallas 1 Fuß 5 Zoll 6 Linien, die Schulterhöhe 1 Fuß 6 Linien, Kreuzhöhe 1 Fuß 7½ Linie. Der Kopf ist mehr dem des Hundes als des Fuchses ähnlich, die Schnauze nämlich stumpfer und dicker, der Schädel gewölbter, Nase und Lippen nackt, schwarz, der Einschnitt der Lippe setzt sich in die Furche der Scheidewand fort. Obere **Vorderzähne** in der Mitte etwas abgestutzt, folgende beiderseits mit einem undeutlichen Spitzhöcker, äußere entfernt, kegelförmig, alle an der Basis nach innen fortlaufend, untere mehr entfernt, die mittlern ausgeschweift, fast ausgekerbt, der äußere zweihöckrig, äußerer Höcker spitz; **Eckzähne** oben größer; **Backzähne** überall sechs, oben die drei ersten, unten einer dreihöckrig-kegelförmig, vordere abnehmend, der erste am kleinsten, dann folgt ein großer dreihöckrig getheilter, dann der letzte breit-höckrig, und am Schlunde noch ein sehr kleiner ausgeschweifter. Der Gaumen hat neun Falten, die Zunge ist weich. Die Schnurren sind mittelmäßig, ziemlich fünfreihig, weiß, eine Borste ist lärge: und schwarz, auch bei den weißen

Digitized by Google

Individuen; über dem Auge befindet sich eine Warze mit sechs Borsten, von denen ebenfalls eine zum Theil schwarzbraun ist. Auf den Wangen steht eine Borste und an der Kehle eine Warze mit vier Borsten; um die Kinnlade herum noch einige Borstchen in zwei Reihen zerstreut. Die Augen neigen etwas zusammen, die Augenliedränder sind nackt, nächst dem Rande steht eine Reihe schwarzer Haare, die Iris ist dunkelgelb, die Augenlieder sind schief gespalten, decken das Auge bis zu $^3/_5$, und sind schwarz gerandet. Die Ohren sind eirund, sehr weich, zugespitzt-abgerundet, zottiger und kürzer als am Fuchs, Zotten zusammengeneigt, inwendig nackt, braun, bogig gerunzelt. Die Spitze des Ohres trägt das Thier freiwillig nach einwärts umgebogen. Der Körper ist sehr zottig, der Pelz am ganzen Leibe schneeweiß, nur bei einigen auf dem Rücken mit einzelnen, längeren schwarzbraunen Haaren gemischt; das tiefe Flaumhaar nächst der Haut ist graulich, unterseits ganz weiß, die Haare sind länger, weicher und zarter, auch dichter, aber auch mehr verflachter und ungleicher als am Fuchs. Die Vorderpfoten haben fünf Zehen, der Daumen mit krummer Klaue, die Hinterpfoten sind vierzehig. Die Zehen sind alle mit dickem Haar bis an die Spitzen verbunden, weniger an den Hinterpfoten, damit sie desto leichter auf dem Schnee einherschreiten können. Die Sohlen sind sehr zottig, außer den Fingerballen, mit dichten, härtlichen, krausen, silberweißlichen Haaren besetzt, die Klauen hornfarbig. Der Schwanz ist halb so lang als das Thier, gerade, die Haare gröber, bis drei Zoll lang, überall wollig, noch dicker scheinend als der Fuchsschwanz, an der äußersten Spitze mit einigen schwarzen Haaren.

Eine häufige Abänderung: **Goluboi Pessez** bei den Russen genannt, ist dunkel- oder bleigrau, auch schwärzlichbraun, auch im Winter so bleibend; vorzüglich geachtet ist die, welche aus dem Bläulichen in's Schwarzbraune zieht, der eigentliche Blaufuchs, weniger die, aus dem Braunbläulichen in das Graue, am wenigsten die braungraulichen, welche in Rothbraun übergehen. Bei diesen allen hat der Kopf häufige weiße Haare, häufiger gegen die Schnautze hin, diese selbst ist bei manchen ganz schwarzbraun; bei einigen haben auch die Beine einige weiße Haare, wenn sie nicht in das Schwarzbraune ziehen. Aus den Beinen jener bläulichen und der weißen Füchse abwechselnd, näht man Pelze zusammen, welche sehr schön und dicht, auch theurer sind. Bei allen sind die Ohren, das Nackenfeld bis zu den Schultern und die Kehle dunkelschwarzbraun, letztere doch bei einigen in's Röthliche ziehend. Alle Fußsohlen sind weißzottig. Bei einigen ist ein weißer Fleck zwischen den Vorderbeinen. Der Pelz ist im Allgemeinen bei diesen Abänderungen weniger lang als bei dem gewöhnlichen, und zierlicher, deshalb auch um ein Dritttheil theurer, als der der weißen. Die seltenste Abänderung ist die braunschwarze (fusco-atra), deren Kopf aber so wie der Rücken mit graulichweißlichen Haaren gemischt ist, im Schwanze sind diese noch häufiger.

Der Aufenthalt ist die kalte, arktische Zone, er geht gegen Süden nicht über 60° N. B. hinab, nämlich bis zum östlichen Winkel von Sibirien, zum Penschiner-Meerbusen und nach Kamtschatka. Dahin bringt ihn das Strandeis, auch mag er wohl von da auf die Berings- und aleutischen Inseln und in das gegenüberliegende Amerika gekommen seyn und bei seinem starken Fortpflanzungstriebe sich daselbst vermehrt haben, denn die Weibchen gebären oft über ein Dutzend Junge. Diese Füchse sind auf diesen Inseln so zudringlich und heißhungrig, daß sie dem Schlafenden alles Eßbare, ja sogar Stiefeln und Lederwerk überhaupt, so wie andere Gegenstände, welche sie glauben benagen zu können, fortschleppen, und kaum durch Stockschläge zu entfernen sind. Sie

Digitized by Google

fressen übrigens alle Kost aus dem Thierreiche, auch Fische und das was die See auswirft, so lange ihnen frische Beute fehlt. In der arctischen Zone verfolgen sie besonders die Wandermäuse, und stellen selbst mit ihnen Wanderungen an. Sie wohnen in selbstgegrabenen Höhlen, und streifen zur Nachtzeit umher. Junge, welche Pallas zu Mangasee erhielt und pflegte, waren sehr beißig, besonders die Männchen; ein Weibchen, kleiner und schwächer, wurde sehr zahm und schmiegte sich hundeartig an Menschen. Die Stimme war ein schwaches Heulen, bis zum November ließen sie kein Gebell oder andre Stimme hören. Als das ältere Männchen, von den übrigen gesondert, an einem dunklen Orte eingesperrt wurde, erhob es gegen Abend ein eigenthümliches, krähendes Gebell, und wiederholte dies oft, wobei 4 bis 6 Töne schnell auf einander folgten, deren letztere schärfer klangen, wie Geheul. Doch wiederholt sich derselbe Ton nicht wie bei dem Hundegebell, sondern wird nur ein- oder ein Paarmal in längeren Zeiträumen gehört. Sie saßen wie die Hunde; im Kampfe hielt einer den andern mit den Füßen zur Erde nieder, und biß zu wiederholtenmalen scharf zu. Sie fraßen alle Arten von Fleisch, und vergruben, sobald sie satt waren, das übrige in die Erde. Das Graben geschieht mit den Vorderbeinen, und mit der Schnautze werfen sie die Erde heraus. Im December hatte sich endlich der Winterpelz vollendet. Im Sommer ist die Farbe ein verloschenes Schwarzbraun, und auch bei denen, welche im Winter schneeweiß werden. Sie werden dann auf den Hügeln des arctischen Flachlandes (Tundra) aus ihren Gängen ausgegraben. Die Samojeden und Ostjaken führen dazu Spaten, welche aus einem Rennthiergeweih gefertigt sind; man faßt dann die Thiere bei dem Schwanze, zieht sie so heraus, und schlägt sie heftig mit dem Kopfe gegen die Erde, um sie zu tödten. Die Gänge befinden sich immer an den höheren Ufern oder an Hügeln, wo der Boden trocken ist. Wenn man den Gang aufgefunden hat, legt man sich mit dem Ohre daran, hört man da noch nichts von der Bewegung des Thieres, so kratzt man den Schnee vor der Oeffnung zusammen, wodurch das Thier aufgeschreckt wird und anfängt zu mucksen. Auf diese Weise verrathen, wird es dann am Ausgange mit Schlingen gefangen. — Der weiße Winterfuchs ist ungemein häufig und gehört unter die wenig geachteten Pelzwerke. Von Mangasee allein kommen in manchen Jahren an 40,000 Felle derselben. Wenn indessen die Thiere nach anderen Gegenden gewandert waren, so kamen auch wohl kaum 3000 zusammen; so war es im Winter von 1771 zu 1772. Die Zahl dieser fruchtbaren Thiere vermindert sich indessen nicht, und auf den Aleuten, wo jährlich viele Tausende mit Knütteln erschlagen oder in Schlingen gefangen werden, bleiben sie dennoch sehr häufig. In diesen Gegenden kommt auch die Abänderung öfter vor, welche im Winter aus dem Schwarzbraunen in's Graublaue zieht, und anderwärts seltner uud theuer ist. Auf diesen Inseln nähren sie sich von Fischen und andern Seethieren und Uferauswürfen, auf dem Continente aber von Mäusen, Schneehühnern und Hasen. Ihr Unrath ist höchst übelriechend, oberhalb der Schwanzwurzel entwickeln sie aber ein leichtes Parfüm, fast so wie der Vielfraß. — Die Veränderung der Haarfarbe geschieht nach innerm Naturgesetz, nicht wegen der Kälte; Pallas sah ein Exemplar, welches in Petersburg an einem warmen Orte gehalten, dennoch seinen Pelz in die Winterfarbe umwandelte, wobei anfangs nur der Hinterrücken braun blieb, bis auch dieser sich umfärbte. Der Pelz ist wohl kaum bei einem Raubthiere dichter, länger und zum Abhalten der Kälte passender, auch wohl kaum so electrisch, daß er bei ein- oder zweimaligem Reiben mit der Hand knistert und

Digitized by Google

im Finstern Funken sprüht. Aber auch wohl bei keinem andern ist das eigentliche Fell so dünn und zart. Vor Olaus Magnus ist dies Thier kaum erwähnt worden, da er der erste nordische Zoolog war. Fr. Cuvier kennt noch in seinem neuesten, erst jetzt erschienenen Hefte der Mammiferes, die Unterschiede dieser und der vorigen Art nicht, welche sich auch noch durch manche anatomische Merkmale bewähren, da die gegenwärtige auch 2 Beckenwirbel (die vorige 3) und nur 17 Schwanzwirbel (vorige deren 21) hat.

80. 81. Der Silberfuchs. Canis argentatus Shaw.

Franz.: le Renard argenté. — Engl.: the Silvery Fox.

Kennzeichen der Art: rußgrau, weißlich gewässert, Schwanzspitze weiß.

Der Silberfuchs ist in Gestaltung und Größe mit dem amerikanischen Rothfuchs übereinstimmend. Das ausgefärbte Thier ist glänzend schwarz, nur die Schwanzspitze ist weiß, gewöhnlich ist indessen der Vorderkopf, die Seiten des Leibes und die Lenden graulich, indem die Haarspitzen silbergrau sind, und jenen eigenthümlichen graulichen Schiller veranlassen, wovon das Thier den Namen trägt, auch findet sich meist ein weißer Fleck auf der Brust. — Der Silberfuchs bewohnt mit dem Rothfuchs dieselben Gegenden in den vereinigten Staaten, ist aber äußerst selten, und die Exemplare einander ungleich in Farbe und Zeichnung. Diese drei Umstände sprechen dafür, daß er keine eigene Art, sondern nur Abart sey, und die Uebergänge in den Kreuzfuchs und Rothfuchs beweisen, daß er zu dieser Art gerechnet werden muß. Die früheren Schriftsteller hatten sehr geringe Kenntniß von diesem Thiere. Brisson, Linnée, Erxleben und Gmelin nahmen es nicht auf, die beiden erstern verwechseln es sogar mit dem schwarzen Wolfe. Auch Pennant gab nur die Nachrichten anderer. Erst Geoffroy-Saint-Hilaire beschrieb es nach einem ausgestopften Exemplare des Pariser Museums, welches früher durch M. Moydier zur Menagerie gekommen war, und hielt es so wie Fr. Cuvier für eine eigene Art. Dr. Richardson beobachtete diese Thiere genauer, und machte zuerst auf ihren Uebergang in die Grundart aufmerksam; neuerlich kam auch ein Exemplar in die Menagerie des Zoological Garden bei London. Bei der Beschreibung des Birkfuchses ist erwähnt worden, daß dieser in Europa und im Orient analoge Varietäten giebt.

Der Pelz des Silberfuchses ist wenigstens sechsmal so theuer als der eines andern seinen amerikanischen Pelzes.

82. 83. Der Korsak. Canis Corsac Pallas.

Franz.: le Renard-Corsac, Adive Buff. — Engl.: the Corsac, Corsac-Fox. — Russ.: Korssak, Korssok. — Kirgis. u. Tatar.: Karasak, Charssok. — Mongol.: Kirssa.

Kennzeichen der Art: greisgrau, Beine röthlichgelb, Schwanz stark behaart, lang, mit schwarzen Flecken an der Basis und schwarzer Spitze.

Eine der kleinsten Arten der Gattung, Größe zwischen Fuchs und Hauskatze, Länge etwa 20 Zoll, Kopf 5 Zoll 1 Linie, Schwanz nebst Haar etwa 1 Fuß, Haar allein 2 Zoll 6 Linien, Ohren 2 Zoll 3 Linien. Schnautze sehr spitzig, Nase nackt, schwarz. Von den Vorderzähnen oben die 4 mittlern stumpf, dichtstehend, die äußern beiderseits etwas entfernt, kegelförmig, etwas größer, unten die 4 mittlern abgestutzt, die äußern

Digitized by Google

größer, undeutlich zweilappig, Eckzähne rundlich; von den Backenzähnen überall die ersten klein, kegelförmig, die übrigen dreieckig. Die Regenbogenhaut des Auges aus dem Gelblichen etwas silberglänzend, die Schnurren schwarz, steif, fast bis zu den Ohren gehend, Augenbraunwarzen mit 2 größern und 4 kleinern Borsten, die Ohrdrüsenwarzen mit einer Borste, dann unter der Kinnlade jederseits eine an der Rachenöffnung mit 3 Borsten, deren 2 länger sind, eine Warze an der Kehle mit 4 weißen Borsten. Augenlieder bis an die Ränder behaart, ohne Wimpern; Ohren spitz, außen sehr weichzottig, an der Basis gelb und grauröthlich, nach der Spitze hin aschgraulich, in der Höhlung, besonders am Vorderrande, weiße zusammengeneigte Haare. Pelz weit kürzer als am Fuchs und härtlicher, besonders am Rücken, doch weicher als am Wolfe. Rücken fuchsröthlich-graulich, die Haare nämlich an der Basis und in der Mitte braunroth, an der Spitze graulichweiß, Seiten gelblich, so wie am Halse; vom Kinne aus über die Kehle und über den Bauch bis zum After weiß, Beine vorn rothgelb, gegen die Zehen hin weißlich; Vorderpfoten fünfzehig, Daumen sehr entfernt, Klaue größer, sichelförmig, übrige Klauen klein, schwarz, Hinterpfoten vierzehig. Sohle bis auf den Höcker an der Zehenspitze mit dichten, steiflichen, schmutzig blaßfarbigen Haaren, fast wie am Hasen, besetzt, die Vorderpfoten sind bis zur Ferse Grabfüße. Schwanz so lang als Rumpf, überall langzottig, oben gelblichgrau mit längeren, schwärzlichen Haaren schattirt, unterseits blaßgelblich, ohne schwarze Haare, nur das Ende oben und unten von häufigeren dunkleren Haaren schwarz. Ueber der Schwanzwurzel ein schwarzer Wischfleck. Abänderungen durch mehr oder weniger rothgelbe Farbe scheinen vom Geschlecht und Alter abzuhängen; im Winter wird der Pelz mehr weißgrau.

Der Korsak lebt in mehreren Individuen beisammen in Erdhöhlen, welche er nicht tief ausgräbt und mit zwei bis drei Ausgängen versieht. Er findet sich in der ganzen Tatarei, von der Wolga und dem kaspischen Meere an durch Mittelasien bis zum Baikalsee, an einsamen trocknen Orten in der Nähe der Flüsse, und schweift weit gegen Süden; in die hochnordischen Gegenden geht er nicht, da er nur das gemäßigte Clima verträgt. Er jagt Zieſel, Mäuse, Vögel, welche auf der Erde übernachten, besonders Trappen, Kraniche, Rebhühner, denen er die Jungen wegnimmt. In der Gefangenschaft nimmt er gekochtes Rind- und Schöpsenfleisch an, zeigt aber großen Appetit nach lebendigem Fleische, nach frisch getödteten Vögeln und Fischen, besonders störartigen. Zum Wasser geht er niemals, scheint nicht zu dursten und folglich als echtes Steppenthier geschaffen. Er riecht unangenehm, fast wie der Fuchs. Die Kirgisen fahren mit einer Stange, welche an der Spitze in vier Theile gespalten ist und daselbst etwas klafft, oder daselbst eine zweiköpfige Schraube hat, in die Höhle, fassen das Thier, drehen es mit der zangenartigen Stange zusammen, und ziehen es so heraus. Die Kirgisen, Koralpacken, Truchmenen u. a. diesseits des Ural wohnende nomadische Tataren, bemächtigen sich seiner auch durch abgerichtete Adler, Falco fulvus L., fangen es in Fallen und Schlingen, und zünden auch vor seiner Höhle Feuer an und blasen den Rauch hinein, um es zu ersticken oder herauszutreiben, wo dann die Hunde es packen. Der Korsak ist kaum jemals zu zähmen, äußerst beißig, mit Gewalt gefangen zittert er am ganzen Körper und läßt Urin und Unrath von sich. Er schläft am Tage, zur Nachtzeit läßt er bisweilen seine Stimme hören, welche der des Fuchses ähnlich ist; er läuft sehr schnell. Die Felle sind schön, doch wohlfeil. Nach Ritschkows Nachrichten werden von den genannten Volksstämmen jährlich 40—50,000 Stück Pelze nach

Digitized by Google

Orenburg und Troitzkaja Krepost, den Handels- und Tauſchorten der orenburgiſchen und ſibiriſchen Linie, gebracht, und dort an die Ruſſen überlaſſen; auch bringen die Schiffe, welche von Aſtrachan nach Mangiſchalah und Tjukkarachan gehen, jährlich eine beträchtliche Anzahl derſelben mit. Zwar wird der Korſſak in Rußland wenig getragen, er iſt aber eine geſuchte Ausfuhr über Kiachta nach China und die Türkei.

Der Karagan: Canis Caragan Gm., grau mit ſchwarzen Ohren, ſcheint Abänderung. Ich erwarte das Thier bald zu erhalten, und werde es dann abbilden.

---

b. Schakals und Wölfe.

84. 85. Der Schakal, Goldwolf. Canis aureus Linn.

Griech.: ὁ λύκος ξανθός, λατ. χρύσεος, Θῶς. — Lat.: lupus aureus. — Franz.: le Jackal, Chacal. — Engl.: the Chacal, Jackal. Vom altgriech. Worte τὸ σκυλάκιον, ein junger Hund, neugriechiſch: Skilachi (σκυλάχι). — Ruſſ. am Kaukaſus: Schakalka. — Perſ. Türk. Tatar.: Schakall. — Buchar.: Schahol. — Arab.: Kelb-maerre Forsk. Wani Nieb. — Wilder Hund Güldenſtädt's.

Kennzeichen der Art: gelbgrau-gelblich, unten ſo wie an den Beinen und der Spitze des etwas gebogenen, zottigen Schwanzes fuchsroth.

In der Größe hält er die Mitte zwiſchen Fuchs und Wolf, den Wuchs hat er mehr von letzterem, iſt aber ſchlanker, Länge 2 Fuß und 2—4 Zoll, Schwanz 7 Zoll, das Haar faſt gröber als am Wolf, Unterhaar überall gelblichgrau, am Schwanz und auf den Schultern ſehr lang bis 4 Zoll, am Nacken und Hinterrücken 3 Zoll; von den Bruſtwarzen ſtehen bei dem Weibchem 3 rechts und 4 links. Von den Vorderzähnen die 4 mittlern ſtumpf abgeſtutzt, verflacht, kaum mit Höcker, äußre größer, oben kegelförmig, unten abgerundet; Eckzähne oben etwas größer, Backzähne überall ſechs, die vorderſten am kleinſten, kegelförmig, die folgenden 2 oben und 3 unten ſind dreiſpitzig, der vierte und unten auch der fünfte ſind ſehr groß und zweiſpitzig, die hinterſten klein. Schnurren ſchwarz, Oberlippe jederſeits an der Naſe ſo wie die Kehle weiß, ſo auch die Haare im Ohre, welches außen fuchsroth iſt. Kopf oben fuchsroth, mit längeren, gelblichgrauen Haaren, welche einen ſchwarzen Ring und eine ſchwarze Spitze haben. Nacken und Rücken graulichgelb, die längeren Haare an der Spitze ſchwarz und wellenartig, beſonders auf der Rückſeite. Rumpf unterwärts ſo wie die Beine gelbroth, Oberarm und Hüften geſättichter. Wenn auch der Pelz gerade keinen Goldglanz zeigt, ſo iſt doch die Färbung bei günſtiger Beleuchtung glänzend. Klauen ſchwarz, Daumen an den Vorderbeinen höher ſtehend als am Hunde, nicht auftretend, Klaue daran hakig, fehlt aber an den Hinterbeinen, wie dieſe gewöhnlich bei dem Hunde fehlt. Schwanz etwas länger und zottiger als am Wolf, graulichgelb, an der Spitze mehr röthlich, Haare länger, an der Spitze ſchwarz, daher die Schwanzſpitze, wo ſie dichter zuſammentreffen, ſchwärzlich ausſieht.

Auf den Vorgebirgen des Kaukaſus, jenſeits des Terek, zwiſchen Avai und Andreeva, hört man häufig der Schakalle nächtliches Heulen, und dieſſeits des Terek ſollen dieſe Thiere ehedem einzeln vorgekommen ſeyn. An ſonnigen Orten im Kaukaſus, vorzüglich ſüdlich, am Fluſſe Cyrus und in ganz Hyrkanien, iſt er überaus häufig. Er

Digitized by Google

kommt auch an der Ostküste des kaspischen Meeres vor, außerhalb des russischen Reichs um Chiwa, am ganzen Districte Syr-darja und um die übrigen Städte der großen Tatarei. In den Dörfern richtet er häufig zur Nachtzeit Niederlagen in den Hühnerställen an, und schleppt den Reisenden, während sie schlafen, ihre Stiefeln und alle Eßwaaren fort. Er schweift überhaupt meist zur Nachzeit umher, jagt gesellschaftlich mit einem gräßlichen Geheul, fast ähnlich dem Heulen der Hunde. Ein Vorheuler beginnt und nach und nach stimmen die andern mit ein. Jung ist der Schakal leicht zähmbar, er gewöhnt sich an den Menschen, und läuft ihm nach wie ein treuer Hund. Pallas sahe einen aus Persien, welcher mit dem Schwanze wedelte, sich auf dem Rücken legte wie die Hunde thun, und sich wälzte, um seine Freude bemerkbar zu machen. Aelian (hist. anim. I. cap. 7.) *) meinte vielleicht den Schakal mit seiner Thoa, wenn er von ihr sagt, sie solle ein äußerst friedliches Thier seyn, vorzügliche Anhänglichkeit an den Menschen beweisen, ihm, wenn es mit ihm zusammenträfe, Ehrfurcht bezeugen, ja sogar ihm, wenn er von wilden Thieren verfolgt würde, zu Hülfe kommen und wirklich Beistand leisten. So sagt denn auch Plinius (hist. nat. VIII. cap. 52.): der Schakal: Thoes, fürchte und fliehe den Menschen nicht, wie sonst wilde Thiere thun, sondern verrathe ihm sogar andre wilde Thiere durch sein Geschrei, so daß er ihm als von der Natur bestellter Wächter erschiene. Sowol diese Umstände im Naturell des Schakals, als auch andre in seinem Bau, machen die Ansicht von Güldenstädt und Pallas sehr wahrscheinlich, daß zum großen Theile von ihm der zahme Hund abstamme, in dessen Naturgeschichte wir hierauf wieder zurückkommen werden. Diese Vermuthung zu unterstützen erwähnen wir hier nur noch der auffallenden Erscheinung, welche Aelians Erzählung bestätigt, daß der Schakal, wenn er bei Tage in die Zelte der Reisenden eintritt, bei ihnen bleibt und sie selbst Tage lang auf der Reise begleitet, wie mehrere glaubhafte Reisende das bezeugen und wie dies Güldenstädt selbst erfahren hat. Hier zeigt sich also bei einem wilden Thiere eine natürliche Anhänglichkeit an den Menschen, die man bei dem verwandten Wolf und Fuchs vergeblich suchen würde, ein Culturtrieb, der nur im Hunde seine Blüthe erreicht. — Neuerlich hat man auf den dalmatischen Inseln Guipana und Corzola einen Schakal gefunden, den man mit dem beschriebenen für einerlei hält, was noch zu bestätigen ist.

Unsere Abbildung ist die des berühmten Weltumseglers Tilesius, welcher das Thier vielfältig selbst beobachtet hat. Die Schreberische Abbildung ist bekanntlich nach einem lebenden Thiere in Belgien gezeichnet und nach russischen Bälgen colorirt, wenigstens ist sie sehr schlecht, und Ehrenberg zweifelt, ob Figur und Farbe zu demselben Thiere gehöre.

86—89. Der Schakal vom Senegal. Canis Anthus Fr. Cuv.

Franz.: le chacal du Sénégal. — Engl.: the Senegal Jackal.

Kennzeichen der Art: Graulich, schwarz gemischt, etwas gelblich gefleckt, unten blaß, der Schwanz geht über die Ferse und ist fuchsroth, an der Basis schwarz.

*) Thoa dicunt esse animal humanissimum, praecipue homini amicum, et si forte in hominem inciderit, revereri, ac velut observantes venerari, amplius si a feris aliis circumventum senserit, tum vero accurrere protinus opitularique pro viribus.

Digitized by Google

Er ist verhältnißmäßig schlanker gebauet als der eigentliche Schakal, 15 Zoll hoch auf der Mitte des Rückens, die Länge hält 21 Zoll, der Kopf hat 7 Zoll, der Schwanz 10 Zoll. Die Grundfarbe des Rückens und der Seiten ist dunkelgrau mit gelblichen Tinten; die Haare führen schwarze und weiße Ringe, unter ihnen auch gelbe Haare; das Grau ist überhaupt nicht gleichartig ausgebreitet, sondern die langen Haare theilen sich lagerweise, und zeigen bald weiße, bald schwarze Nüancen. Der Hals ist aus dem Rothgelben graulich, wie auch die Oberseite des Kopfes erscheint; dessen Unterseite, eben so wie die Beine und der größte Theil des Schwanzes ist fuchsröthlich, die Basis des letztern ist dagegen schwärzlich, und dessen Spitze trägt einige schwarze Haare. Der Maulrand, die Unterseite der Unterkinnlade, Kehle, Brust und Bauch, so wie die Innenseite der Gliedmaßen ist weißlich. Die Haare, besonders über den Rücken und am Schwanze, sind sehr lang, an den Seiten und am Halse kürzer, und sehr kurz am Kopf und Gliedern.

Dieser Schakal hat in seinem Betragen vieles mit dem Hunde gemein, er trägt gewöhnlich auch den Schwanz etwas aufwärts gekrümmt, und zieht ihn nur zwischen die Beine, wenn er Furcht hat, wobei er dann die Zähne fletscht. Ein Paar gute Worte sind indessen hinreichend, ihn zu besänftigen; er kommt grinzend näher, und leckt seinem Wärter die Hände. Seine Stimme ist sanft, sie giebt lange Töne, kein kurzes Bellen; Sehnsucht drückt er durch ein sanftes Winseln aus, fast wie junge Hunde thun, und wenn andre Thiere schreien, so schreit er mit. Der Geruch, den er verbreitet, ist weit schwächer, als der vom eigentlichen Schakal.

Nach Angabe der Besitzer, welche eins dieser Thiere nach Paris lebendig brachten, kam dasselbe vom Senegal. Dies ist in Fig. 86 und 88 abgebildet; ein anderes, Fig. 87, welches aus demselben Vaterlande seyn sollte, erhielt ich hier in Dresden aus v. Aken's Menagerie, und habe es jetzt ausgestopft vor mir; ich bin zweifelhaft, ob es nicht vielmehr zu No. 95 gehört.

In Paris sperrte man den beschriebenen weiblichen Schakal vom Senegal mit dem Männchen des bengalischen Schakals No. 92., beides junge Thiere, zusammen, und obwol beide nicht zahm wurden, auch nicht eben in angenehmen Verhältnissen zusammen lebten, so paarten sie sich dennoch nach sechs Monaten gegen den 26. December und folgende Tage im Jahre 1821. Nach 62 Tagen, den 1. März 1822, gebar das Weibchen 5 Junge, und ungeachtet einer großen Unruhe, die sie erlitt, nahm sie dennoch dieselben an. Sie waren 7 Zoll lang, der Schwanz 2½ Zoll, der Kopf 2 Zoll, die Ohren waren hängend, und so wie die Augen vollkommen geschlossen. Der Pelz weich und dick, wollig am Leibe und seidenartig an Kopf und Beinen; die Farbe ein schönes greisgrau, mit einem Zug in's Gelbliche an Ohren, Hals und Vorderbeinen. Unten war das Grau blasser, eine weiße Querlinie auf der Brust, zwischen den Vorderbeinen, der Schwanz schwarz. Die Wollhaare waren insgemein rothgelb, nur deren Spitze schwarz wie die Seidenhaare. Diese Farbe ging in schmutzig rothgelb über, und nach 9 Tagen sahen sie so aus, wie sie hier abgebildet sind. Nur zwei blieben am Leben, von denen eins ohne Furcht, das andere sehr furchtsam blieb. Vierzehn Tage lang hielt man sie ganz finster, damit die Mutter nicht über ihren Anblick erschrecken oder vielleicht, wie dies oft geschieht, sie verlassen oder verzehren möchte. — Abbildung No. 89.

Digitized by Google

91. Der Schakal vom Cap. Canis mesomelas Schreb.

Franz.: le Chacal du cap de bonne espérance. — Engl.: the Cape Jackal, Cape Fox Griff. — Hottentot.: Teulie, Kénlee.

Kennzeichen der Art: fuchsröthlich, roſtfarbig, unten blaſſer, Rücken ſchwarz.

Dieſer Schakal iſt größer als vorige, ich meſſe 3 Fuß 6 Zoll, der Schwanz hält 1 Fuß. Ausgezeichnet iſt das Thier durch die begränzte Schwärze, welche ſich über Hals und Rücken hinzieht, doch mit weißlichen Haaren melirt ſcheint, weil die meiſten nur an der Spitze ſchwarz ſind, auch wohl ſo liegen, daß das ſchwarze Schild weiß eingefaßt ſcheint. Kehle, Bruſt und Bauch ſind weißlich, der Schwanz an der oberen Hälfte braungelb, über die Mitte hin läuft ein länglicher, ſchmaler, ſchwarzer Streif, die untere Hälfte iſt ſchwarz, mit blaſſen Ringen, die Spitze trägt wenige weißliche Haare. Eine Warze auf dem Backen jederſeits und über dem Auge trägt zwei lange Borſten von ſchwarzer Farbe; dieſelbe Farbe führen die Schnurren.

Er wohnt am Vorgebirg der guten Hoffnung, ſeine Lebensweiſe iſt jedoch von den Reiſenden bisher nur im Allgemeinen erwähnt worden, und es ſcheint, daß er nicht ſo zutraulich iſt, wie der eigentliche Schakal, mehr nächtlich wild und ſcheu, wie der Fuchs. Desmareſt behauptet aber gegen Cuvier, die Pupille ſeines Auges ſey rund, er gehöre mit Recht in gegenwärtige Abtheilung der Schakals und Wölfe.

Die Abbildung iſt nach dem vor mir ſtehenden Thiere gemacht.

92. Der bengaliſche Schakal. Canis micrurus Reichb.

Franz.: le Chacal des Indes. — Engl.: the Indian Jackal. — Malabar.: Nari.

Kennzeichen der Art: gelblich, Rücken und Seiten aſchgrau, Kopf und Hals unten, ſo wie die Ohren und Beine innen, weiß, Schwanz die Ferſen nicht berührend.

Dieſer Schakal iſt nur 2 Fuß 1 Zoll lang *), der Schwanz hält 7 Zoll. Lechenault ſendete ihn aus Bengalen an die Pariſer Menagerie; ein Weibchen dazu war auf der Reiſe geſtorben. Dies abgebildete Männchen iſt das oben erwähnte, welches mit dem Weibchen des Schakals vom Senegal ſich zuſammenpaarte.

93. Der ſyriſche Schakal. Canis syriacus H. E.

Franz.: le Chacal de la Syrie. — Engl.: the Syrian Jackal. — Syr.: Vanie, auch wohl Ji (plur. Jim), der heiligen Schrift. — Alt Arab.: Ibn Aui, außerdem Abin, auin, babuin, papio? Θώς und Thois.

Kennzeichen der Art: Wuchs und Größe des Fuchſes, Schnauze ſtumpf, Ohren und Beine kurz, Farbe oben grau-fuchsröthlich, Kopf und Beine fuchsroth, unten weiß, am Rande gelblich, Maulrand und Kehle reinweiß, Ohren außen fuchsroth, innen weiß, Schwanz wenig zottig, fuchsroth (ohne weiße Spitze).

Die Länge beträgt 2 Fuß 2 Linien, die des Kopfes 5 Zoll 3 Linien, die der Schwanzruthe 8 Zoll, das Ohr iſt am Oberrande 1 Zoll 9 Linien lang. Die Statur iſt die des Fuchſes. Der Kopf hält faſt anderthalb Viertheile der Körperlänge, und iſt um ein Achttheil länger als die Pfote. Die Ohren ſind kurz, ſo lang als der Plattfuß. Die Vorderbeine ſind vom Ellenbogengelenke aus um ein Viertheil länger als der Kopf.

*) In meinem Regnum animale ſteht pag. 11. durch einen Druckfehler 1 ped.

Digitized by Google

Das Mittelhaar am Rücken ist etwa 1 Zoll 4 Linien und das am Schwanze nicht viel länger. Die Farbe ist graulich-fuchsröthlich, über den Rücken läuft ein schwarzes Band, Beine, Kopf und Ohren auswendig röthlich, die Unterseite so wie die Innenseite der Beine ist weiß. Eine verloschene, gelbliche Binde ist vorn auf der Brust. Ein breiter Maulrand und die innere Behaarung des Ohres ist reinweiß. Die nackte Nasenspitze ist schwarz, die Klauen schwärzlich hornfarbig, an den spitzlichen Ohren ist der obere Rand schwärzlich. Die Schnurren und übrigen Kopfborsten sind schwarz. Auf dem Rücken finden sich einzelne vierfarbige Haare, an der Basis gelblich, dann schwarz, weiß und an der Spitze schwarz. Die Mittelfarben sind röthlich begränzt, das Wollhaar ist gelb. — Er unterscheidet sich vom Fuchs durch die weit kürzeren Ohren und kurze, stumpfe Schnautze, Kopf und Beine sind kürzer, und die Maaßverhältnisse weichen gleichfalls von denen der übrigen afrikanischen Arten der Gattung ab. Die Kopfgestalt nähert sich mehr der am Wolfe.

Ehrenberg erhielt ein einziges Exemplar bei Emschecht, zwischen Berytus und Tripolis in Syrien, man hörte aber das Geheul von mehreren, welches sie indessen nicht aus Hunger oder Wuth, sondern mehr zur Unterhaltung anzustimmen schienen. Dasselbe klingt wie ein jämmerliches Lamento: **Aui aui aui aui i i i i au au au au aui aui aui aui au au au au.** Die Einwohner gaben an, daß das Thier noch größer würde, und legten das Zeugniß ab, daß es keineswegs bösartig sey oder dem Menschen anfiele, im Gegentheile ihm sich zuthulich bezeuge. Es soll also sanfter seyn als der Fuchs. Es dürfte als ausgemacht gelten, daß viele Nachrichten von Reisenden und viele Beziehungen von Naturforschern auf den Goldwolf und Schakal, von denen sie im Allgemeinen sprechen, für gegenwärtige Art gelten. Auch von ihm wird das sanfte Benehmen gegen dem Menschen schon durch Bellonius geschildert und von dem bithynischen wilden Hunde durch Busbeck. Es kann mit Wahrscheinlichkeit nur gegenwärtige Thierart unter den Füchsen gemeint seyn, von welcher wir in der heiligen Schrift lesen, daß Samson deren 300 mit Feuerbränden zusammengebunden und in die Felder der Philister entlassen, denn nur diese Art lebt so gesellschaftlich in Syrien.

94. Der Dib oder Sib? Canis Lupaster H. E.?

Franz.: le Chacal Dib. — Engl.: the Dib Jackal. — Aegypt. Arab.: Dib, Sib.

Kennzeichen der Art: größer als Fuchs, kleiner als Wolf, ihm ähnlicher, lang behaart, aschgraulich-gelblich, verloschen fuchsroth und schwarzbunt, Kopf dick, Maul spitzig, Scheitel, Ohren, Nase und Beine gelblich, Schwanz kürzer als Beine, schlaff behaart, Haarspitzen und ein Fleck gegen die Basis schwärzlich oder röthlich.

Das hier abgebildete Thier wurde in der Pariser Menagerie lebendig gehalten und war vom Senegal gekommen. Fr. Cuvier giebt es zwar unter dem Namen **Chacal du Sénégal mâle**, sieht aber selbst ein, daß es ein ganz anderes Thier ist, als das, welches er als Weibchen von daher (unsere Fig. 92.) abgebildet hat. Nach den Diagnosen, welche der berühmte Ehrenberg von den afrikanischen Thieren dieser Gattung gegeben, scheint mir derselbe zu der Art zu gehören, deren Namen ich als Ueberschrift aufnahm, doch ist die Entscheidung über diesen Punkt so schwierig, daß ich jede Belehrung darüber dankbar aufnehmen und einen etwa begangenen Irrthum in den Supplementen gern berichtigen würde.

Digitized by Google

95. Der gescheckte Schakal. Canis variegatus Rüpp. Cretzschm.

Franz.: le Chacal varié. — Engl.: the variegated Jackal. — Arab.: Abu Schom.

Kennzeichen der Art: Haare langzottig, ockerfarbig, an der Spitze glänzend schwarz, Ohren aufrecht, gleichfarbig, Schwanz kürzer als Beine.

Die Länge beträgt 2 Fuß 1 Zoll *), die des Schwanzes 10 Zoll, der Kopf ist 6 Zoll 3 Linien, die Ohren 2 Zoll 10 Linien, die Schulterhöhe 1 Fuß 2 Zoll, die Kreuzhöhe 1 Fuß 3 Zoll 4 Linien. Die Wollhaare sind durchgängig zart und hell ockerfarben, die Borstenhaare sehr lang und rauh, an der Wurzel haben sie die allgemeine Farbe, in der Mitte einen schwarzen Ring, diesem folgt ein ockerfarbiger, und endigen dann mit glänzendschwarzen Spitzen, die sich büschelförmig zusammenschichten, wodurch der Pelz ein schwarz- und gelbgescheckes Ansehn erhält. Der Kopf ist ziemlich breit; Nase stumpf und schwarz; Raum zwischen der Nase und den Augen grell ockerfarbig; Stirn, Scheitel und Wangen gemischt von kurzen, schwarzen, weißen und braunen Haaren. Iris braun. Ohren vorn weiß eingefaßt, hintere Wand derselben vorn ockerfarbig. Unterkinn, Kehle, Hals, Brust und Unterleib schmutzig weiß. Bart-, Backen- und Augenbraunborsten schwarz; Schwanz kürzer als Beine, gescheckt wie der Leib und mit schwarzer Spitze; Gliedmaßen lang, die hintern höher als die vordern, sämmtlich ockerfarbig, oben dunkler, unten heller, sehr kurzhaarig. Fußsohlen schwarz, stark wulstig, unbehaart. Nägel kurz, dick, schwarz und stumpf. Diese Beschreibung gab Hr. D. Cretzschmar nach einem ausgewachsenen, von Herrn Rüppel gesendeten Männchen. Das junge Thier ist überaus rauhhaarig, wenig gescheckt und alle Farben schmutzig. Das sehr alte Thier ist mit sehr zartem Wollenhaar bekleidet, die Borstenhaare sind selten, dagegen trägt es vom Nacken bis zum Schwanze eine mehrere Zoll lange glänzend schwarze Mähne.

Dieser Schakal wurde von Rüppel in Nubien, Oberägypten, in den Wüsten und felsigen Gegenden angetroffen, in denen er Geflügel und kleinere Säugthiere jagt. Er gräbt keine Höhlen.

96. Der Koupara. Canis cancrivorus Desmar.

Franz.: le Chien sauvage, Chien de bois de Cayenne Buff. Chien Crabier. — Engl.: the Crab Wolf. — Cayenn.: Koupara.

Kennzeichen der Art: oben graulich und schwarz melirt, unten weiß und gelblich, Ohren, Läufe und Schwanzspitze schwarz, Hals an den Seiten bei den Ohren fuchsroth.

Der Koupara ist 2 Fuß 1 Zoll lang, der Kopf hat 6 Zoll 9 Linien, oberhalb der Augen gewölbt, diese gehen 5 Zoll 3 Linien über die Nasenspitze herauf. Im Ganzen hat er also die Verhältnisse des Schäferhundes, dem er auch im Wuchse am meisten gleicht; indessen ist er kurzhaariger, besonders am Schwanze. Er hat fast Wolfshaar. Augenliederrand und Nase ist schwarz, auf den Wangen zeigen sich ein Paar kleine schwarze Streifchen, die Schnurren sind schwarz, bis 2 Zoll 5 Linien lang, die Ohren 2 Zoll lang, bis 14 Linien breit; das Haar an ihrem Eingange ist weißgelblich und mit einem kurzen, rothen, braungemischten Haare verdeckt. Diese rothe Farbe zieht sich

*) Im Regnum animale pag. 11 ließ: 2 ped. 1 poll.

Digitized by Google

von den Ohren am Halse herab, geht gegen die Brust hin in das Graulichе über und wird daselbst weiß, die ganze Mitte des Bauches ist gelblich, ebenso die Innenseite der Hüften und Vorderbuge. Das Haar am Kopf und Leib ist schwarz, gelblich, fahl und grau und weiß gemischt. Das Fahle herrscht über Kopf und Beine, geht aber am Körper mehr in Grau über, weil sich da viele weiße Haare untermischen. Die Beine sind dünn und kurz behaart, das Haar wie an den Läufen dunkelbraun, etwas roth gemischt, die Pfoten sind klein und halten nur 17 Linien bis an das Ende der längsten Zehe; die Nägel an den Vorderpfoten haben 5½ Linien, der innerste Nagel ist stärker als die andern, er hat 6 Linien Länge und ist am Ursprunge 3 Linien breit, an den Hinterpfoten haben sie 5 Linien. Die Schwanzruthe ist 11 Zoll lang, sie trägt ein ziemlich kurzes, gelbliches Haar, welches sich in das Graue zieht, die Unterhaare des Schwanzes ziehn in das Braune. Die Spitze ist schwarz.

Der Koupara lebt von Aguti's, Paka's u. dergl.; er faßt diese Thiere und beißt sie todt. Er liebt auch Früchte, hält sich gesellschaftlich zu 6 bis 7 Individuen beisammen, und bleibt in der Gefangenschaft bösartig. Der Graf Laborde sendete das Thier aus Cayenne an Buffon; es befindet sich noch jetzt nebst einem zweiten im Pariser Museum, und es ist mir unbegreiflich, wie Griffith in seinem **Animal Kingdom Vol. V. No. 325.** den **Chien crabier** Laborde zum krabbenfressenden Waschbäre (**Procyon cancrivorus**) ziehen konnte, den ich Fig. 435, nach einem vor mir stehenden Exemplare, abgebildet habe. Es ist mir nicht unwahrscheinlich, das der Name Koupara des Barrère auch, oder vielleicht gar vorzugsweise, dieses Thier bezeichnet, allein das von Laborde und von Buffon mit diesem Namen bezeichnete, auf welches dann auch vielleicht der Name **Crabier** mit Unrecht übergetragen wurde, ist und bleibt ein ganz verschiedenes Geschöpf, welches Griffith selbst unter **No. 375.** aufführt.

97—98. Siehe oben nach No. 71.

99. Der Mähnenwolf. Canis jubatus Desmar.

Franz.: le loup rouge. — Engl.: the Red Wolf. — Brasil.: Aguara gouazou Azara. — Canis lupus mexicanus Linn.

Kennzeichen der Art: gesättigt zimmetbraunroth, unten blasser, schwarze Mähne über den Halsrücken.

Er ist etwas kleiner als der gemeine Wolf, dessen Ansehn er hat. Azara beschreibt ihn folgendermaßen. Auf dem Kopfe oben ist ein großer, weißer Fleck, von einem dunkleren umgeben. Die Hauptfarbe des ganzen Thieres ist ein dunkles Roth, sehr hell auf den untern Theilen, und fast weiß am Schwanz und der Innenseite des Ohrs. Von den Augen aus zieht das Roth gegen die Nasenspitze in schwarz. Vom Hinterkopfe geht eine Mähne von Haaren, welche von ihrer Mitte aus bis zur Spitze schwarz sind, bis auf die Schultern. Das Weibchen ähnelt ganz dem Männchen, hat 6 Zitzen, und scheint gegen Monat August 3—4 bis 6 Junge zu gebären. Dieser Wolf bewohnt Paraguay, wo er sich in niedern, sumpfigen Gegenden aufhält, einzeln lebt, in der Nacht ausgeht, leicht schwimmt, und sich von kleineren Thieren nährt. Er ist sehr muthig, er sucht die Fährte der Thiere auf, und jagt nach der Spur. Sein Geschrei klingt: **gaua-a-a**, dies wiederholt er oft und zieht es lang, man hört es sehr weit.

Digitized by Google

100. 101. Der schwarze Wolf. Canis Lycaon Schreb.

Franz.: le loup noir. — Engl.: the black Wolf.

Kennzeichen der Abänderung: wie Wolf (105.), aber schwarz.

Ist in neuerer Zeit allgemein als Abänderung des gemeinen Wolfes erkannt worden, daher wir auf diesen Artikel verweisen.

102. 103. Der gewölkte Wolf. Canis nubilus Say.

Franz.: le loup pommelé. — Engl.: the clouded black Wolf.

Kennzeichen der Art: dunkel aschgrau und schwarz gewölkt, an den Seiten aschgraulich, Haare an der Basis aschgrau, dann dunkel braunschwarz, dann aschgrau mit schwarzer Spitze.

Diese Art ist mit gutem Grund vom europäischen schwarzen Wolfe und vom gemeinen Wolfe überhaupt unterschieden worden. Der gewölkte Wolf ist merklich kräftiger, auch fast größer als jener, er hat 4 Fuß 3 Zoll 9 Linien Länge, der Schwanz hält 13 Zoll. Das Gesicht hat seine eigenthümliche Physiognomie. Letztere ist drohender und wilder, aber weniger schlau und nicht ohne einen gewissen Zug von Edelmuth. Das Haar ist von bedeutender Länge, besonders über den Rücken hin und auf den Schultern, wo es ziemlich deutlich eine zerstreute Mähne bildet, von Farbe schwarz, grau und weiß gewölkt, so daß das Thier eben durch diese gewölkte Färbung sich vorzüglich auszeichnet. Ueber den Rücken hin läuft mehr das einfarbige Schwarz, die Seiten werden heller, und noch heller die Unterseite. Kinn und Maulwinkel sind weiß; die grauen Wolken ziehen sich über den größten Theil des Pelzes, doch nicht so regelmäßig, um einzeln beschrieben zu werden. Die Ohren sind sehr kurz, auch der Schwanz kürzer als am gemeinen Wolf, so daß eigentlich dessen Ruthe die Ferse nicht berührt, nur die Haare bilden eine Spitze, welche über die Ruthe hinausgeht.

Die abgebildeten sind die beiden einzigen jetzt in Europa existirenden Individuen, sie wurden vor einigen Jahren von einigen Jägern der Hudsonsbaygesellschaft im nördlichsten Amerika entdeckt. Auch ein schönes Fell dieser Art kam durch die Expedition, welche der Capitän Franklin leitete, in das Museum der zoologischen Gesellschaft in London. Es wurde außerdem noch ein Exemplar in einer Gegend am Missuri, durch Theilnehmer der Expedition, welche Major Long von Pittsburgh aus nach den Rocky Mountains anstellte, gefangen. Mr. Say gab von demselben eine genaue Beschreibung in den Notizen über diese Reise, und bestätigte schon die neue Art, welcher er obigen Namen gab. Die Lebensweise des Thieres im wilden Zustande kommt wahrscheinlich mehr überein mit der unsers gemeinen Wolfs, in der Gefangenschaft ist indessen das Benehmen beider wohl zu unterscheiden. Auch der gewölkte Wolf ist äußerst gefräßig, mit Wuth zerreißt er den Fraß, verschlingt ihn in großen Bissen, und zerbeißt dann die Knochen mit wahrer Wolfsgier. Obwohl in enger Haft gehalten, blieb ihre Wuth zur Zeit noch dieselbe.

104. Der sumatranische Wolf. Canis sumatrensis Hardw.

Franz.: le loup de Soumatra. — Engl.: the Sumatran Wolf.

Kennzeichen der Art: roth-rostfarbig, unten heller, Nase zugespitzt, Ohren

Digitized by Google

aufrecht, zottig, Gliedmaßen ziemlich hoch, Schwanz hängend, buschig, an der Basis verdünnt.

Der sumatranische Wolf ist nur 2 Fuß lang und 14 Zoll hoch. Seine Größe und sein ganzes Ansehn macht ihn dem Fuchs ähnlich, man findet aber auch Analogien mit dem wilden Hunde an ihm, so daß ihn Griffith in seinem Animal Kingdom als Abart des Dingo (Fig. 110. 111.) aufführt. Von dem ostindischen wilden Hunde Quao, welcher auf den Hügelgebirgen von Ramghur vorkömmt, unterscheidet er sich durch mehr zugespitzte Ohren. Die Nasenspitze ist schwarz, die Schnurren lang und schwarz, die Schnautze roth, schwarz melirt. Die Vorderbeine haben 4 große, starke, verbundene Zehen, und eine fünfte innere, sehr weit von den übrigen entfernte; die Klauen sind lang, zusammengedrückt und stark. Die Stimme ist mehr ein Geschrei als Gebell. Das Thier bleibt wild und unzähmbar, es lebt im innern Sumatra gesellschaftlich, und ist zur Zeit nur von Hardwicke beobachtet worden.

105—109. Der Wolf. Canis lupus Linn.

Griechisch: ὁ λύκος, ου, Wölfin: ἡ λύκαινα, junger Wolf: ὁ λυκιδεύς. — Altlatein.: lupus, Wölfin: lupa. — Franz.: le loup, Wölfin: la louve, junger Wolf: louveteau. — Ital.: lupo. — Span.: lobo. — Engl.: the Wolf. — Schwed. und Dänisch: Ulv, Ulf, Warg, Gråben. — Polnisch: Wilk. — Hebräisch: Zeeb. — Russisch: Wolk, im Norden: Biruk. — Tatar. Burò oder Byrù; am Jenisei: Burò; Nogaisch: Beroe; Jakut. Boeroe und Tangaraula, d. h. Sohn Gottes (zur Ehrenbezeugung); Tschuwasch. Kaskar; Baschkir. Karschan; Mongol. Zinù oder Zschinò; Burät. Schonno; Kalmuk. Tschòno; Tunguf. Boyuku, Ayitka, auch Typkäki, am Jenisei: Gmschko; in Dauurien: Guzke; Lamut. Galuki; Tanguf. Gschingku; Jnd. Wadijah; Zigan. Ruw; Japan. Oinu, Ogame; Kamtschad. am Fl. Ukt: Kuiru, Kuilchu, westlich: Kytaju; am Fl. Tigil: Algne; am Fl. Kamtschatka: Kyrch; Jukagir. Kodel; Korät. Egylungun; Kuril. Origu; Aleut. Kahanaae. — Samojed. am Petschora und Ob: Sarmik, Njilleka und Ty-chanda ob. Ty-channuta, d. h. Rennthierfresser; Jurät. Téhanuda; Mangaseenf. Sárne; Tawg. am Jenisei: Njulaeda ob. Njunlera; Tomsk. Tjumbune ob. Tschumbone; Saganst. (Bergbewohner): Manderaa; Kamasch. u. Kabal. Madne; nomad. Tschuktschen: Hinga; ansässige Tschuktschen: Kallunak; Aleut. Elliachgik; Kanag. Alechgik; Lett. Wilks ob. Meschalunkis; Esthen. Hunt; Permienf. Koin; Mordvan. Wirgas; Tscheremiss. Pirae; Wotjäk. Kijon; Ostjak. am Ob: Jéur ob. Jéwur, auch Wullipertowol, d. i. Rennthierzerreißer; Lumpo-kolienf. Jogurech; Jugan. Pur; Surgutenf. Jeuri u. Jaura; Narymenf. Tschumbani; Mogul. diesseit: Sohsch, am Ob: Purne-ui; Arinz. am Fl. Ket: Chotu ob. Chut; Jubazker: Kchuute; Assaner: Bòru; Kotowzker: Bùru; Armen. Kjel; Georg. Mgeli; Osset. Birach; Mizdschegis. Borta; Tscherkass. Duguschg.

Kennzeichen der Art: Schwanz einwärts gekrümmt, Augen schief, Pelz aus dem Greisgrauen gelblichgrau, weißlich und schwärzlich melirt, Vorderläufe vorn (im Alter) mit schwarzem Strich.

Beschreibung. Der alte Wolf hält gewöhnlich 3 Fuß 7—8 Zoll, auch wohl 4 Fuß Länge, dessen Schwanz 16 bis 17 Zoll, die Schulterhöhe beträgt 2 Fuß 5 Zoll, und die Kreuzhöhe 2 Fuß 3 Zoll. Am Gewicht erreicht er 70—80 Pfund. Der Pelz hat als Grundfarbe ein gelbliches Grau; zieht meist an der Schnautze, über den Rücken, auf den Schultern und in den Seiten in's Schwärzliche, unterseits in's Weißliche, im Alter bildet sich auf den Vorderbeinen ein schwarzer Längsstreif. Das Oberhaar ist lang und ziemlich grob, an der Wurzel weiß, dann schwarz, dann wieder weiß oder rostgelb, an der Spitze schwärzlich. Das Unterhaar ist wollig und grau, daher unter dieser Farbe auch die Jungen erscheinen, bevor sie das Oberhaar erhalten. Am längsten ist das Oberhaar bei alten Wölfen um die Ohren herum, am Halse, den Hinterbacken und am Schwanze, welcher dicht behaart ist und gerade getragen wird. In der Gestalt nähert sich der Wolf am meisten dem großen Spitz- oder Wolfshunde, in der Größe der

Digitized by Google

englischen Dogge, sein Kopf nähert sich in der Form dem der ersteren Race, die Schnautze ist fast auf gleiche Weise gespitzt, der Rachen sehr tief gespalten, die Augen sind weiter entfernt, deren Oeffnung sehr schief, die Ohren gleichfalls gerade. Gebiß hundeähnlich, doch sind die beiden äußern Vorderzähne der obern Kinnlade nur einspitzig, schief abgestutzt, die der Unterkinnlade außen mit einem Höcker wie die beiden folgenden oben und unten. Sehr groß sind die Eckzähne und die kräftigen Beißmuskeln.

Abänderungen in der Färbung gehen auf der einen Seite in das vollkommene Weiß und in das Rothgelbe, andererseits in Schwarz (vergl. No. 100. 101.) mit graulichweißer Iris. Zu Irkutsk sahe Pallas das Fell eines schwarzen Wolfes mit weißem Streif von der Kehle aus längs herabziehend, schlaffe Behaarung auf dem Rücken; übrigens dünnes Haar, und der Schwanz fast haarlos. Auch in Pommern und in Schlesien waren schwarze Wölfe erlegt worden. Im Jahre 1779 hielt man in der kaiserlichen Menagerie in Petersburg einen lebendig, welcher obenhin kohlschwarz, um das Maul und an der Kehle weiß war, die Seiten des Halses, Schultern und Bauch mit weißen Haaren gemischt, die Vorderbeine waren hinten, nebst den ganzen Zehen, die Hinterbeine vorn weiß, der Schwanz mit weißen Haaren gemißt, Regenbogenhaut braungelb, Statur ziemlich klein, Betragen sanft. — Bastarde zwischen Wölfinnen und Jagdhunden kommen bisweilen vor, schon Buffon erzählt eine dergleichen fortgesetzte Generation, und bildet die entstandenen Bastarde ab. Diese fallen oft in demselben Wurfe sehr ungleich, wie die drei Jungen, welche im Jahre 1826 auf der Pfaueninsel bei Potsdam geboren wurden, von denen zwei mehr wolfsähnlich, ein drittes aber vollkommen hundsähnlich wurde, und hängende Ohren erhielt. Auch zu Kuskowa bei Moskau befand sich eine Familie, von einem schwarzen Wolf und einem Hunde abstammend; die Jungen waren dem Wolfe ähnlicher, unter ihnen eins weißlich-wolfsfarbig, aber dieses mehr hundsartig. Dergleichen Wolfshunde haben meistens die verschlagene Wildheit und Gefräßigkeit der Wölfe, sind am Tage träg, zur Nachtzeit thätig und gierig, und fallen sogar Schafe an, wie der Wolf, ohne die Fähigkeiten der Hunde zu erreichen. — Man unterscheidet auch eine kleinere Race, den Rohrwolf: Can. lupus minor Kram. —

Vaterland. Der Wolf findet sich zwar nicht in Aegypten, aber durch ganz Europa, Asien und Amerika. In Europa war er vormals überall häufig verbreitet; die steigende Cultur hat ihn sehr vermindert und aus den meisten Gegenden gänzlich vertrieben, doch ist er noch vorzüglich häufig in Polen und Rußland. Pallas fand ihn durch alle Provinzen Rußlands und Sibiriens häufig in den Waldungen, so wie auch in waldlosen Gegenden, von der arctischen bis zur südlichen Grenze. Im Norden ist er größer und weißlich, je weißer desto mehr geschätzt; die allerweißesten kommen aus der Gegend von Mangasea. Auch bei den Kirgisen giebt es weiße Wölfe, sie sind aber kleiner, ihr Fell ist weicher. In waldlosen Gegenden ist der Wolf kleiner und träger, lebt meist in der Nähe der Sümpfe in Schilf, daher der Name Rohrwolf, z. B. am Neusiedler-See. Der schwarze Wolf erscheint gewöhnlich überall nur als Einzelnheit, auch in Rußland ist er selten, um den Fluß Kaama und in Sibirien, besonders ostwärts, giebt ihn Pallas als häufig an. Am östlichen Ocean laufen die Wölfe der Beute oft so weit nach, daß sie auf Eisschollen gerathen, und auf die Inseln und nach Amerika getrieben werden. Auf diese Weise kommt der Wolf als zahlreicher Ueberläufer auch auf die kurilischen Inseln, eben so durch Eisschollen vom Meerbusen der Tschuktschen nach

Digitized by Google

Amerika. In Deutschland finden sich noch Wölfe an der östlichen, südlichen und westlichen Grenze. In Nieder-Oestreich kommen sie auch noch in der Gegend des Schneebergs und Oetschers vor, bei Gutenstein, Lilienfeld u. s. w. Dann im Oberösterreichischen Alpenzuge, von wo aus sie bisweilen in die niedern Berge streifen und nicht allzuselten, besonders zur Winterszeit, selbst die Thiergärten nächst Auhof bei Wien besuchen, wo deren mehrmals und zwar noch im Jahre 1826 einer geschossen worden ist. Auch in Mähren und Böhmen erscheint der Wolf noch, und schleicht herüber in die Lausitz bis über die Grenze von Sachsen, wo der letzte im Jahre 1814 bei Dippoldiswalde geschossen wurde.*) In Schlesien treten nur selten einzelne aus Pohlen zur Winterszeit über, auch in Baiern erscheint er höchst selten. Weniger selten sehen ihn die Gegenden am Rhein, und in Belgien soll sich in den letzten Jahren wieder eine Zahl dieser Raubthiere vermehrt haben. Er scheint ursprünglich ein Thier des Nordens zu seyn, denn im Norden gedeiht er in jeder Hinsicht am besten, nur dort vermehrt er sich häufig, und erlangt eine Länge von 5 Fuß, während er in den heut zu Tage gemäßigten Landstrichen seltner bleibt, und nicht leicht über 3 Fuß Länge erreicht.

Seinen Aufenthalt nimmt der Wolf vorzugsweise in großen, dichten Wäldern, wo er sich in Höhlen, Schluchten und enge Felspässe zurückzieht. Im Sommer streift er meist einzeln herum, und nur die Mütter gehen in Gesellschaft ihrer Jungen auf Raub aus. In der Regel lebt der Wolf überhaupt, wie die meisten Raubthiere thun, einsam und hält sein Revier wie jene. Wo indessen, wie in Pohlen und Rußland die Wölfe häufiger sind, versammeln sie sich vorzüglich im Winter zur Nachtzeit, und rauben gesellschaftlich. Solche Vereine greifen dann auch Menschen an. Was die Nahrung der Wölfe betrifft, so pflegen sie gewöhnlich Rehe, Hirsche, im hohen Norden auch Rennthiere in enge Pässe zu treiben, wo sie dann über sie herfallen. In den bewohnten Gegenden richten sie ihre Hauptjagden auf gezähmte Thiere, auf Schaafe, Rinder, Pferde und Schweine. Die Pferde reißen sie oft vor dem Gespann nieder, indem sie ihnen von vorn, oder von der Seite auf den Nacken springen, und die Gurgel aufbeißen. Der Wolf tödtet seine Beute überhaupt durch Aufreißen der Kehle, schleppt sie dann an einen sichern Ort und frißt von ihr zuerst die Zunge. Geflügel schält er geschickt aus der Haut. Er hat einen kräftigen Hals, seine Nackenmuskeln halten es aus, daß er einen Hammel im schnellen Laufe davon trägt. In die Ställe wühlt er sich oft unter der Thürschwelle ein und scheut dabei keine Gefahr. Im Nothfalle frißt er auch Aas, selbst das älteste ist ihm dann noch schmackhaft. Wenn es ihm an warmblüthigen Thieren gänzlich gebricht, soll er auch Amphibien fressen. Im Heißhunger, der ihn besonders zur Winterszeit peinigt, verschlingt er oft unverdauliche Dinge, Lederwerk und Kleidungsstücke überhaupt, bei gänzlichem Nahrungsmangel fressen die Wölfe, wie die meisten Raub- und viele Nagethiere thun, einander selbst auf. Dieser Zug ist überhaupt dem Wolfe so wenig allein eigenthümlich, daß wir ihn nicht einmal aus der Geschichte des Menschen vertilgen können. Der Wolf nimmt auch fleißig Wasser zum Getränk. Ueber seine Lebensweise und sonstigen Eigenthümlichkeiten folgendes. Der Wolf verbreitet besonders zur Paarungszeit und nach dem Genusse von Aas, einen höchst unangenehmen Geruch. Seine Stimme ist ein fürchterliches Geheul, selt-

*) Das Historische über die Wölfe in Sachsen, gebe ich in: Sachsens Fauna.

Digitized by Google

ner ein kurzes Bellen. Zur Nachtzeit, besonders im Winter, hört man den Wiederhall gräßlich aus den Wäldern in weitem Umkreis ertönen. Die Paarungszeit fällt in den December, sie dauert bei dem einzelnen Thiere 12 — 14 Tage, im Allgemeinen aber bis zum April. Sie beginnt bei den Alten, und geht nach und nach auf die Jungen über. Die Weibchen entwickeln sich im Ganzen schneller, sind jedoch nicht früher als nach dem zweiten Winter fähig zur Paarung. Die Wölfin trägt drei und sechzig (nach andern unrichtig hundert) Tage und gebiert dann 3 bis 4, auch mehr, ja in seltnern Fällen bis 9 Junge im Dickicht der Wälder, oft in einem erweiterten Dachsbaue, in Schluchten oder Vorsprüngen von Felsen. Das Lager wird auch oft eingegraben, besonders die amerikanischen Wölfe graben sich tiefe Höhlen. Moos, Laub und die eignen Haare bilden das Bett für die Jungen. Diese Jungen haben nur ein röthlichgraues Wollhaar und bleiben 14 Tage blind. Die Mutter liebt sie zärtlich, vertheidigt sie wüthend und verschleppt sie eilig, wenn sie das Lager entdeckt sieht, oder nur Ursache hat, Gefahr fürchten zu müssen. Während der ganzen Zeit des Säugens, welche zwei Monate dauert, versorgt der alte Wolf die Mutter treulich mit Nahrung, an welcher diese auch von der sechsten Woche an die Jungen Antheil nehmen läßt; sie verschlingt nämlich das Fleisch, giebt es halb verdauet wieder von sich und bietet es ihnen in diesem Zustande zur Nahrung. Sie ist in der Säugezeit bösartiger als gewöhnlich. Eine seltene Ausnahme bot eine Wölfin in der Menagerie am Tower in London, dieselbe, welche wir mit ihren Jungen hier abbilden. Sie blieb auch während der Zeit, in welcher sie die Jungen säugte sanft und zahm, obwol der Vater der Jungen ein sehr wilder, bösartiger Wolf war. Wenn wir bei den Katzen gehört haben, daß die säugende Mutter nach Verlust ihrer eigenen Jungen, solche von Thieren anderer Art, ja sogar von solchen, welche ihrem Geschlechte feindlich sind, wie Hunde, oder welche sie selbst feindlich verfolgte, wie Kaninchen und Hasen an sich saugen läßt, um sich der Milch zu entledigen, so ist auch bei andern Raubthieren ein solcher Fall nicht abzuleugnen, im Gegentheil vielfach bewiesen und dadurch auch die Möglichkeit gegeben, daß in der Wildniß ausgesetzte Kinder von einer Wölfin gesäugt werden können, wie uns das alte Wahrzeichen der Stadt Rom in so vielen ihrer classischen Bauwerke, wie in ihren Schriften ihre Historiker uns von Romulus und Remus verkünden. Die jungen Wölfe haben auch unter einander selbst viele Anhänglichkeit, bis das selbstständigere Alter sie trennt und eigennützige Interessen herbeiführt. Dies geschieht im November und December, wo sie allein umherzustreifen beginnen. Man kann die ganz jungen Thiere zähmen, besonders wenn man sie durch eine Hündin säugen läßt. Ihr Leben ist äußerst zähe, sie widerstehen den grausamsten Schlägen und Zusammenschnürungen der Kehle, indem sie nach momentaner Ermattung vom Scheintodte wieder erwachen. Man darf insgemein einem gezähmten Wolfe nicht immer trauen, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat, kehrt bei ihm gemeiniglich, wie bei den Füchsen, die Wildheit zurück.

So hat man Beispiele von Wölfen, welche bis zu einem Alter von ein paar Jahren ganz zahm waren wie ein Hund, mit einem Male indessen wild wurden, alles Hausgeflügel und Hunde, mit denen sie früher in Freundschaft gelebt, todt bissen und selbst Menschen gefährlich wurden. Seltner sind Beispiele solcher Zähmung wie folgende in den großen Menagerien in London und Paris gelungen. Schon im Jahre 1800 hatte man in Paris eine Wölfin, welche, obwol schon erwachsen in Schlingen gefangen, dennoch so zahm wurde, daß sie mit den Hunden in Freundschaft lebte und mit ihnen frei

Digitized by Google

herumlief; sie bewachte wie jene ihren Platz und bellte alles an, was ihr fremd schien. Nur den Apetit nach Geflügel konnte sie nicht aufgeben und mußte deshalb ihrer Freiheit wieder beraubt werden. Eine andere bewies daß die Zähmung noch viel weiter gebracht werden könne, wenn eine gute Behandlung von Jugend auf sie zu leiten versteht und ein Individuum trifft, welches zur Sanftmuth geneigt ist. Sie wurde aufgezogen wie ein Hund, betrug sich freundlich gegen alle Personen, welche sie zu sehen bekam und zeigte vor allen eine treue Anhänglichkeit an ihren Wärter; denn sie folgte ihm wie ein Hund, seine Entfernung machte sie traurig, und seiner Stimme gehorchte sie willig. Sie war ihm so gehorsam, daß sie darin dem allerzahmsten Hunde glich. Als ihr Besitzer Paris verließ, schenkte er sie der königl. Menagerie, hier wurde sie in einen Käfig gesperrt, und blieb deshalb mehrere Wochen lang traurig und wollte nicht fressen; nach und nach gewöhnte sie sich an die neuen Wärter und wurde wieder munter, so daß man glaubte, sie habe ihr früheres Verhältniß vergessen. Nach achtzehn Monaten erhielt sie einen Besuch von dem zurückgekehrten früheren Wärter. Bei dem ersten Worte, welches sie von ihm, ohne ihn sehen zu können, aussprechen hörte, machte sie durch Bewegung und Stimme ihr Wiedererkennen ihrem Freunde deutlich bemerkbar und freigelassen überhäufte sie den alten Freund mit Liebkosungen, wie man dergleichen sonst nur vom treuen Hunde zu sehen gewohnt ist. Die abermalige Entfernung des Wärters, führte eine neue noch tiefere Trauer herbei, die sich erst nach und nach wieder verlor. Es vergingen so drei Jahre, während deren die Wölfin mit einem Hunde in enger Freundschaft lebte, endlich kam der alte Wärter wiederum einmal spät Abends, als der Käfig völlig geschlossen war, in die Nähe der Wölfin und ungesehen ruft er ihr zu. Jenes Schauspiel erneut sich auch jetzt wieder, auch nach dreijähriger Abwesenheit erkennt sie augenblicklich die wohlbekannte Stimme, antwortet ihm zärtlich und strebt darnach ihm sich zu nähern, endlich läßt man die Wölfin heraus, sie stürzt auf den Wärter los, springt an ihm empor und legt ihre Vorderbeine auf seine Schultern, leckt ihm Gesicht und Hände und droht die Zähne fletschend, den andern, wenn sie Miene machen, die Wiedervereinten trennen zu wollen, obwol sie bis dahin auf das freundlichste ihnen zugethan geblieben. Die Trennung, welche nach diesem freudigen Wiedersehen folgte, war mit noch ernsteren Folgen verknüpft als die früheren. Das Thier lag unbeweglich auf einer Stelle, verschmähte alle Nahrung, magerte ab, in Folge dessen wurde der Pelz locker und schlecht, die Haare flockten und sträubten sich, wie bei allen kranken Raubthieren, man fürchtete den nahen Verlust des treuen Geschöpfes. Die vorsichtigste Behandlung führte nach langer Zeit und langsam eine Besserung herbei, der Pelz wurde wieder schön, aber die Wölfin ließ niemals wieder Liebkosungen von ihrem Wärter sich gefallen und Fremden drohte sie mit den gewaltigen Zähnen. Wer möchte bei solchem Beispiele noch zweifeln, daß auch zwischen Mensch und Thier eine Sympathie durch physische und psychische Verhältnisse bedingt, sich unter Leitung einer höheren Allmacht entwickelt? — Doch Vorurtheil, Stolz und Rohheit lassen dies meist nicht erkennen, denn wie selten sind die Gemüther der Menschen für solche Ahnung empfänglich! — Das Wachsthum vollendet sich nach zwei Jahren, sechs bis acht Monate bleiben die Jungen unter dem Schutze der Mutter, welche sich in dieser Zeit ganz ihrer Erziehung und Sicherheit widmet. Der Wolf jagt dann allen Geschöpfen, mit denen er in Berührung kömmt Furcht ein, auch die Hunde sträuben sich gegen ihn und kleinere besonders verkriechen sich ängstlich, oder geben auch während sie

Digitized by Google

ihn anbellen, durch alle ihre Bewegungen und Versuche zur Flucht ihre Todesangst zu erkennen. In Rudeln vereinigt verfolgen sie indessen den Wolf unermüdet. Auch andere Thiere setzen sich gegen ihn gesellschaftlich zur Wehre. Wilde Pferde nehmen ihre Fohlen in die Mitte, treten in einen Kreis mit den Köpfen zusammen, wiehern muthig, sträuben die Mähne und halten durch Ausschlagen mit den Hinterbeinen den Wolf von sich ab. Selbst Schweine üben dies Manöver, nehmen die Schwächern in ihre Mitte, sträuben die Borsten, beginnen ein disharmonisches Angstgeschrei, und bieten die Hauer zum Kampfe. Kräftige Stiere gehen dem Wolfe muthig mit den Hörnern entgegen, auch wilde Eber nehmen ihn an. Der Wolf selbst, zeigt sich äußerst vorsichtig und listig, so daß er nicht selten den augenscheinlichsten Gefahren glücklich entgeht. Unter seinen Listen ist die durch vielfache Beispiele erwiesen, daß er während eines Kampfes mit einem großen Thiere plötzlich zu Wasser geht, seinen Pelz und vorzüglich seinen Schwanz tüchtig benetzt, dann auf das Thier wieder anspringt, sich schüttelt und mit dem Schwanz dasselbe in die Augen schlägt, daß es vor Schrecken stutzt und jetzt ohne Mühe überwältigt wird. Ein im Freien an eine Stange gebundenes Thier soll er nicht angreifen, aus Furcht auf eine Fallgrube zu gerathen. Bei alten, erfahrenen Wölfen wenigstens, ist dieser Grund um so wahrscheinlicher, als diese, überhaupt alles was ihnen irgend Ungewöhnliches aufstößt, vorsichtig beachten, umschleichen und zu vermeiden suchen, daher diese auch nicht leicht in Gruben und Fallen gelangen. In Nordamerika steckt man eine Stange in die Erde und bindet eine Blase daran, dies reicht hin sie von den Büffelheerden abzuschrecken. Sie fliehen jedes ungewohnte Geräusch, entsetzen sich vor dem unerwarteten Muthe der Böcke und Rinder und fliehen vor deren vorgehaltenem Gehörn. Ebenso entfliehen sie den Hunden und vorzüglich dem Menschen, nur ändert sich dies alles, wenn das Thier heißhungrig wird, dann siegt der natürliche Trieb der Erhaltung über die Vorsicht und der heißhungrige Wolf kennt keine Gefahr, im ungleichsten Kampfe setzt er dann das eigne Leben aufs Spiel und opfert seinen Trieben sich selbst.

Ein Wolf, welcher einmal Menschenfleisch genossen, soll dies aller andern Nahrung vorziehen, wie man dies auch von andern Raubthieren erzählt. Wahrscheinlich daher entstand die Sage von Währwölfen, (vor deren man sich wahren, bewahren, hüten soll*), jener Umstand aber erklärt sich vielleicht ebenso, wie wir ihn bei Löwen und Tigern zu erklären versuchten, nämlich durch die durch einmaligen Sieg über den Menschen geminderte Furcht und in Folge des Siegs gewachsene Frechheit. Obwohl das Thier von Natur ungeschickt und furchtsam ist, so sind doch seine Sinne, namentlich Geruch, Gesicht und Gehör sehr scharf und in Gefahr wird der alte Wolf überhaupt muthiger und fällt, gegen seinen Wiederstand mit Wuth aus. Nur in Gruben gefangen oder in Netzen, wenn er die Unmöglichkeit zu entkommen erkannt hat, wird er gänzlich muthlos, kämpft nicht gegen Menschen und Thiere und läßt ohne allen Wiederstand sich anfassen.

Das Alter von 15 — 20 Jahren wird dem Wolfe nicht selten durch Krank-

---

*) Were-wulf, man-wolf. loup-garou, schon bei den Griechen Lykanthropos hieß auch ein Zauberer, welcher durch Einsalbung mit Hexensalbe und durch einen Zaubergürtel sich in den Stand setzte, als Wolf zu erscheinen, Menschen anzufallen und zu tödten, also Wolf-Mensch. In den Niederlanden wurde im Jahre 1589 der letzte Mann dieser Zauberei wegen hingerichtet.

Digitized by Google

heiten verkürzt, denn viele sterben durch Tollheit, deren Natur wir unter dem Artikel „Hundswuth" näher kennen lernen werden, oder gehen an der Räude oder Raude zu Grunde, die wir schon oben als Krankheit der Katzen kennen gelernt haben. Am meisten wird indessen die Zahl der Wölfe durch den Menschen vermindert, da er in Europa das einzige Geschöpf ist, von dem ein günstiger Erfolg in diesem Geschäft erwartet werden kann.

Die Jagd auf den Wolf geschieht mehr zur Abwendung des durch ihn möglichen Schadens, als um des Vortheils willen, den man aus dem Verbrauch einiger seiner Theile zu ziehen vermag. Nur der muthlose Lappländer sieht geduldig zu, wenn der Wolf seine Kinder holt, was nicht selten geschieht, wenn er, im Freien beschäftigt, die kleine Wiege des Säuglings an einer seiner zwergartigen Birken aufhängt. Nach solchem Vorfalle tröstet er sich damit, daß es Gottes Wille gewesen sei, und Kinder und Rennthiere werden ferner von Wölfen gefressen. Anders begegnet den Wölfen der kräftige Schwede, Russe und Pohle und am meisten setzt der Wolf da in Bewegung, wo er sich am seltensten zeigt. Er ist Gegenstand der hohen, in einigen Gegenden auch nur der mittleren Jagd, seiner Schädlichkeit wegen gestattet man indessen auch jedem nur zur niedern Jagd Berechtigten, ihn zu erlegen und gegen billiges Schußgeld auszuliefern. Die Kirgisen sollen den Wolf mit Adlern oder Falken baizen, welche sie Berkut nennen. Wo die Wölfe häufig sind, bedient man sich auch andrer Tödtungsmittel, man bestreicht Butterbrot mit Sublimat, oder man bereitet Würste aus Milch und Fleisch mit sogenannten Krähenaugen oder Brechnuß (nux vomica), welche man gröblich zerstoßen, anstatt der Würze dazu mischt. Man wickelt diese Würste in die Haut eines Schaafes, oder einer Ziege, läßt sie etwas gähren oder in Butter braten und gräbt sie auf dem Wechsel ein. Man kann auch ein frisch gestorbenes Thier nehmen und die pulverisirten Krähenaugen in gemachte Wunden einstreuen, dann die Haut wieder über das Fleisch ziehen und zunähen. Man vergräbt es noch 24 Stunden lang unter Pferdemist, oder wirft es dann frei hin, oder bedeckt es leicht mit Erde, um im Sommer die Fliegen abhalten zu können. Die Tschuktschen pflegen spitzige Riemen spiralförmig zusammenzurollen, mit Eis und außen mit Butter umhüllt auf einem Pfahle auszusetzen. In den Magen gebracht rollen diese Riemen sich auf und durchbohren, indem sie auseinandergehen und anschwellen, den Magen nach allen Seiten, wobei sie viel Schmerzen verursachen, so daß das Thier nicht fliehen kann. Die Kosaken in Kamtschatka hängen auch eiserne Haken mit Fleisch um die Häuser herum in der Höhe auf, die Wölfe springen darnach und bleiben hängen wie der Fisch an der Angel. Wolfsgruben werden so gegraben, daß sie unten weiter sind als oben, 16 Fuß tief, 12 Fuß lang und breit. Man bedeckt sie mit Reißholz und bindet auf dieses eine Ente, ein Schaaf oder ein Schwein. Das ganze umgiebt man mit einem ein paar Fuß hohen Zaune, über den der Wolf springt. Die Eskimo's hauen ähnliche Gruben in Eis, oben mit einer Fallthür aus Eis mit einer Leine und einem Zapfen von Eis, woran der Köder befestigt ist. Auch in den cultivirten deutschen Ländern, in denen es längst keine Wölfe mehr giebt, müssen des Jagdrechts wegen noch Wolfsgruben gehalten werden.

Die Spur des Wolfs ist der des großen dänischen Hundes ähnlich, doch mehr lang als breit. Die Jäger erzählen sich, daß da, wo mehrere Wölfe beisammen sind, die hintern in die Fußtapfen der vordern hineintreten, um ihre Zahl nicht zu verrathen, was ihnen auszuführen wohl schwer werden dürfte. Um den Wolf zu vertreiben, wenn

Digitized by Google

man seine Spur erkannt hat, bedient man sich der Trommeln und Trompeten, des Kettenrasselns an Wagen, des Schießens und vorzüglich offner Feuer. Doch reicht dies alles nicht in jedem Falle aus, um zu verhindern, daß er sich heranschleicht und die Heerden beraubt. Derselben Mittel bedient man sich bei Anstellung einer Treibjagd, der gewöhnlichsten Weise, wie man ihm beizukommen sucht. Dabei thut der Mensch das meiste, denn nur die besten Hunde gehen auf den Wolf, wenn sie gehetzt werden, auch Pferde bäumen sich und sträuben die Mähne, sobald er sich ihnen entgegenstellt. Man erlegt ihn auch aus der Schießhütte, oder durch Rätzen oder Reizen bei Nachahmung seiner Stimme, oder endlich man fängt ihn, wenigstens jüngere, unerfahrnere Thiere im Wolfseisen, starken Tellereisen oder Schwanenhalse, (großen Berliner Eisen) mit reinem Gänsefett und ein wenig Kampfer verwittert. Hat er sich einen Raub geholt, so lasse man ihn in Ruhe fressen, nachdem er sich tüchtig sattgefressen hat, legt er sich schlafen, und folgt man der Spur, so läßt er sich in diesem Zustande mit Keulen todtschlagen; erfahrne Landleute ziehen auf solche Jagd mit Dreschflegeln und Heugabeln aus und nähern sich vorsichtig dem schlafenden Räuber, den geschickte Wolfsfänger dann sogar wagen am Schwanze zu fassen und nun tüchtig auf ihn losschlagen. Um die Treibjagd vorzubereiten, theilt man die Waldung in Quadrate ab, die durch Wege abgesondert werden. Jedesmal nach frischem Schnee umreitet man bei Anbruch des Morgens die Vierecke, zählt die Wolfsfährten genau, um zu erfahren, wie viele Wölfe darin sind. Jetzt werden drei Seiten mit Schützen und die vierte Seite mit Treibern besetzt, auch diese mit Knütteln und Keulen bewaffnet. Achtet man richtig auf den Wind, so entgehen die Wölfe nicht leicht, am sichersten führt eine Umstellung mit dem Wolfszeug, mit Tüchern und Netzen zum Zwecke. Um einen Wolfsgarten zu bilden, wird ein Dickicht von etwa acht hundert Schritten im Umfang fest umzäumt, südlich bleibt ein Eingang, daran zu jeder Seite eine Säule mit einem Haken gestellt wird. In der Mitte wird ein Platz frei gemacht, auf den man abgestandene Thiere wirft, in der Nähe bringt man im Dickicht ein Wachhüttchen an, welches mit Reisig bedeckt wird. Nahe bei dem Eingange in die Umzäumung wird eine zweite Hütte gebaut, in ihr die Netze, Tuchlappen und Gabeln aufbewahrt, sie steht mit der ersteren durch einen Drath in Verbindung, welcher in ihr zu einer Klingel führt. Sobald man beobachtet hat, daß Wölfe den Platz besuchen, so geht ein Jäger vor Sonnenuntergang in die Hütte der Mitte; zwei andere Jäger in die am Eingang, wo sie ruhig die Nacht erwarten. Sobald sich Wölfe am Köder eingefunden haben, wird das Zeichen sanft mit der Klingel gegeben, jene am Eingange stecken eilig die Gabeln und hängen das Zeug auf, um den Platz zu schließen, in welchem dann am folgenden Morgen die eingeschlossnen Wölfe erschossen werden. Man setzt auch Schußhütten auf Bäume, oder in das Dickicht, oder macht sich Wachgruben an Abhängen, von wo aus man ihn am hingeworfenen Köder in mondhellen Nächten erschießt.

Der Nutzen des Wolfs war in der großen Oekonomie der Natur wohl bedeutender als wir ihn ahnen. Alle große Raubthiere, vorzüglich die Aasfressenden mußten in wenig bewohnten Gegenden Dienste verrichten, welche wir in sehr cultivirten Districten durch Menschen ausüben sehen. Sie waren die Bewahrer des Gleichgewichts in der Schöpfung, die Wächter über Reinlichkeit und Ordnung. Eine ungehemmte Vermehrung pflanzenfressender Thiere würde die wasserreichen, für den Menschen geeignetsten Plätze entlaubt und abgegrasset, diese Thiere würden sie aller Vegetation beraubt

Digitized by Google

und unbewohnbar gemacht haben. Die kräftigen Raubthiere wurden vom Schöpfer bestellt, deren Vermehrung zu Zügeln, die Plätze dem Menschen zu bewahren, bis dieser kräftig genug das Gleichgewicht selbst zu erhalten, solcher Wächter nicht mehr bedurfte. So waltet aber die Schöpfung in der ganzen Natur, immer nur erblüht der Seegen aus der Berührung wiederstrebender Kräfte und deren Gegenstreben selbst rufte oft nur die Nothwendigkeit, ja das Werk des Augenblicks hervor. Büffon's, theils auf einseitigen Nachrichten, theils auf Vorurtheil und einem Streben, durch seine Phantasie zu imponiren, beruhende Schilderungen vom Charakter seiner Thiere, sind durch beßre Beobachtung der spätern Zeit wiederlegt worden. Kein Geschöpf ist bös geschaffen, in allen schlummert der Keim des Guten und nur von den Umständen hängt es ab, ob er zum Guten erblüht, oder ob die gute Saat zum Bösen emporwächst. Im Allgemeinen kann man leicht beobachten, daß große Raubthiere leichter zu zähmen sind als kleine. Jene besitzen, so wie ihnen mehr Kraft zur Ausübung dessen, was uns böse scheint, inwohnt, ebenso auch mehr Empfänglichkeit für das Gute. Jene Beispiele der Wölfinnen in London und in Paris lassen auch hier die Möglichkeit einer Angewöhnung des als blutdürstig bekannten Thieres an den Menschen erkennen. Was Wunder, wenn eine Art von Geschöpfen durch die Generationen mehrer Jahrhunderte hindurch vom Menschen mit List und Gewalt auf alle nur denkliche Weise verfolgt und auf das Grausamste gepeinigt, mit Abscheu gegen den Menschen erfüllt wird, was Wunder, wenn dieser Haß, von Generation zu Generation forterbend, im Bestreben nach Selbsterhaltung sich vermehrt hat? Wie zarter Empfindung aber dergleichen Geschöpfe fähig sind, zeigt das Beispiel der pariser Wölfin und wer würde im Stande seyn, zu wiederlegen, wenn jemand behauptete, auch der Wolf besäße eine Erziehungsfähigkeit, durch welche eine bedeutende Milderung seines Charakters erlaubt wäre. Jene treue Anhänglichkeit an den liebevollen Wärter der zartesten Jugend deutet gewiß auf die Möglichkeit einer Entwicklung edler Gefühle, und wie weit eine sanfte Behandlung mit imponirender Auctorität in Verbindung ein Raubthier zu zähmen vermöchte, wenn sie allen und jeden Ausbrüchen von Wildheit und Hungerqual zuvorkäme, diese dem Thiere wie seine Kraftfülle unbekannt bliebe, dies zu erforschen, würde eine schöne Aufgabe für den seyn, welcher mit dem Studium der Seele des Thieres beschäftigt, diese mit der Seele des Menschen vergleicht. Ist doch auch für glückliche Erziehung des Menschen der Mittel höchstes nur die stete Gewöhnung zum Guten, denn wo die Entwicklungsfähigkeit zu Allem gegeben ist, da hängt auch alles Resultat von der Art und Leitung der Entwicklung ab, und das einmal erwachte Bewußtseyn der Kraft zum Zerstören gebiert schnell den Willen dazu! —

Kaum die Tunguſen und die ärmsten Lappländer essen das widerlich schmeckende Wolfsfleisch, auch die Hunde fressen es nicht. Den meisten Theilen des Wolfs schrieb man in der Vorzeit Arzneikräfte zu und der Aberglaube der Jäger ist hier und da von jenen Vorurtheilen noch nicht befreit. Das Fett wird wie Talg benutzt. Die großen Eckzähne faßt man mit ihrer Wurzel in Metall und setzt sie auf Handgriffe, so werden sie zum Poliren, auch zum Daraufbeißen bei dem Zahnen der Kinder gebraucht. Der Wolfspelz wird zu Wildschuren vernäht, zu Muffen, Fußsäcken und Pferdedecken verarbeitet. Er soll kein Ungeziefer annehmen und gehört unter die dichten und warmen, obwohl gröbern Pelzwerke. Der Handel damit wird von Seiten Polens und Rußlands, so wie von Nordamerika aus mit Europa und Asien betrieben. Die Canadische Pelzhandelgesellschaft führte im Jahre 1798 allein 3800 Wolfspelze

Digitized by Google

nach England. Bei den Chinesen finden diese Pelze großen Absatz, vorzüglich hoch achten diese die Fellchen der ungebohrenen, oder neugebohrnen Wölfe. Kamtschadalen und einige andere nordische Völker kleiden sich vorzugsweise in Wolfspelz. Das Leder wird weiß oder sämisch gekerbt und dann verarbeitet. Im Orient hat man auch Wölfe zu Kampfspielen und Künsten, einer Art von Tanz und Springen abgerichtet. Als Bild der rohen Kraft und Wildheit wurde der Wolf auch das auszeichnende Symbol bei den Menschen, sein Name wurde auf sie übergetragen und die Könige und Ritter der Angelsachsen führten ihn auch wohl noch mit Beisätzen, wie: Aethelwulf (Edelwolf), Berthwulf (erlauchter Wolf), Eadwulf (glücklicher Wolf), Ealdwulf (alter Wolf); so hoch achtete man das kräftige Thier!

Der Schaden des Wolfs wird in cultivirten Gegenden bedeutend. Obwohl er sich gern mit Aas begnügt, so findet er dessen an dergleichen Orten um so weniger, als nicht einmal daran gedacht wird, ihn auf diese Weise zu sättigen und von dem lebenden Hausthiere abzuhalten. Unter solchen Verhältnissen raubt er furchtbar und würgt, wenn ihm einmal die Gelegenheit sich darbietet, so viel, daß er auf Vorrath für ungünstigere Zeiten zu denken scheint. Nach officiellen Nachrichten wurden im Gouvernement Liefland in dem einzigen Jahre 1823 folgende Thiere gefressen: 1841 Pferde, 1807 Rinder, 733 Kälber, 15,182 Schaafe, 726 Lämmer, 2545 Ziegen, 183 Zicklein, 4190 Schweine, 312 Spanferkel, 703 Hunde, 673 Gänse, 1243 Stück anderes Geflügel. Menschen fällt er im Heißhunger häufig an, zerfleischt ihnen Gesicht und Brust und der Tod an den schweren Wunden ist auch das gewöhnliche Schicksal derer, welche der Zufall noch rettet. Gewöhnlich überwältigt der kräftige Wolf den schwächern Menschen und genießt ihn als errungene Beute. Wenn der Mensch mit Thieren beisammen ist, so macht der Wolf in der Regel nur Jagd auf eins dieser Thiere und schleppt dies eilig fort, setzt sich indessen der Mensch zur Wehre, so setzt er sich auch der Gefahr aus, daß der Wolf das Thier losläßt und seinen Anfall auf den Menschen selbst richtet. Aus diesen Gründen ist die Vertilgung der Wölfe in allen cultivirten Staaten eifrig betrieben und durch Prämien unterstützt worden, die durch ihre Seegrenze hierin begünstigten Engländer, haben sich längst von dieser Plage befreit und in Deutschland, wie wir wissen, sind die Wölfe nur noch als Seltenheit und kommen als Einwanderer über die Grenzen, so daß eine gänzliche Vertilgung hier nicht so leicht sein kann, als auf einem Inselande wirklich der Fall war.

Die Sorge war auch in England in der Vorzeit so groß, daß man den Januar wegen der häufigen Erscheinung der Wölfe den Wolfsmonat nannte. König Edgar im zehnten Jahrhundert hatte um die Befreiung von diesen Raubthieren das größte Verdienst. Er betrieb diese so wohlmeinend, daß er sogar den Tribut, den die Walliser ihm zahlen sollten, in dreihundert Wolfsköpfe umwandelte. Im dreizehnten Jahrhundert unter Edward I. scheinen sie zum letztenmale sich wieder vermehrt zu haben.

Von den Bastarden zwischen Wölfen und Hunden wird in der Naturgeschichte der Letzteren nochmals die Rede seyn.

Daß unsre Abbildungen jene oben erwähnte Wölfin darstellen, welche ihre Jungen in der Menagerie am Tower in London gebar, ist schon erwähnt worden; den erwähnten alten Wolf sieht man ihr zur Seite springend dargestellt. Es dürfte schwer seyn, den Character der alten sowohl als der jungen Wölfe, lebendiger auszudrücken, als hier unser trefflicher Künstler gethan hat.

Digitized by Google

Nachdem wir die Thiere des Hundegeschlechts S. 83. in die drei Hauptabtheilungen der Füchse (mit Katzenaugen und Standare) der Schakals und Wölfe (mit runder Pupille und Hängeschwanz) und in eigentliche Hunde (mit runder Pupille und aufwärts gekrümmter Ruthe oder Fahne) getheilt haben, so folgt jetzt die dritte Abtheilung:

c. Hunde.

110. — 249 *). Der Hund. Canis familiaris Linn.

Männchen: Hund, Rätte, Weibchen: Hündin, oberſächſiſch: Petze, Betze, Tere, in der Jägerſprache: Fähe; Niederſächſiſch: Teve, Tieve, Tiffe, Thöle, Zippe, Luppe. Hanöveriſch: Tache; zur Zeit Carls des Großen: Zoba; alt oberdeutſch: Zauche, Zaucke, Zache; oberdeutſch: Brücke, Metze, Mätze, Zaupe, Zeupe, Zaubel, Luſch; würtembergiſch: Zatze; ſchleſiſch: Lutſche: liefländiſch: Tauſch. — Junge Hunde: Hündchen, bei den Jägern: Wölfe. — Griech. ὁ und ἡ κύων, κυνός. — Neugriech.: σκύλος. — Altlateiniſch: Canis masc. et fem. apud poetas oo). Catula Aur. Vict. epit. 33. Hündin, catuli, catelli, caniculae: kleine oder junge Hunde. — Franz.: le chien. — Engl.: the dog. — Ital.: il cane. — Schwed. und Däniſch: Hund. — Holländ.: hond. — Portugieſ.: Cam. — Spaniſch: Perro. — Ruſſiſch: Sobaka. — Slavoniſch, Polniſch: pess, ♀ Ssuka. — Tatariſch: Yt oder Yt, ♀ Kantscheck; in der Krimm auch Topek. — Tſchuwaſchiſch: Iida oder Ijida. — Mongoliſch: Nochöi, Tunguſiſch: Nynokin. — Samojediſch am Ob: Uen oder Wyu, auch Jandu; an der Petſchora: Uenoekoe; Juräkiſch: Wéneku; Mangaſeaniſch: Bynike und Bynö; Tawginziſch: Hgandäe oder Buang; Tomskiſch: Kanang; am Nary: Känak; bei dem Bergherrnohnern: Byn: Kamaſchiſch: Men; Koibaliſch: Maeng. — Permienſiſch: Pon; Mordwaniſch: Pinae; Votjätiſch: Punno; Tſcheremiſſiſch: Pi; Wogouliſch: Aemb; Oſtjäkiſch: Amp. — Arinziſch und Kotowziſch: Ilſchap; Pumpokobienziſch: Tzi; Inbatkienziſch: Tip; Aſſaniſch: Altschip; Jukagiriſch: Tabaka; Aleutiſch: Aiukuk; Kanagiriſch auf der Inſel Kadiak: Piuchta; Tſchuktſchiſch: Hiltén: Kuriliſch: Schtäpo. — Tangutiſch: Tschi; Ziganiſch: Dshukell. — Sineſiſch: Gkheu; Japaniſch: Inu. — Armeniſch: Worzschun, ♀ Katzschun. — Kamtſchadaliſch: Koshä; Koräkiſch: Hataau. — Tſchuktſchiſche Nomaden: Haetten; anſäſſige: Kyknyk. — Aſiat. Samojed.: Kanang. — Wuanannech Nation in Canada: Mekanne. — Ein vollſtändigeres Verzeichniß ſoll mit dem Regiſter folgen.

Kennzeichen der Art; Schwanz (Ruthe) aufwärtsgekrümmt.

Beſchreibung. Wenn wir die Naturgeſchichte des Hundes beginnen, ſo befinden wir uns wieder in demſelben Falle, welcher überhaupt bei Betrachtnng der gezähmten Thiere uns vorkommt, nur tritt bei einem Ueberblicke über die Racen der Hunde noch in höherem Grade, als bei andern Thieren, die Mannigfaltigkeit in den Formen und Characteren hervor, welche es ſchwer macht dieſe ſyſtematiſch zu vereinen und ihren Urſprung zu erklären. Wir würden verſucht werden, die ſo augenfällig abweichenden Geſtaltungen als die Typen verſchiedener Arten zu ſondern, ſähen wir ſie nicht alle durch ſo ſanfte Uebergänge verknüpft, daß uns die Grenze für die Sonderung verläßt. Nur das einzige oben angegebene Kennzeichen leitet uns ziemlich ſicher in der Vereinigung der vielgeſtaltigen Racen und was noch im Allgemeinen vom Hunde zu ſagen iſt, wollen wir vorausſenden, bevor wir die Betrachtung der einzelnen Racen verfolgen.

Die verſchiedene Größe und Geſtaltung iſt das Erſte, was uns bei einem Ueberblick über die verſchiedenen Racen der Hunde auffallen muß. Von der geringen Größe des Kaninchen bis zu der des Wolfs und der Löwin ſehen wir die Dimenſio-

*) Und noch einige nachträgliche Abbildungen: 555 — 599, zuſammen alſo 146 Hunde

**) Die Dichter brauchen das Wort Canis weiblich, ſobald von der Jagd die Rede iſt. Vergl. Heinsius ad Ovid. metamorph. III. 140.

Digitized by Google

nen des Körpers sich entfalten und eigenthümliche Racen-Verhältnisse im Ebenmaße der Glieder zum Rumpf begleiten diese Progressionen der Entwicklung. Zuerst finden wir diese Abweichung der Verhältnisse am Kopfe. Man vergleiche diesen von vorn oder im Profil, so wird man sich nicht enthalten können, lange Reihen physiognomischer Bilder aufzufassen, und zu bewundern, wie diese an ihren Extremen so fremdartig geworden, während sie in ihrer innern Gliederung in sanften Uebergängen verschmelzen. Den länglich gebauten Kopf trägt der Hund horizontal vorgestreckt, oder wenig geneigt, der Scheitel fällt nach vorn ab und über seine Mittellinie zieht sich bei den größten ein Kamm oder eine Leiste, welche hinten sich theilend, beiderseits quer herabläuft. Nach vorn verdünnt sich der Kopf in die Schnautze, und sie beträgt fast die Hälfte des Kopfs; ihre Spitze ist meist ein wenig weiter von den Augen entfernt, als die Ohren. Die Augen stehen in etwas schiefer Richtung und sind mit einer kleinen Nickhaut versehen, von den Augenliedern führt nur das obere Wimpern, als eine Reihe mehr oder weniger dichtstehender Borsten. Der Stern oder die Iris im Auge ist vom Graulichen in verschiedene Nüancen überspielend, die Pupille schwarz und allezeit kreisrund. Die Nase wird am Ende des Oberkieferrückens sichtbar und bildet die obere Spitze der Schnautze, über die Spitze des Unterkiefers ragt sie etwas vor, sie hat ein chagrinartiges Ansehn, ist leicht beweglich, bei gesunden Hunden immer feucht und kalt. Die Haut, in welcher die Geruchsnerven sich ausbreiten ist dicht zusammengefaltet, sie bietet also der Atmosphäre eine bedeutende Fläche, und gänzlich entfaltet könnte man fast den ganzen Leib des Hundes damit überdecken. Die runden Nasenlöcher gehen nach unten und aussen in einen halbmondförmigen Einschnitt über, welcher sich nach hinten von unten nach oben heraufbeugt. Auf der Nasenscheidewand beginnt die Furche, welche sich in die Theilung der Oberlippe fortsetzt. Der Gaumen hat gewöhnlich 9 Querfalten. Die Oeffnung der Schnautze, das Maul oder der Rachen hat bei den verschiedenen Racen verschiedne Länge, und verläuft ziemlich horizontal. Die Oberlippe bedeckt beiderseits die Unterlippe, deren nackter Rand gezähnelt ist, das heißt wie ein Hahnenkamm in zahnartige Spitzen mehr oder weniger deutlich eingeschnitten erscheint. Das Gebiß besteht aus 40 — 42 Zähnen. In jeder Kinnlade befinden sich 6 Vorderzähne, (also zusammen 12), sie haben eine senkrechte Stellung, die äußersten im Oberkiefer schließen sich nicht dicht an die übrigen an, die äußern oder alle im Unterkiefer führen an der äußern Seite einen Spitzhöcker, die mittelsten sind die kleinsten. Die einzelnen Eckzähne oder Spitzzähne (mit obigen zusammen also: 16), sind kegelförmig, ein wenig gekrümmt, stecken tiefer mit der Wurzel und ragen auch höher mit der Spitze empor als die andern; im Oberkiefer sind sie mehr von ihren Nachbarn entfernt, die untern stehen den Vorderzähnen mehr in der Nähe. Backenzähne sind im Oberkiefer jederseits 6, in der Unterkinnlade jederseits 6 — 7, also zusammen mit obigen: 42; die vordern sind dreieckig, schmal und einspitzig, die hintersten breit und mehrspitzig. Die Zunge ist glatt, ziemlich flach und sehr lang streckbar, sie ist mit deutlichen Nervenwärzchen besetzt und mit einer Längsfurche bezeichnet welche die Richtung angiebt in welcher sie sich einziehen und hohl machen, dabei nach vorn umkrümmen kann um bei dem Lecken des Wassers als Löffel zu dienen. Einige nennen den in jener Linie hinlaufenden Muskel, weil er sich nach dem Ausschneiden, wenn man ihn in das Wasser wirft, zusammenkrümmt: den Wurm, andere verstehen unter diesem Namen die Speicheldrüse unter

Digitized by Google

der Zunge*). Die äußerlich sichtbaren Ohren (Ohrmuscheln) sind länglich gestaltet und stehen schief querüber, der Innenrand mehr nach vorn ist umgeschlagen, der Außenrand mehr nach hinten ist durch eine Einfaltung doppelt, die Ohrmuschel ist überhaupt von der Basis an verschmälert, aufrecht stehend und ziemlich spitzig zulaufend, oder sie ist an der Spitze nach außen umgebogen oder sogleich vom Ursprunge an überhängend, in diesem Falle meist am breitesten und längsten. Aber von der Länge des Profils und der Höhe und Richtung der Gesichtslinie, der Verflachung der Stirn bis zu deren erhobener Wölbung, von der verlängerten Schmalform des Antlitzes bis zu der Breite, welche die Augen weiter von einander entfernt, von den fast ebenen Backen bis zu dem grellen Hervortreten der Jochbögen finden sich viele Uebergänge und hervorstechende Extreme. So groß aber auch alle diese Abweichungen von außen erscheinen, so finden sie doch ihre Erklärung nur bei Betrachtung des Innern; denn das Gehirn ist eigentlich der Körper durch welchem die Bildung des Schädels bedingt wird, nach ihm gestaltet sich jene Länge und Breite, und nur seiner Entwicklung folgt jene Flachheit oder Wölbung, die wir bei der äußern Anschauung wahrnehmen können.

Eben so groß als die Verschiedenheit des Kopfes ist auch die nur weniger lebendig und physiognomisch uns ansprechende Verschiedenheit im Baue des Rumpfes. Der Rumpf ist vorn durch den Brustkasten verdickt und läuft unter die Rippen hin schmächtiger zu. Das Weibchen trägt in der Regel zehn Zitzen oder Saugwarzen, deren 4 an der Brust und 6 am Bauche; bisweilen fehlt eine derselben. Von den Beinen sind die vordern mit 5, die hintern mit 4 Zehen versehen. Diese Zehen sind zu vieren durch eine verbindende Haut bis an das letzte Glied vereinigt. Die fünfte Zehe an den Vorderbeinen steht höher und ist nicht mit den übrigen vereinigt. Von einer fünften Zehe an den Hinterbeinen findet sich nur bei einigen Racen eine Spur, welche gewöhnlich im bloßen Nagel besteht oder im Innern auch Zehenglieder erhält, welche nur in der Haut hängen und nicht von Mittelknochen unterstützt sind. Auch die Zehe der Vorderbeine ist meist nur eine so gebaute Scheinzehe. Die beiden mittlern Zehen sind am längsten und gleichlang, ihre Nägel neigen sich zusammen, die beiden Seitenzehen kürzer, auch ziemlich von gleicher Länge. Die Nägel sind sämmtlich etwas gekrümmt, keiner eignen Bewegung fähig und abgestumpft.

Der Schwanz ist als unmittelbare Verlängerung und als Anhang der Rückenwirbelsäule auch bei dem Hunde als ein überzähliges Bewegungsglied zu betrachten, dessen er sich ebenso wie einige andere Säugthiere zum Abwehren lästiger Insecten, sonst aber auch durch fast unwillkührliche Bewegungen zum Ausdrücken seiner Affecte bedient. Die Wirbel, welche der Ruthe des Schwanzes zur Unterlage dienen, finden sich meist in der Zahl von 18 bis 19, doch auch auf 15 vermindert oder auf 21 erhöhet. Diese Zahlenverhältnisse ändern sich ohne für einzelne Racen bestimmt zu seyn und ohne daß die Höhe der Zahl mit der Größe der Individuen in gleiches Verhältniß gesetzt ist. Verstümmelte Schwänze werden besonders bei einer Hühnerhunderace erblich. Die zahlreichen Muskelbündelchen, welche sich rund um die Wirbel herum mit ihren Sehnen an diese ansetzen, sind in so fern verschieden, als die oberen d. h. über die Rückenseite des Schwanzes hinlaufenden kürzer sind als die unteren, deshalb oberseits denselben mehr

*) Der Aberglaube hegte die grausame Operation, diesen oder jenen Theil herauszuschneiden, in dem Wahne, dadurch die Hundswuth zu verhüten. Mehreres darüber bei Betrachtung dieser Krankheit.

Digitized by Google

zusammenziehen als unten, daher erklärt sich die eigenthümliche Beugung des Schwanzes, mit der Spitze aufwärts gerichtet. Diese Beugung durchläuft bei den Racen die verschiedenen Grade vom sanften, noch dem geradlinigen nahe stehenden Bogen, durch die Krümmung des Halbkreises bis zur Spirallinie, deren Ende wieder innerhalb des äußeren größeren Bogen seinen Ruhepunkt findet.

Ueber die Bekleidung oder Behaarung der Hunde im Allgemeinen nur Folgendes. Sie besteht aus Borsten, Haaren oder Wolle. Erstere finden ihren Platz theils auf sieben Warzen im Gesicht, theils als Bart an den Lippen und als Wimpern am obern Augenliede, die Haare bedecken die übrigen Theile des Körpers mit Ausnahme der Nase, Maulränder und Fußballen. Von den Gesichtswarzen steht eine über jedem innern Augenwinkel: 2; eine auf jedem Backen: 4; eine jederseits hinter dem Maulwinkel: 6, und eine einzelne unter der Kehle: 7; jede Warze trägt zwei bis vier ziemlich lange Borsten. Die eigentlichen Schnurren oder Bartborsten stehen in 5 bis 6 um das Ende des Oberkiefers, jederseits von der Nase aus horizontal verlaufenden Reihen, auf kleineren Wärzchen; in der Mehrzahl ferner am Kinne selbst. Diese Schnurren sind aber nicht von der Länge, wie die bei den katzenähnlichen Thieren. Die Behaarung des übrigen Körpers durchläuft von der Nacktheit, welche nur durch einzelne, entfernt stehende Haare unterbrochen wird, dann vom glatten, einfachen (nicht mit Wollhaar unterlegten) dicht anliegendem Haar, durch längere, schlaffe, seidenartig herabhängende oder gröblich zottige, endlich zur krausen und wollig schnurartig gedrehten Bedeckung alle nur denkbare Stufen. Hiernach ändert sich auch die Bedeckung des Schwanzes; bald erscheint er als fast kahle, oder mit sehr kurzen Haaren bekleidete Ruthe, bald als Fahne, mit langen Haaren besetzt, welche von beiden Seiten mähnenartig herabhängend, vom Winde fliegend bewegt werden, bald endlich bei krausem schnurartig gedrehetem Wollhaar rund herum strotzend, als Quaste. Die Behaarung ist im Allgemeinen bei den glatthaarigen Racen an der Schnautze, überhaupt am Kopfe, an Brust und Bauch und an den Beinen kürzer, über den Rücken hin gröber und bei sonst heller Färbung daselbst oft dunkler; bei den zottigen und wolligen Racen bleibt gewöhnlich nur der Nasenrücken und die Pfoten kurzhaarig, bei andern gleicht auch an diesen Stellen die Bedeckung derjenigen der übrigen Theile. An der Ohrmuschel ist die Behaarung auf der äußern Seite ziemlich gleichförmig, auf der innern nur am Rande sichtbar, nach der Mitte hin sich gänzlich verlierend. Man bemerkt im Haarkleide der Hunde funfzehn natürliche Näthe, welche sich durch die auf ihnen sichtbare Zusammenneigung der entgegenstehenden Haare leicht auffinden lassen. Die erste Nath entspringt jederseits hinter dem äußern Augenwinkel und verläuft gegen das Ohr: 2; eine andre geht beiderseits kreisförmig um das Ohr herum: 4; eine steigt jederseits vom Ohre an in Beugungen am Halse herab bis zum obern Ansatz des Brustbeins: 6; daselbst verbinden sich beide, eine neue entspringt von dieser Verbindung und läuft über das Brustbein abwärts 7; bis zu dessen unterster Spitze ist eine jederseits am Bauche zwischen dem Nabel und den Weichen: 9; eine jederseits quer am After: 11; eine hinten an jedem der vier Beine bis zur Ferse herab steigend: 15. Bei den kurzhaarigen Hunden findet man diese Näthe am deutlichsten, bei den langhärigen sind sie nur mit einiger Mühe zu erkennen. Wenn wir gehört haben, daß die Neigung zum Abändern bei den Hunden sich durch eine große Mannigfaltigkeit von Racen zu erkennen giebt, so fällt uns um so weniger auf, wenn an diesen Veränderungen das Haar einen vorzüglichen Antheil nimmt, da die Behaarung

Digitized by Google

gleichsam als eine Vegetation auf dem Thierkörper zu betrachten ist, und die Vegetation, wie wir wissen, von den äußern Verhältnissen sehr abhängig ist. Bei dem viel unter freiem Himmel lebenden, rauher Witterung ausgesetzten Hunde ist das Haar grob, im Norden dabei dicht, bei dem mehr unter dem Schutze der menschlichen Wohnung gepflegten erscheint das Haar kurz, oder wenn es lang ist, hat es eine größre Feinheit; bei den Wasserhunden ist es zottig oder kraus und in sehr mildem Clima wandelt sich dies in feines gedrehetes Wollhaar um. Die Bedingungen zur Umbildung des Haares sind noch nicht gehörig zu erforschen gewesen und ihre gesammte Erscheinung an einem Individuo wird bereits vor der Geburt bedingt. Die Umbildung des Haares im Großen, die Entstehung der verschiedenen Grade von Länge und Dicke, von Straffheit oder Schlaffheit, endlich von der eigenthümlichen Schlängelung und dem Zusammenhang des feinen Wollhaares will noch näher untersucht seyn. Was man bis jetzt im allgemeinen darüber sagen kann, findet sich in dem höchst schätzbaren Werke: Eble: die Lehre von den Haaren. Wien 1831.

Die Farbe der Hunde ist so veränderlich, daß wir von Schwarz durch Grau in Weiß, oder von Schwarz in Braun, Fuchsroth und Isabellgelb alle Nüancen antreffen und alle diese Farben durch einander auch gefleckt vorkommen sehen, am häufigsten dann deren zwei, selten drei. Vergleichen wir aufmerksam die Farben der Hunde, so erfahren wir daß eine einzige regelmäßige Zeichnung und Färbung bei Individuen von allen Hauptracen wieder vorkömmt, nämlich die, unter welcher am häufigsten der Dachshund und Hirtenhund auftritt: oberseits schwarz, unterseits nebst Schnauze und einem rundlichen Flecke über dem innern Augenwinkel rostfarbig.

Vaterland und Abänderungen. Wenn wir die Veränderlichkeit der Hunde in der Gestaltung und Größe, die in der Bekleidung und Färbung, welche unsre Beschreibung berührte, weiter ins Einzelne verfolgen, wenn wir auch ferner in der Schilderung der Lebensweise und des Characters dieser Geschöpfe noch finden werden, wie abweichend auch in dieser Beziehung das Wesen der Hunde sich ausspricht, so muß uns solche Erscheinung bald zu der Frage führen: Dürfen wir wohl unter solcher Mannigfaltigkeit ein einzelnes Urthier, ein Vorbild, oder müssen wir mehrere Vorbilder für alle diese wechselnden Formen vermuthen? und wenn eins von beiden als Vermuthung sich uns aufdringt, so fragt sich weiter: wie sollen wir zu Werke gehen, um jenes Vorbild oder jene Vorbilder zu suchen, auf welchem Wege dürfen wir hoffen, dieselben zu finden? Beide Fragen haben vielleicht seit Jahrtausenden die denkende Menschheit beschäftigt, die Lösung beider dürfte aber für immer nur in der Annäherung an die Wahrheit, in Auffindung einiger Wahrscheinlichkeit ihr Ziel finden. Die älteste Menschheit kannte den Hund, aber erst die jüngste wurde durch den unsterblichen Linnée in den Stand gesetzt, einen Naturkörper so genau zu beachten und zu beschreiben, daß ein sicheres Wiedererkennen durch Andere in seiner Sprache Geweihete, möglich und leicht wird; die reichen Bilderwerke welche wir in der Antike bewundern, entfalteten sich meist zu einer Zeit, wo die Cultur des Menschen ihre Blüthe erreicht hatte, auch der Hund war mit ihr fortgebildet, also doch schon in einige Formen auseinandergegangen und die Dichter besangen seinen Muth wie seine Treue, aber alle seine Formen zu beschreiben, hätten sie lächerlich gefunden, denn die Formen kannte jedermann selbst und nichts poetisch Erhebendes hatte das körperliche Wesen der Hunde. So beginnen die Quellen dieser For-

Digitized by Google

schung erst da, wo sie selbst schon vielfach ineinander geflossen, und nur der Gang der Cultur der Menschheit führt uns zu der Wahrscheinlichkeit, daß in der patriarchalischen Zeit auch der Hund nur diese Lebensweise getheilt haben, auch er nur als Hüter der Hütten und Heerden erschienen sein kann. Wie aber der erste Hund zu den ersten Menschen gekommen, das würden wir wahrscheinlich leicht erklären können, wenn wir die Nachricht darüber bewahrten, wie sich das erste Schaaf und Rind zum Menschen gefunden, wie das erste Pferd seinen Körper mit dem seinigen vermischte, oder wie das erste Getreide auf seinen Acker gekommen. Aber alle diese Vorfälle erlebte der Mensch in der Zeit seiner früheſten Kindheit, wo ihm ein höher geselliges Zusammenwirken noch so fremd war als die Mittel für Mittheilung einfach, und jeder auf seinen eignen Kreis beschränkt, lebte sich in das, was ihm aufstieß, mit Kindern und Enkeln zur Gewohnheit hinein. So kam es, daß dergleichen erlangte Vortheile nicht weiter beachtet, von den Nachkommen als einmal bestehend erkannt und so, als könnten sie nicht anders seyn, als einmal vorhanden, genossen wurden. In der schönen Mythe der Alten gaben die Götter dem Menschen, was ihm frommte, und auch der Sinn des Christen wird nur als Gabe von Gott die Güter seines Lebens erkennen. Daß der Hund selbst sich dem Menschen genähert hat, ist um so wahrscheinlicher, als auch der mit ihm so nahe verwandte Schakal, wie wir gehört haben, dies noch heut zu Tage zu thun pflegt. Aber wie jener ursprüngliche Hund aussahe, mag noch ferner zu fragen erlaubt seyn. Werfen wir einen Blick auf die heut zu Tage noch unbezweifelt wilden Arten, welche mit dem Hunde am nächsten verwandt sind, nämlich Schakal und Wolf, so wird es folgerecht seyn, wenn wir annehmen, daß jener Urhund ihnen möglichst ähnlich gewesen; finden wir aber alle Pudel nebst ihren Varietäten, alle Windhunde, Fleischerhunde, Bullenbeißer und Jagdhunde theils in ihrem Wuchs, theils in ihren Physiognomieen, vorzüglich durch ihre hängenden Ohren von jenen genannten Thieren abweichend, so bleibt uns nur die Gruppe der sogenannten **Spitzhunde** durch ihre ähnlichen Körperverhältnisse, ihre oft täuschendähnliche Physiognomie, vorzüglich ihre ganz ähnlich gebauten, wie bei allen wilden Raubthieren aufrecht stehenden, nach vorn gerichteten, leicht beweglichen Ohren, diejenige, welche mit Schakal und Wolf ungezwungen in eine und dieselbe Reihe, in die nächste und innigste Verwandtschaft gestellt werden kann. Finden wir ferner unter den Hunden dieser Gruppe auch diejenigen, welche durch ihr Naturell dem patriarchalischen Leben am angemessensten sind, sehen wir, daß eine Art von Begriff für Eigenthum in ihnen herauftaucht, daß sie darum wachsame Hüter der Hütten und Heerden genannt zu werden verdienen, daß sie aber ferner im Allgemeinen weder die höchsten Talente noch eine innige Anschmiegung an den Menschen entwickeln, Spuren von Wildheit d. h. eine beißige, falsche Natur nur bei der besten Erziehung ablegen, ferner daß die Beweise von Verwilderung und von Begattung mit Wölfen vorzugsweise in diese Gruppe fallen, ja sogar die in seltnen Beispielen geschehene Verwilderung anderer Racen, diese in folgenden Generationen zu solchen umwandeln ließ, welche in die gegenwärtige gehören, dann scheint es uns, stimmt alles überein, sie selbst als die auf der niedrigsten Stufe der Cultur stehenden Hunde betrachten zu müssen. Rechnen wir dazu daß die Formen dieser Race die allergemeinsten sind, theils in die meisten Abänderungen auslaufen, theils in den zahlreichsten Individuen existiren, so mag alles auch für die Annahme sprechen, daß unter ihnen nicht unwahrscheinlich der älteste Stamm gesucht werden mag, dessen Zweige sich vielfach verbreitend, mannigfaltige Gelegenheit fanden sich zu läutern und

Digitized by Google

veredelte Formen zu zeugen. Denn höher steht im Allgemeinen unstreitig die Treue des Pudels, unvergleichlich ist die Blitzesschnelle des Windhundes und bis zum höchsten Begriffe von Hundetalent steigert sich die Fassungskraft und Erinnrung, der Gehorsam und die Treue, ja die fast menschliche Ergebenheit des edelen Jagdhundes.

Aber wie — fragen wir weiter — wie ist denn jener beißige Schäferspitz, wie ist er denn zum treuen Pudel, wie ist er zum dahinfliegenden Windhunde, wie endlich zum verständigen Jagdhunde geworden? — Gar leicht beantworten dies viele Naturforscher, wenn sie uns an Clima und Nahrung erinnern, diese beiden Verhältnisse sagen sie, bilden die lebenden Wesen so um, daß man sie kaum wieder erkennt; allgewaltig ist die verwandelnde climatische Kraft für den Südländer im Norden, für den Westländer im Osten, und umgekehrt übt sie sich aus, und das Thier wird ein andres und die Pflanze eine andre, wenn sie den heimischen Boden verläßt; doch erst nach und nach macht solche Verändrung sich sichtbar, Generationen folgen einander und erst durch sie verschwinden die Spuren der Heimath. Wer wollte so tiefes Eingreifen von Clima und Nahrung in das Leben verkennen, wer wollte über ihren Einfluß auf Bildung und Umbildung des Organismus absprechen, beides ist so anerkannt und durch so viele Beispiele, besonders in Bezug auf das mehr oder minder kräftige Hervortreten der Formen, auf mehr oder mindere Feinheit und Menge, hellere oder dunklere Farben der Haare zu belegen, daß wir einmal annehmen wollen, diese Momente möchten hinreichen, die Entstehung der Hauptracen mancher Thiere erklären zu können. Auffallend bleibt es dabei freilich, daß andere Thiere seit Jahrhunderten in die entferntesten Climate gebracht, mit ziemlich verschiedner Nahrung genährt, ihren heimischen Aeltern auch nicht im Geringsten sich entfremdeten, wie die spanischen Pferde und Schweine in Mexico, Peru und Chili, die französischen Katzen in Madagaskar, die spanischen in Südamerika und die holländischen in Guinea unverändert blieben, während man ehedem sogar an eine Abstammung aller bekannten Katzenracen von unserer europäischen wilden Katze geglaubt hat, welche Annahme eine sehr bedeutende Veränderung in Europa vorausgesetzt haben würde. Wir sahen ferner zahlreiche Löwen in aufeinander folgenden Generationen mitten in Europa zum Theil in harten Wintern geboren werden, und dennoch erwuchsen diese Thiere in der ihnen eignen Entwicklungsperiode zu einer Vollkommenheit, welche sie in nichts von ihren Vorältern unterscheiden ließ, als in geschmeidigerem Naturel, in einem höheren Grade von Zahmheit, einige Wahrscheinlichkeit bietend, daß auch fernere Generationen nicht bedeutende Abweichuug in der Gestaltung herbeiführen würden. Solche Ausnahmen wie diese von Pferden und Schweinen, von Katzen und Löwen würden uns zu der Ansicht führen können, daß das Clima und die Nahrung auf diese genannten Thiere nicht so einwirken als auf die Hunde, oder es würde die Vermuthung zulassen, daß auf die Hunde noch etwas Anderes gewirkt haben müsse, was auf jene genannten Thiere, keinen oder nur geringeren Einfluß zu äußern vermochte. In der That möchte ich glauben, daß für solche Erscheinung noch eine andere Erklärung stattfinden könne. Gewiß ist es nicht blos die körperliche Seite des Thieres, welche eine Einwirkung körperlicher Ursachen zuläßt und diese nun auf die Veränderung des Körpers überträgt. Gewiß finden wir oft Veränderungen welche höchst auffallend sind, ohne Wechsel von Clima und Nahrung, einzig und allein von Umständen erzeugt, welche auf das innere, geistige Leben der Seele ihre Einwirkung äußern. So wahr als irgend etwas, ist jener Ausspruch des großen Dichters: „es ist der Geist, der sich den Körper

Digitized by Google

baut!" — denn in diesem Ausspruche liegt der Hauptschlüssel für die geheimsten Phänomene der Schöpfung. Ist es aber erlaubt dies vom Menschen zu sagen, so entwürdigen wir auf dem Wege der Naturforschung diesen nicht, wenn wir denselben Ausspruch auch auf ein Geschöpf übertragen, welches mit dem Menschen in die Welt trat, mit ihm sich fortbildete und durch inniges Anschmiegen an die verschiedensten Formen seiner Lebensweise mit ihm in die engste Berührung getreten ist. Wer wird die geistigen Fähigkeiten des Hundes leugnen? — wer sollte ihm Phantasie absprechen, die Lucretius sogar in den Träumen der Jagdhunde herrlich besingt, oder die der Volksglaube bis zum Geistersehen erhebt? — Die Katze bleibt, wie wir gesehen haben, im Zustande der halben Wildheit, ihre Geistesfähigkeiten sind durch ihre Wildheit gehemmt, durch ihre List und Schlauheit überwogen; das Pferd ist in seiner Art ein verständiges Thier, aber all' sein Verstand beschränkt sich auf zartes Gefühl für Zügel und Sporn, auf Gehorsam durch Berührungen, welche ihm in stetem Zwange zur Gewohnheit gemacht werden, das Wort wirkt dabei nur mit, und in seltenem Falle gelingt es, dem Pferde Künste zu eigen zu machen, deren Theorie auf denselben Zwangsmitteln beruhte, aber dies Alles bleibt instinctmäßiger Zwang, denn das entfesselte Thier eilt wieder ebenso instinctmäßig zur ungezügelten Freiheit. Ganz anders benimmt sich der Hund, ohne Fesseln verrichtet er für den Menschen Geschäfte, sorgsam achtet er auf alle Umgebung, alles, was ihm fremdartiges vorkömmt, bemerkt er genau, nicht scheu stutzend wie das Pferd, und in all' seinem Handeln tritt er selbstständiger auf. Unter solchem Verhältniß wirkt auch seine Seele auf die Bildung seines Körpers freier, als die eines nur halbzahmen oder in der Zähmung gefesselten Thieres zu wirken vermag. Darum mögen wir uns nicht wundern, wenn der Hund auch das geistige Bild von dem, was ihn täglich und stündlich beschäftigt, tief auffaßt und — soweit dies nur seine Organisation erlaubt — seinen eignen Körper diesem Bilde verähnlicht. Einige glauben, daß unmittelbare Vermischung des Blutes mit den benachbarten Thierarten die Racen als ursprüngliche Bastarde erzeugt habe, die dann sich fortpflanzend in diesen Formen sich erhalten hätten. Wenn wir den Hund der Eskimaux, den Wolfshund der Ardennen und Pyrenäen dem Wolfe so ähnlich finden, daß man geglaubt hat, die erstern wären selbst gezähmte Wölfe, so wäre die gewöhnlich gegebene Erklärung nicht fern, daß diese Hunde wenigstens vom Wolf und vom Hunde als Bastarde abstammen könnten, obwohl wirklich erwiesene Bastarde immer noch anders aussehen und reiner Erfahrung zufolge bei Fortpflanzung wieder in die Grundart des Hundes zurückgehen. In der Vorzeit war man überhaupt mit der Erklärung aus Bastarderzeugung sehr freigebig, und schon bei den Griechen wurde, wie wir anderwärts ausführlicher*) sehen werden, eine häufige Race, die der Spartanischen oder Lakonischen Hunde, ganz im Ernste als aus Vermischung von Hunden und Füchsen entstanden bezeichnet; in der Gegend von Cyrene in Afrika sollten sich die Hunde vorzugsweise mit Wölfen belaufen, obwohl es nicht erwiesen ist, daß es in dieser Gegend jemals wirkliche Wölfe gegeben hat. Diese Nachrichten mögen auf einzelne beobachtete Fälle gegründet seyn, ohne daß sie uns zum Glauben an die Annahme einer allgemeinen Abstammung der ganzen Race von solcher Bastarderzeugung veranlassen müssen; denn ähnliche Ansichten lagen zu sehr im Geiste der Zeit und erin-

*) Die Thierwelt des classischen Alterthums. Bildet ein noch nicht erschienenes Heft zum Universum.

Digitized by Google

nern uns an den Cameloparder oder die Giraffe als Bastard von Cameel und Panther, oder an den spätern Leopard, als Nachkomme vom Löwen und Panther. Aber wollten wir auch solche Abstammung zugeben, wollten wir noch weiter gehen und sogar wahrscheinlich finden, daß die gestreifte englische Dogge von der gestreiften Hyäne abstamme, welche, wenigstens in der historischen Zeit, wo die Doggen entstanden seyn sollen, gewiß nicht in England gelebt hat, so bleibt uns noch erlaubt zu fragen, aus welcher Bastardverwischung die von den Urformen am allermeisten abweichenden Wind- und Jagdhunde und Bullenbeißer abstammen könnten. Wohl die meisten derjenigen Naturforscher, welche an so unheimliche Erzeugung der Hunderacen durch verschiedene wilde Thiere glauben, dürften in große Verlegenheit gerathen, irgend ein wildes Thier von so schlanker Gestaltung mit hängenden Ohren wie Wind- und Jagdhund oder von so plumper Form und breitem Rindsmaul wie der Bullenbeißer nachzuweisen, welches bei Vermischung mit einer Hündin der Urform als Vater für obige Racen gegolten haben könne. Vielleicht naturgemäßer dürfte nach obiger Voraussetzung erklärbar seyn, wie alle diese Racen im Laufe der Zeiten aus einer und derselben Urform hervorgegangen sind, so schwer begreiflich dies anfangs auch scheint. — Ein merkwürdiger Fall für die Einwirkung äußerer Eindrücke auf die Bildung der Jungen, ist mir in diesen Tagen bei einer andern Thierart vorgekommen, welcher man sonst wenig Einbildungskraft zutraut und ich halte dessen Erwähnung an diesem Orte nicht für unpassend. Im verflossnen Jahre 1834 schrieb mir Hr. v. Quandt von seinem Gute Dittersbach, daß daselbst die Freundschaft, welche eine Gans mit einen Truthahn geschlossen, seit einiger Zeit auf seinem Hofe große Aufmerksamkeit erregt; die Gans ginge nie ohne Begleitung des Truthahnes aus, und derselbe habe sogar, als er ihr in das Wasser gefolgt sey, daselbst auf einem Steine, auf dem er sich gerettet, die Nacht zubringen müssen, da man ihn erst am folgenden Morgen daselbst bemerkt und aus dem feindlichen Elemente gerettet habe. Die Gans legte alsbald, und aus den Eiern kam ein Junges mit Truthahnbeinen ohne Schwimmhaut. Dies Gänschen wuchs auf und in diesen Tagen erhielt ich die erwachsene Gans, welche jetzt jedermann ausgestopft im Museum sehen kann. An ihrem Orte werde ich sie näher beschreiben und genau abbilden. Der Naturforscher wird hier zweifelhaft ob er solche Erscheinung aus Bastarderzeugung oder aus einem sogenannten Versehen herleiten soll. Ich möchte ungeachtet hier die Paarung statt gefunden haben soll, doch mehr an eine blos geistige Einprägung des Bildes glauben und komme von dieser erläuternden Abschweifung wieder auf die Hunde zurück. Diese Thiere sind vor allen andern fähig äußre Eindrücke festzuhalten und diese ihrer kommenden Generation aufprägend, wiederzugeben. Von der Farbe ist dies allbekannt und sogar für die Schaafe ein Beispiel in der heiligen Schrift in jedermanns Erinnerung. Der aufmerksame Beobachter wird indessen Beispiele in seinem eignen Kreise nicht vermissen und es ist mir wahrscheinlich daß die Geburt zu vieler schwarzer oder brauner Schaafe, worüber manche Schafmeister zu klagen haben, von der Farbe ihres Schaafhundes abhängt. Ein schönes Beispiel gänzlicher Uebereinstimmung in der Färbung und Zeichnung zwischen Schaafen und Hunden, wobei die Nachbildung wahrscheinlich auf Seiten des Letztern ist, zeigt uns die Umgebung von Algier; die dortigen zottigen Schaafe sind weiß, hinten schwarz und haben einen schwarzen Streif über dem Auge. Man findet auf den prächtigen Aquatintablättern: les pirates Algériens von Le Conte einen solchen Hund und ich kann nicht umhin dies Beispiel in die Abbildungen unsrer Samm-

Digitized by Google

lung unter Nr. 571. aufzunehmen. Daß unsere Racen der Hunde bei den gebildetsten europäischen Völkern der Vorzeit nicht vorhanden gewesen und erst unter dem römischen Kaiserreiche erzeugt worden, ist mir aus Vergleichung einer Unzahl antiker Hunde wahrscheinlich geworden. Fast alle Hunde auf den Gemälden, Statüen und Bronzen welche man aus Herkulanum, Pompeji und Stabiä ausgegraben hat, gehören den roheren Racen der Spitzhunde an, einer ist ganz unser Spitz (vgl. **cave canem**, schöne Mosaik in **Real Mus. Borbon. vol. II. t. LVI.**) eine zweite ist der **Lyciskus** oder Wolfshund, eine dritte der **Spartanus**, leicht gebaut wie der französische **Matin**, aber gleichfalls mit ganz aufrechten Ohren. Höchst selten kommt eine schlanke Form mit gebrochnen Ohren, nach Art des Windhundes in den Antiken vor, und Pudel und Jagdhundköpfe mit Behang, finden sich erst in der spätern Zeit des Kaiser Augustus. Da erst um diese Zeit die eigentliche Dressur der Hunde geübt worden, so läßt sich vermuthen daß auch erst durch diese Dressur manche Formen gebildet und für diesen Zweck mit Sorgfalt fremde Racen von Hunden herbeigeschafft wurden. Früher aber waren die Freuden der Jagd im alten Afrika und in Indien bekannt. Ich glaube, daß wir auch dort die erste Spur der Wind- und Jagdhunde, wie die der Bullenbeißer zu suchen haben. Die Windhunde bildeten sich wohl durch die Jagd auf schnellfüßiges Wild, wodurch ihr Körper gestreckt, ihre Physiognomie der des Hirsches und der Antilope verähnlicht wurde. Der breite Behang der Jagdhunde schreibt sich vielleicht aus einer früheren Laufbahn dieser Thiere, die sie in Indien als Hüter der Schaafe durchlebten, welche bekanntlich dort mit diesem langen und breiten Behange geziert sind und keine Wolle, sondern glattes Haar wie die Jagdhunde haben. Denn alle existirenden Hunderacen wurden ursprünglich zur Bewachung von Heerden gebraucht, dann auch zur Jagd. Die Abstammung der Bullenbeißer von Hütern der Büffelheerden ist fast noch einleuchtender und die thibetanische Urform derselben kannte schon Strabo, während dieselbe in Europa unbekannt blieb, bis neuerlich das merkwürdige Thier nach England kam, so daß ich die Abbildung dieser Race unter Nr. 222 — 224 auf dem Continente zum erstenmale geben konnte. Es ist interessant wie diese in ihren Varietäten immer die eigenthümliche Beziehung auf die Rinder behalten hat, denn die Bärenbeißer sind nur durch die Dressur umgebildete Bullenbeißen. An die Verähnlichung der Rüden Nr. 173. 174. mit dem wilden Schweine darf ich wohl kaum erinnern, sie springt in die Augen. Der englische Fuchshund Nr. 192—194. ist das Bild des Fuchses unter den Hunden, der chinesische Otterhund Nr. 589—591. geht im Kleide der Fischotter einher und seine Aehnlichkeit geht so weit, daß er auf dem Lande sich wackelnd fortwindet wie jene, seine Schwimmhäute ausbreitend Wasser sucht und wenn er dies gefunden, in seinem Elemente schwimmt und mit dem flachgedrückten Otterschwanze rudert gleich einer wirklichen Fischotter! —. ja der ächte Bieberhund hat sogar wie der Bieber eine Doppelkralle am Daumen der hintern Schwimmpfoten!! —

Ich behaupte nie etwas, wenn ich Erscheinungen in der Natur zu erklären versuche, denn in Enthüllung der Geheimnisse der Schöpfung irrt jeder und muß jeder irren, aber interessant erscheinen mir dennoch solche Facta, sie deuten darauf hin, daß Verähnlichungen des Hundekörpers mit Thieren stattfinden, mit denen keine Bastardvermischung anzunehmen möglich ist, und die Verähnlichung geht so weit, als der Typus der Gattung und Art es zuläßt, denn die Frage warum der Jagdhund nicht auch die Geweihe des Hirsches, der Bullenbeißer nicht auch die Hörner und Hufe

Digitized by Google

des Rindes erhielte, würde keiner Antwort bedürfen, jene Verähnlichungen aber, wie mir scheint, in der lebhaften Einbildungskraft eines Hundes, den wir uns übrigens in der Vorzeit in unabläßiger Berührung mit den Thieren denken müssen, denen er sich nachgebildet hat, einige Erklärung allerdings finden können.

Wenn wir die vier Racen: Spitze, Pudel, Bluthunde (Wind- und Fleischerhunde) und Jagdhunde, als die nächsten Stufen der Art, in der Würde von im Laufe der Vorzeit entstandenen Abarten betrachten wollen, so werden wir eine Anzahl minder abweichender Formen nur als Abänderungen von jenen Grundracen ansehn und Nebenracen nennen können Wenn, wie wir anzunehmen Grund haben, diese Nebenracen ursprünglich aus Verpaarung der Hauptracen entstanden sind, so würden wir zuerst sechzehn Nebenracen erhalten, von denen jede die Eigenschaften zweier Hauptracen vereinte. Auch diese verpaaren sich wieder untereinander und obwohl man die aus den Verpaarungen der Nebenracen entstandenen Sprößlinge gewöhnlich Gassenhunde nennt, so sind doch aus ihrer Mitte manche geschätzte Formen hervorgegangen, die man als Zuchtvarietäten fortpflanzt. Die Verpaarung geschieht indessen um so leichter und öfter, je näher die Racen einander stehen, um so schwerer und seltner, je entfernter sie von einander sind; darum ist die Zahl der Formen einer fernern Verpaarung für die verschiedenen Glieder der Reihen sehr ungleich. Verpaarung der am entferntesten stehenden Spitze und Jagdhunde dürfte nur selten vorkommen.

Wir versuchen jetzt unter den vier Stammracen die vier Unter- oder Nebenracen aufzuzählen und setzen die Vater- und Mutterrace vor, indem wir zugleich die eigentliche Benennung beifügen; wir machen ferner darauf aufmerksam, daß diese Mischungen zugleich den Mischungen der Climate, welche die ursprünglichen Racen erzeugten, entsprechend angesehn werden können, so gilt Spitz fur Ost, Pudel für Nord, Bluthund für Süd und Jagdhund für West, ohne glauben zu wollen, daß diese Begriffe einander stets wirklich entsprächen. Daß eine streng climatische Eintheilung unmöglich ist, haben schon andere Bearbeiter dieses Gegenstandes bewiesen.

Spitzhunde.

1. Spitz-Spitz: Eigentliche Spitzhunde.
2. Pudel-Spitz: Haushund.
3. Bluthund-Spitz: Zigeunerhund.
4. Jagdhund-Spitz: Albaneser.

Pudelhunde.

1. Spitz-Pudel: Hirtenhund.
2. Pudel-Pudel: Pudel.
3. Bluthund-Pudel: Calabresenhund.
4. Jagdhund-Pudel: gr. Wachtelhund.

Bluthunde.

1. Spitz-Bluthund: Jaroslaverhund.
2. Pudel-Bluthund: Rüde.
3. Blut-Bluthund: Windhund.
4. Jagd-Bluthund: Fleischerhund.

Jagdhunde.

1. Spitz-Jagdhund: Neufoundländer.
2. Pudeljagdhund: Bernhardshund.
3. Blut-Jagdhund: Bullenbeißer.
4. Jagd-Jagdhund: Jagdhund.

Digitized by Google

Es folgt gegenwärtig eine Aufzählung nach obiger Anordnung.

Erste Hauptrace: Spitzhunde: Canis familiaris orthotus.

Kennzeichen: Ohren aufrechtstehend.

Erste Race. Eigentliche Spitzhunde: Schwanz spiralig zurückgebogen.

242. 243. **Der Viehhund. Pecuarius Column. VII. 12. custos pecoris** im zehnten Sekulo genannt.

Wuchs im Allgemeinen der des Spitzes, etwas hochbeiniger, Haar glatt anliegend, schwarz, Unterseite und Innenseite der Beine, Schnauze und über jedem Auge ein rundlicher Fleck: rostfarbig. — Ein allgemein verbreiteter Hund auf der niedrigsten Stufe geistiger Entwicklung, beißig und mißtrauisch, abrichtbar zur Hütung der Hausthiere, auch auf dem Lande als Hof- und Haushund: C. villaticus, wie der unter den Bluthunden aufgeführte Fleischerhund, mit welchen er häufig Paarungen eingeht und Mittelschläge zwischen beiden erzeugt. Am häufigsten geht er Verpaarungen mit der folgenden Race ein, so bildet sich eine Anzahl unmerklich übergehender Mittelformen. Wahrscheinliche Ur-Race.

119. **Der Wolfshund**: λυκίσκος, **lyciscus** der Alten; **lupinus, luparius.** —

Franz.: Chien loup. — Engl.: Wolf Dog. — Dän.: Ulvehund. — Ital.: Can lupo. — Span.: perro lobo.

Wuchs gedrungener als bei vorigen, Beine etwas kürzer, Ohren verhältnißmäßig kleiner. Farbe meist schwarz, unterseits gewöhnlich heller. Ein großer starker Hund, bisweilen von der Größe eines mäßigen Wolfes. Nach den Ansichten der Alten („at lupus et catula formant coëundo lyciscum,“) war er ein Wolfsbastard, was aber, wie wir oben gesehen haben, durchaus unwahrscheinlich ist. Er findet sich vorzugsweise in Gebirgsgegenden, in den Pyrenäen und Ardennen, in den deutschen Alpen und in den Carpathen, und ist heut zu Tage seltner als er in der Vorzeit, wo man sich seiner vorzüglich zur Jagd auf Wölfe bedient hat, gewesen ist. Er findet sich nicht selten auf Antiken als Jagdhund auf Hirsche, Bären und Löwen. Seine Abänderungen welche theils durch Clima theils durch Verpaarung entstanden seyn mögen, sind zahlreich, wir rechnen hierher folgende.

120. 121. **Der Baffinsbaihund, Eskimohund: borealis.**

Franz.: Le chien des Esquimaux. — Engl.: the Esquimaux Dog.

Gewöhnlich weiß oder graulich, selten gefleckt oder einfarbig röthlich oder schwarz und unten und an der Innenseite der Beine weißlich oder wie die Ur-Race rostfarbig. Haar dicht und gröblich, im Winter 3 — 4 Zoll lang, dann auch mit wolligem Unterhaar. Sie heulen wie Wölfe ohne zu bellen, sind zutraulich, knurren und kämpfen aber häufig untereinander. Sie gewöhnen sich gern an Menschen, machen sich bemerkbar und sind für Liebkosungen empfänglich. Sie unterstützen den Eskimaux bei der Jagd auf Robben, Rennthiere und Bären, dienen ihm als Last- und Zugthier. Der Hund trägt im Sommer eine Last von 30 Pfund bei der Jagd, im Winter zieht einer auf dem Schlitten in der Stunde acht englische Meilen an einem Tage deren 60.

Digitized by Google

Der treue Sklave hat dürftiges Futter, nimmt mit den schlechtesten Abgängen und ekelhaftesten Ueberresten verlieb und erleidet reichlich Prügel, murrt dann wohl, aber ermüdet nicht in Arbeit und Treue. Die beßre Behandlung, welche sie von den Weibern erfahren, erkennen sie so dankbar, daß sie deren Willen sich auch in den schlimmsten Fällen unterwerfen. Zum Ziehen erhalten sie eine Satteldecke aus Robbenfell mit Oeffnung für den Hals und die Vorderbeine, ein Riemen läuft von da über den Rücken zum Schlitten als Zügel. Der klügste Hund wird als Leithund vorangespannt, durch langen Zugriemen von den folgenden entfernt. An ihn richtet sich das Commando und die übrigen folgen. Einen vollen Zug bilden 10 — 42 Stück. Der Treiber sitzt tief auf den Vordertheile des Schlittens, läßt die Füße auf einer Seite über den Schnee hängen und regiert die etwa 8 Zoll lange Peitsche aus Holz, Knochen oder Fischbein, deren Schnur oder Riemen etwa 8 Fuß lang, unten geflochten ist. Die Spitze wird um geschmeidig zu bleiben, von den Weibern gekaut. Die Männer haben große Uebung mit der Peitsche jeden einzelnen Hund zu treffen, doch wird sie selten zum hauen gebraucht, da Hunde schon ihre Anwesenheit verspüren und jeder Hieb nachtheilig wirkt, da er den Zug aufhält, weil der getroffene Hund erschreckt und die andern stört. Worte wirken weit besser. Auch zur Nachtzeit und im heftigsten Schneegestöber behält der Leithund die richtige Spur. Strenge Aufsicht ist indessen immer nöthig. Bei schwerer Ladung erleichtert das Vorausgehn eines Menschen besonders einer Frau die Erreichung des Zieles ungemein. Bei guter Schlittenbahn ziehen 6 — 7 Hunde achthundert bis tausend Pfund mit einer Geschwindigkeit von 7 — 8 engl. Meilen in einer Stunde, also täglich 50 — 60 Meilen zurücklegend. Ohne Bahn würden 25 — 30 Meilen eine starke Tagereise ausmachen. Eben so viele gut gefütterte Hunde mit einer Last von 500 — 600 Pfund (nebst Schlitten gerechnet) ist fast nicht zu zügeln und kann auf ebener, glatter Bahn zehn engl. Meilen in der Stunde zurücklegen. Durch zweckmäßigere Anschirrung könnte die Kraft weit besser benutzt werden. Die Hunde gehen auf Rennthiere, Robben und Bären muthigen Anlaufs, nur den Wolf greifen sie nicht an, sondern beginnen in seiner Nähe ein fürchterliches Heulen. — Die sehr ähnlichen Hunde der Kamtschadalen werden von Jugend auf zum Ziehen gebraucht und verweigern überhaupt keine Arbeit, während sie sich mit einem schlechten Fraße aus den Gräthen gedörrter Fische begnügen, dabei doch oft so hungrig werden, daß sie ihre Riemen zernagen. Sie erhalten Schuhe aus Leder, um auf dem glatt gefrorenen Schnee nicht auszugleiten. Am Jenisei und an der Lena sind auch die Hunde im Winter die beständigen Begleiter und Theilnehmer der Menschen an den Geschäften der Jägerei, und führen die kleinen Karren, welche die ganze Nahrung, Hausgeräthe und Netze enthalten, mit sich. Sie folgen ihrem Herrn auf dem Fuße und legen sich bei Eintritt der Schneezeit neben ihm nieder, um ihn mit ihrem eignen Körper zu erwärmen, wenn die Zelte nicht zu erreichen sind, wohin sie ihn indessen auch während der Nachtstürme durch ihre Spur zu führen im Stande sind.

117. 118. Der Pommer: pomeranus Gmelin.

Franz.: le chien pomérien. — Engl.: the pomerian Wolf-Dog. — Schwed.: Vargbund. — Isländ.: Ulvidur Ungfidur.

Wuchs des vorigen, Kopf meist verhältnißmäßig groß, spitzschnautzig, Ohren steif und spitzig, schmaler als bei dem Viehhunde, Schwanz sehr spiralig gekrümmt, Haare

Digitized by Google

am Leibe kurz, am Bauche, der Kehle, den Schenkeln und dem Schwanze lang. Uebrigens mittelgroß, weiß, isabellfarbig, seltner braun, schwarz oder gefleckt.

Ein muthiger, lebhafter und wachsamer, aber beißiger, mißtrauischer Hund, welcher auch seinem Herrn Fleischwaaren und dergl. zu stehlen pflegt, obwohl er sonst treu und anhänglich ist. Ueber die gemäßigten Gegenden verbreitet in größerer und kleinerer Abänderung; letzterer heißt vorzugsweise Spitz oder Fix: **bassa.**

122 — 124. Der langhaarige Spitz: pomeranus villosus. (Sibiricus Gmelin.)

Franz.: le ch. pomerien de Sibérie. — Engl.: the sibirian Wolf-Dog.

Mittelgroß, von vorigen durch hängendes langes Haar unterschieden und wahrscheinlich eine Zuchtvarietät aus Pommer und Seiden- oder Bologneserhund. Pallas widerlegt Gmelin's Behauptung, daß dieser Hund in Sibirien einheimisch sey. Naturell des vorigen, dabei kleffig und knurrig wie Bologneser.

Der englische Spitz ist die kleinste Form dieser Varietät, langes, feines, weißes Haar und hervorragende Hüftknochen zeichnen ihn aus.

125 — 129. Hund vom Makenziefluſſe: lagopus Vigors.

Franz.: Le chien de la rivière Mackenzie. — Engl.: the Hare-indian Dog.

Vom Wuchs eines kleinen Pommers oder des Fix, aber schlanker und zierlicher. Die ganze Behaarung lang, seidenartig, Farbe weiß und schwarz, im Winter auch ganz weiß, die schwarzen Flecke ziehen dann erst in Schiefergrau, auch Braun und verlieren sich nach und nach gänzlich, das Haar ist dann dicker. Dr. Richardson brachte diese Hunde von seiner mit Kapitain Franklin angestellten Weltumsegelung mit, und sagte, das diese Race bei den Hasenindianern eigenthümlich gefunden werde, wo jene Reisenden überwinterten. Diese Hunde waren außer dem mitgebrachten Pärchen in Europa noch nicht bekannt, haben sich aber im Garten der zoologischen Gesellschaft fortgepflanzt. Ihr Blick ist freimüthig und zutraulich, dabei gewissermaaßen edel und gutmüthig. Sie befinden sich dort wohl und gewöhnen sich leicht an Fremde. In ihrer Heimath hört man sie nicht bellen, merkwürdig ist es aber, daß die in England gebornen Jungen allerdings bellen gelernt haben. Für die Hasenindianer sind diese Hunde sehr wichtig, indem sie bei der Jagd auf die dortigen Rennthiere sehr gute Dienste leisten und bei ihrer Schlankheit und mit ihren breiten Fußballen nicht in den Schnee einsinken.

Zweite Race: Pudel-Spitze: Kopf kürzer, Leib dick, Beine kurz, Haare rauh oder zottig, Schwanz gerade.

132. Der Haushund, Hirtenhund: domesticus Linn.

Franz.: Chien de Berger. — Engl.: the Shepherds Dog.

Dunkelfarbig, braun oder schwarz, auch grau, seltner weiß, grobzottig, die Schnautze kurzhaarig, meist heller gefärbt, Ohren kurz und plump gebaut, schief aufrecht. Schwanz wenig gekrümmt, etwas zottig. — Ein Exemplar welches in zottigem Pelz, Farbe und Zeichnung (weiß, hinten schwarz, Nase und ein Streif über jedem Auge gleichfalls schwarz) mit den Schaafen seiner Heerde gänzlich übereinstimmend Nr. 671.

Digitized by Google

ist von Algier und schon oben erwähnt worden. — Dieser Haushund ist allgemein verbreitet, nach Pallas auch in Sibirien der gewöhnlichste Hund, er wird daselbst sowohl zum Hüten der Schaafe als auch zur Jagd, wo nicht die Schnelligkeit des Windhundes erforderlich ist, angewendet. Einige richtet man ab auf Bären zu gehen, andere greifen das Elen an, noch andere spüren den Zobel auf; diese sind so listig, daß sie wenn sie dem Zobel nicht beikommen können, ihn zwingen auf einen Baum zu klettern und ihn dann so lange bewachen, bis der Jäger durch ihr Gebell gerufen, herbeieilt und den Zobel herabschießt. Ueber die Abrichtung zum Bewachen der Schaafe vergl. Schäferhund. Bei uns erscheint er in dieser Qualität nicht selten, seine Entwicklung ist auch der des eigentlichen Schäferhundes sehr analog.

Der Allko: Allco.

Meric.: Runallco.

Kleiner, langhaariger Schäferhund, weiß und braun gefleckt; ursprünglich wohl braun.

Alex. v. Humboldt sagt: in den Grassfluren oder Pampas von Buenos Ayres sind die europäischen Hunde verwildert. Sie leben gesellschaftlich in Gruben, in welchen die Jungen versteckt werden. Häuft sich die Gesellschaft zu sehr an, so ziehen einzelne Familien aus, und bilden eine neue Colonie. Der verwilderte europäische Hund bellt eben so laut, als der ursprünglich amerikanische. Garcilasso erzählt: die Peruaner hätten vor Ankunft der Spanier peros gozques gehabt. Er nennt den einheimischen Hund Allco. Um diesen gegenwärtig in der Quichua-Sprache von dem europäischen Hunde zu unterscheiden, bezeichnet man ihn mit dem Worte Runallco, gleichsam indischer Hund (Hund der Landeseinwohner). Dieser Runallco scheint eine bloße Varietät des Schäferhundes zu seyn. Er ist kleiner, langhaarig, weis und braun gefleckt, mit aufrechtstehenden spitzigen Ohren. Er bellt sehr viel, beißt aber desto seltener. Als der Inka Pachacutec in seinen Religionskriegen die Indianer von Xaura und Huanca besiegte, und gewaltsam zum Sonnendienste bekehrte, fand er göttliche Verehrung der Hunde unter ihnen. Die Priester bließen auf skelettirten Hundeköpfen. Auch wurde die Hundesgottheit von den Gläubigen in Substanz verzehrt (Commentarios Reales T. 1. p. 184.). Bei den Mondfinsterniſſen spielten die peruanischen Hunde eine eigene Rolle. Sie wurden so lange geschlagen, bis die Verfinsterung vorüber war. — Da das Wort Allco die allgemeine Bezeichnung ist für den Begri und, so ist nicht zu verwundern, wenn auch andere Schriftsteller einen anderen Allko beschreiben, namentlich wird noch ein kleiner erwähnt, den die Mexicaner im Busen und auf den Schultern zu tragen pflegten.

96. Der Techichi: Techichi.

Franz.: le chien sauvage. Chien de bois de Cayenne Buff. Koupara Laborde aber nicht Barrere.

Oben graulich und schwarz melirt, unten weiß und gelblich, Ohren schwarz, Hals an den Seiten bei den Ohren fuchsroth, Beine schwarz.

Die Beschreibung habe ich oben unter Nr. 96. gegeben, da ich das Thier nach Fischers Vorgang benannte. Ich äußerte schon damals, daß ich vermuthete, man habe in dieser Bestimmung geirrt, indem Barreres Koupara unser krabbenfressender Waschbär

Digitized by Google

Nr. 435 seyn könne; ich hatte damals übersehen, daß Alex. v. Humboldt dies wirklich schon bestätigt hat und beeile mich, dies Versehen hier zu berichtigen. Er sagt nämlich: Der einzige stumme, aber ganz stumme Hund war der mexicanische Techichi, kommt vielleicht von dem aztekischen Wurzelworte Techichializtli: warten, dem Feinde auflauern, her; dieser stumme Hund wurde (nach ächt tatarischer Sitte) gegessen. Auch dem Spanier war diese Speise vor Einführung des Rindviehes so unentbehrlich, daß nach und nach die ganze Race ausgerottet wurde (clavigero Storia di Messico T. I. p. 73). Buffon verwechselt den Techichi mit dem Koupara von Guyana (Tom. 15. p. 153.). Aber letzterer ist identisch mit dem Ursus Cancrivorus oder dem muschelfressenden Aguara-Guaza (Azara sur les Quadrup du Paraguay T. I. p. 315.) demnach ist der Name Canis cancrivorus in Fischers Syn. 184, und in unsern regn. Animale zu streichen und dafür C. Techichi zu setzen.

174. Der Saubeller, Saufinder: aprinus.

Wie voriger aber kräftig gebaut, grobzottig, meist schwarz, unterseits blässer, Schwanz grade.

Er heißt auch Schweinsbeller, Schweinsfinder und ist ein Blendling von vorigem mit dem Fleischerhunde. Er hat kräftige Beine, macht rasche Bewegungen und läßt eine durchdringende Stimme erschallen. Er wird zum Auffinden der wilden Schweine dressirt, wie dies Freih. v. d. Borch im Sylvan 1820 — 21, von S. 31 bis 40 ausführlich beschreibt. In unsern Zeiten ist der Hund mit den wilden Schweinen selbst selten geworden. Man führt ihn am Leit- oder Pürschriemen zur Stelle, wo man ein Hauptschwein gespürt hat, löst ihn ab und bemerkt nun, wie er still suchend auf der Fährte fortgeht, bis er zum Lager gelangt; hier stellt er das Schwein durch heftiges Bellen, d. h. er verbellt es. Die Jäger kommen nun mit den Rüden oder heut zu Tage mit den Hetzhunden um die Jagd selbst fortzusetzen.

Im Dessauischen und Würtembergischen kennt man in Deutschland diese Hunde noch.

133 und 244. Der isländische Hund, Haarhund: islandicus.

Franz.: Chien d'Islande. — Engl.: the Iceland Dog.

Durch überhängende Ohrspitzen in der ganzen Reihe der Spitzracen ausgezeichnet.

Er ist gewöhnlich ein kleiner Schäferhund von 1 Fuß 7 Zoll, etwa 1 Fuß hoch. Der Kopf hat eine gewölbte auf die Nase abschüssige Stirn, die Schnautze ist kurz aber spitz, die Augen sind groß, Hals und Vorderleib dick. Die Behaarung ist lang und glatt, der Schwanz dickhaarig, keulenförmig an der Spitze aufwärts gebogen, Beine mittelmäßig hoch und dünn. Farbe meist schwärzlichgrau, Stirn, Hals, Brust, Bauch und Innenseite der Beine weis. — Aehnliche Abänderungen sind: Der Dverghund: Dwerg-Hundar, mit kurzen, nur 2 — 3 Zoll langem Schwanze; der Dyrhund: Dyr-Hundar, größer, hochbeinig und kurzhaarig, sehr eifrig im Aufspüren, sie verfolgen und zerreißen Füchse; und der Lubber: Lubbar, obigen ähnlich aber kraushaarig, unsre Abbild. 244. Der isländische Hund ist lebhaft, gutmüthig und gelehrig. Er ist auch in hohem Grade gelehrig, regiert oft ganz allein die Heerden, so daß er sie führt und bewacht und zur bestimmten Zeit zum Melken treibt. Er hält auf Reinlichkeit und lebt in Feindschaft mit dem Schneefuchse und den Raben, wenn er die umher-

Digitized by Google

liegenden thierischen Bestandtheile aufzehrt. Dem Raben ist er so feindlich gesinnt, daß er ihn auch wenn einer geschossen ist, noch zerreißt, ohne ihn zu fressen*).

130. Der arctische Zughund: arcticus vectarius.

Franz.: le chien de train du nord.

Lang und hochbeinig gebaut, Ohren weit von einander abstehend, Hals zottig, Schwanz buschig, Farbe weiß oder graulich.

Durch die Expedition des Kapitän Roß wurde diese an der Baffinsbai zum Ziehen gebrauchte Varietät, welche von dem oben aufgeführten Baffinsbaihunde verschieden ist, durch Abbildung bekannt. Als das Schiff zehn englische Meilen westlich von der Prinz-Regent-Bai anlegte, kamen Eingeborene mit ihren Schlitten in die Nähe des Schiffs, den Schlitten zogen sechs Hunde, von dem jeder ein aus Robbenfell gemachtes Halsband hatte, woran ein aus dicker Haut geschnittner, ungefähr 3 Stab (Yards) langer Riemen befestigt war. An diesem Riemen zogen die Hunde alle nebeneinander ohne zusammengekoppelt zu seyn, und sobald die Peitsche schwirrte, liefen sie mit aller Schnelligkeit und in der schönsten Ordnung. Bloß mit dem Klatschen der Peitsche und mit seiner Stimme lenkte sie der Fahrende. Der Riemen an der Peitsche war 19 Fuß und 8½ Zoll lang. An einem Schlitten, den Kapitän Roß (nebst einer aus Narwalzahn gemachten Harpune) zum Geschenk erhielt, bestand das Ganze hauptsächlich aus Knochen welche mit Riemen von Robbenhaut zusammengebunden waren, die Kufen waren aus Narwalzahn. Roß überredete die Besitzer mit Mühe zum Verkauf eines Hundes, nach welchem der dabei gegenwärtige Maler Skenn die Abbildung fertigte, die wir mittheilen. Auf Kamtschatka hat man noch eine langhaarige Race: Magnate, mit langen, wolligen, zottigen Haaren. Man bedient sich dieser aber nicht zum Ziehen, weil sie zu schwerfällig sind.

131. Ist ein Bastard aus Wolfshund und Fleischerhund mit verstümmeltem Schwanze, daher auch dieser kurzschwänzig.

573 — 575 Der Otaheiter-Hund: otahitensis.

Franz.: le chien de Taite. — Engl.: the Otaheite-Dog.

Kopf des Pudels, groß mit kleinen Augen, aber die Ohren ganz aufrecht, Leib langgestreckt und stark, Beine mittelmäßig lang und stark, Behaarung lang, schwarz weiß oder gefleckt.

Diese Race zeigt uns den Spitzhund in seiner Hinneigung zum Pudel, ohne daß dessen Talent entwickelt wird, denn die Bewohner der Societäts- und Sandwichsinseln und Neuseelands halten diese Hunde, um sich selbst von ihnen zu nähren. Sie halten sie zu dem Ende in Menge um ihre Hütten, wobei sie mitten um den Leib angebunden sind, sie füttern sie blos mit Abgängen von Fischen und mit Vegetabilien, drücken sie, wenn sie fett sind, dadurch todt, daß sie ihnen die Luftröhre zuhalten, und braten sie dann in Gruben auf erhitzten Steinen. Bei jener Behandlung bleiben diese Thiere dumm und scheu, auch heulen sie fast nur, ohne zu bellen. Forster brachte einen jungen mit nach Europa, der dann auch gern Fleisch und selbst Hundefleisch fraß und Blut leckte. Kapitän Cook fand dagegen auch den Braten von einem Hunde dieser Race, nach obiger Art von den Einwohnern bereitet, sehr wohlschmeckend. Die Haare werden von den

*) Tilesius Reise S. 79.

Digitized by Google

Eingebornen verarbeitet. — Hierher gehört C. fam. villat. meridionalis oder der australische Hund Walthers. Der Name „australischer Hund" ist schon zu gangbar für den Dingo.

Zweite Hauptrace. Pudel- und Seidenhunde. Canis familiaris lasiotus.

Kennzeichen: Ohren hängend, zottig, Schädel rundlich, Schnautze kurz kegelförmig, Beine kurz.

Erste Race. Spitz-Pudel, mit ringförmig gebogenem Schwanz.

134. Der Carlehund, kurzhaarige Seidenhund: brevipilis Gmelin.

Franz.: le gredin. — Engl.: King Charles Spaniel.

Schwarz, gleichartig kurz seidenhaarig, Schwanz fahnenartig. Klein, auch mittelgroß.

Die glänzend schwarze Farbe erstreckt sich bis in den Gaumen. Sie sind meistens niedliche, aber zärtliche Schooshunde, bekannt durch König Carl II. von England, welcher nie ohne diese Hundchen ausging. Wird wie mehre Schooshunde oft im Alter unbehülflich. Man nennt sie auch englische Wachtelhunde.

135. Der Pyrame: flammeus Bechstein.

Wie voriger, aber unterseits rostfarbig wie die Ur-Race.
Von ihm gilt dasselbe, er ist gleichfalls nicht gar selten.

136. Der kleine spanische Seidenhund: hispanicus extrarius minor.

Franz.: le petit Espagneul. — Engl.: the smaller Spaniel. — Russ.: Istscheika.

Klein, überall mit seidenartigen, langhängendem Haar, meist weiß, auch mit braunen oder schwarzen Ohren und aus diesen Farben gefleckt.

Der Kopf ist klein, rundlich mit kurzer spitzlicher Schnautze, die Ohren breit, lappig herabhängend, zottig, die Schenkel dürr und kurz, Schwanz bogig aufgerichtet, langhaarig, die Haare der übrigen Theile mit Ausnahme der Schnautze und Läufe lang und zart. Sie stammen aus Spanien und der Barbarei und sind Schooshunde. Das Wort extrarius findet sich, wie es scheint, zuerst bei Sueton (Vesp. 5.) und bedeutet ein fremder, ausländischer Hund.

145. 146. Der orientalische und deutsche Schäferhund: pastoreus.

Franz.: le chien de Bercail. — Engl.: the Sheppherds Dog.

Mittelgroß, etwa wie Fuchs, aber langhaarig, mit links übergebogenem Fahnenschwanz.

Er kommt auch unter den Namen Bauernhund, Bauerrekel, Haushund und Hofhund vor. Die Schnautze ist lang und mäßig dick, der Kopf etwas länger als bei dem vorigen, so daß er hierdurch als Uebergangsglied zu folgender Race gilt, aber seine Stirne ist noch breit und platt, seine Ohren an der Basis etwas steif von da aus hängend, die Fahne deutet noch auf die Verwandtschaft mit den Spitzhunden.

Digitized by Google

Die Behaarung ist an Kehle, Hals, Bauch, Schenkeln und Schwanz vorzüglich lang; an Schnautze und Läufen sehr kurz. Das Haar ist mehr oder weniger rauh, im Süden feiner, fast seidenartig, die Farbe meist schwarz, unten heller, gelblich oder weiß, andere sind braun. Häufige Zuchtvarietät vom Orient aus. 145 ist die kalmukkische, schlankere Form dieser Race, 146 die in Deutschland und im Süden vorkommende. Dieser Hund ist gleichsam zum Wächter der Schaafe geboren. Es bedarf nur weniger Einübung, so hält er seine Heerden in Ordnung, treibt alle entlaufene Stücke zusammen und umkreist auch in Abwesenheit des Schäfers unaufhörlich die Heerde. Schon wenn er ein halbes Jahr alt ist, wird er an der Leine mitgenommen; er lernt so leicht, daß er bald jeden Blick und Wink des Schäfers versteht. Er erträgt alle Beschwerden des Hungers und der Witterung und dauert bei guter Behandlung 8 bis 10 Jahre. Jung ist er oft zu scharf und muß gezügelt werden, überhaupt beißig. Es wird noch ein fuchsähnlicher aufgeführt, welchen die Russen noch Pallas: Liska nennen, die Race ist mir zur Zeit noch zweifelhaft und bereits bei den Haushunden erwähnt worden.

578 — 580 zeigt diese Race, wie sie in Cayenne verwildert vorkömmt.

Zweite Race: Pudel-Pudel.

143. 144. Der Pudel: Aquaticus (genuinus et major).

Franz.: le barbet. — Engl.: the water-spaniel. — Russ.: Owtscharka.

Pelz dick, kraus oder wollig, Schwanz ziemlich gerade.

Er heißt auch Barbet und Wasserhund, doch giebt es mehrere Racen welche letztern Namen führen. Der Kopf ist dick und rundlich, die Ohren breit und langhängend, Schnautze kurz und dick, der Leib mit starker Brust, nach hinten abnehmend, doch im vollständigen Pelze dies weniger sichtbar. Die Beine erscheinen dabei kurz und die Schenkel sind in der That kräftig und dick; der Schwanz ist durchaus behaart wie der Leib. Er wird häufig halb abgeschoren, wobei man dem Schwanze eine quastenförmige Gestalt giebt. Farbe weiß oder schwarz, seltner gelblich, braun oder grau. Der Pudel ist durch seine Treue und Gelehrigkeit bekannt und geschätzt, er ist ein munterer Hund, immer lustig und gutmüthig, am meisten zu Wagstücken und Spielen geneigt, Eigenschaften, welche man gewöhnlich mit krausem Haar in Verbindung findet. Besonders zeichnet er sich durch seine Vertrautheit mit dem Elemente des Wassers aus und eignet sich vorzüglich, weil er mit Leichtigkeit und Sicherheit schwimmen kann, deshalb zur Jagd auf Wasservögel und Ottern, auch wird er zum Trüffelsuchen abgerichtet, doch kann er auch zur Hühnerjagd dressirt werden. Er erscheint unter den mittlern Größen.

247. Der Schnürhund: aquaticus funicularius.

Pelz aus Wolle, welche sich in Schnüren dreht, die bis zur Erde herabhängen.

Eine seltene, vielleicht klimatische Varietät aus Portugal und Spanien, nach andern aus Griechenland. Ein großes weißes Exemplar, nach welchem die Abbildung gemacht ist, maß 3 Fuß Länge, die Schnuren an den Ohren 1½ Fuß und die am Leibe über 2 Fuß. Dieses befand sich im Jahre 1834 in Leipzig, ein anderes von schwarzer Farbe, etwas kleiner, dessen Schnüre aber ebenfalls bis zum Boden herabhängen, lebt hier in Dresden.

Digitized by Google

248. 249. Der Schaafpudel: aquaticus lanatus.

Franz.: le barbet à brebis. — Engl.: the Sheep-Spaniel.

Pelz kraushaarig, Ohren kurz und glatthaarig, Schwanz lang und hängend.

Die Race findet sich in der **Campagna di Roma** und dient dort als vortrefflicher Schäferhund. Die Farbe ist meistens weiß, ein Kreis um die Augen und die nackten Theile der Schnautze sind bläulich fleischfarbig. Selten kommen sie bräunlich oder schwarzgefleckt vor.

140. Der Zwergpudel: aquaticus minor.

Franz.: le petit barbet. — Engl.: the small Water-Spaniel.

Wie Pudel, aber weit kleiner. Blendling vom Pudel und kleinem Seidenhund. Selten und nur Schooshund.

139. Der Löwenhund: leoninus Gmelin.

Franz.: le chien-lion. — Engl.: the lion-Dog.

Kopf, Hals und Vorderbeine, so wie die Ohren und Schwanzspitze langhaarig, übrige Theile sehr kurzhaarig. Selten, Zuchtvarietät aus Zwergpudel und Carlshund. Ist Schooshund.

Der Bouffe: buffo.

Ein Bastard von Pudel und Seidenpudel.

137. 138. Der Bologneser oder Maltheserhund: melitaeus Linn.

Griech.: *μελιταῖα κυνίδια* Arist. — Lat.: Melitaei catelli. — Franz.: Bichon, Babiche. — Engl.: the Maltese. — Russ.: Medelaenskaja.

Klein wie Zwergpudel, überall, auch im Gesichte langhaarig, Haare zottig. Sie waren bereits den Griechen und Römern als Schooshunde bekannt. Plinius beschreibt sie so groß als Eichhörnchen und sagte zwischen der Stadt des **Gnidius** und **Illyricum** liegt **Melite**, von welcher nach dem **Callimachus** die Melitäischen Hündchen ihren Namen haben. Man hat indessen in neueren Zeiten darüber gestritten, ob diese im Alter so berühmten Hündchen auf Malta oder auf Meleda einer Insel in dem adriatischen Meerbusen einheimisch gewesen wären; allein das ausdrückliche Zeugniß des Strabo sichert der Insel Malta diesen Ruhm, und ihm pflichtete neuerlich auch Coray in seinem Theophrast bei. S. Böttiger's **Sabina II. 40.** Daß sie bei den Sybariten vorzüglich beliebt gewesen, erzählt **Athenaeus lib. XII.** Plinius sagt schon, daß man sich dieser Hunde zur Linderung der Magenschmerzen zu bedienen pflege, indem man sie auf den Leib lege und dann bemerke wie die Krankheit in sie überginge, da sie davon selbst krank würden, und gemeiniglich stürben. Die geistige Entwickelung, ist wie bei den ähnlichen Racen, sehr gering. Die Schooshunde sind kläffig und knurrig, sie sind die durch Verzärtelung entwürdigten Glieder der edleren Sippschaft.

Digitized by Google

141. 142. Der rauche Pinſcher: gryphus.

Franz.: le griffon. — Engl.: the griffon.

Pelz kürzer und dünner als am Pudel, Schwanz faſt kahl.

Baſtard aus Pudel und Mops, meiſt graulich oder röthlich, auch im Naturell zwiſchen dieſen beiden Racen mitten inneſtehend.

186. Der Trüffelhund: tuberisequus.

Piemont: putta. — Franz.: Chien chercheur des truffles. — Engl.: the truffle Dog.

Ein kleiner Schäferhund. Man pflegt auch kleine Pudel, Hühnerhunde, Dachshunde und Bologneſer zum Trüffelſuchen abzurichten, doch obigen vorzüglich. Dieſe Jagd mit Hunden ſcheint nicht ſo alt zu ſeyn als die mit Schweinen. Der prachtliebende Churfürſt von Sachſen und König von Pohlen August II. ließ im Jahre 1720 zehn Trüffelhunde nebſt Trüffeljägern à 100 Thlr. kommen, denn ſchon im October im J. 1719 hatte ein Schäferhund bei Sedlitz in der Gegend von Dresden Trüffeln aufgefunden. — Um die Hunde abzurichten, läßt man ſie eine in Leinwand eingenähete Trüffel apportiren, ſo verhindert man, daß ſie ſie freſſen. Man verſteckt dann die Trüffel auf dem Felde und läßt ſie vom Hunde bringen, was er bald lernt, ſo daß er ſie dann auch an ihrem natürlichen Standorte nach dem Geruche aufſucht. Die italiäniſchen Trüffelſammler geben ihren Hunden früh etwas Brot, welches in Trüffelöl gekocht worden und ziehen dann mit ihnen auf die Jagd, wo ſie bei jedesmaligem Anmelden eines Fundes wieder Brot erhalten. Man ſchneidet auch Trüffeln klein und bäckt ſie in Butter um ſie an Geruch und Geſchmack zu gewöhnen, gräbt dann eine Trüffel im Walde ein, nach und nach immer tiefer, und läßt ſie von ihnen ſuchen. Bei jedem Fund ſchlägt der Hund an, worauf man eilig bei der Hand ſeyn muß um die Trüffeln in Empfang zu nehmen und den Hund zu belohnen. Man gräbt die Trüffeln mit einem kleinen Spaten aus.

Dritte Race. Bluthund-Spitze.

112. 113. Der Zigeunerhund: zingariorum Walth.

Franz.: le chien des Bohémiens. Heiden-Hund.

Von der Größe eines Spitzes, glatthaarig, fahlgelb bis braun, Ohren ſehr ſpitzig, Schnautze kurz und breitlich, Bruſt breit, Schwanz langgekrümmt.

Eine Race, welcher die heut zu Tage noch in verſchiedenen Welttheilen wilden Hunde, die wir ſogleich aufzählen werden, ſehr nahe ſtehen, und vielleicht von einer oder der andern derſelben, am wahrſcheinlichſten wohl vom Dhole abſtammend. Der Hund iſt der Begleiter der Zigeuner oder Heiden, wie ſie in einigen Gegenden genannt werden, er erſcheint auch als gelehriger Gaukler in den Affenkomödien. — Ihm nahe ſtehen folgende: erſtens: Schakalähnliche:

569 u. 570. Der Spartaner, Dianahund: spartanus s. laconicus Aristot.

Griech.: ἀλοπήκιδες.

Größe wie großer Jagdhund, Kopf vom Windhund, Ohren länger als der halbe Kopf, ſteif aufrecht.

Digitized by Google

Die Griechen hielten diese Hunde für Bastarden von Fuchs und Hund, und nannten sie deshalb Fuchshunde*). Sie wurden als Jagdhunde gebraucht da sie einen scharfen Geruch hatten, dienten aber auch als Hirtenhunde. Diese Race ist die häufigste auf den Antiken aus Herkulanum und Pompeji, sie existirt aber auch noch lebendig, und ich gebe die Abbildung nach dem einzigen Exemplare, welches ich sah. Die Behaarung ist nicht glatt anliegend, sondern locker wie bei dem Spitz und durchaus fuchsfarbig. Das Exemplar schien gutmüthig. Obwohl dieser Hund eine Aehnlichkeit mit den Windhunden, deren Race er unter der Hauptrace der Spitzhunde repräsentirt, durch seinen Wuchs verrieth, so war doch der mehr walzenförmige (und nicht wie bei jenen nach hinten stark zusammengeschnürte oder sich verdünnende) Leib ganz so, wie bei den Spitzhunden. Sein Anstand und seine Bewegungen, so wie die langen Ohren erinnerten an das Reh. Er scheint der eigentliche Hund der Diana.

Der Dohle oder ostindische wilde Hund: **Canis aequinoctialis** ähnelt in der Größe dem Schäferhunde, hat aber im Kopfe mehr den Character des vorigen. Die Haare sind kurz wie bei obigem. Seine Farbe ist graulich, unterseits heller, der Rücken bräunlich, die Seiten und Beine ziehen in Ochergelb. Das Thier steht in seinen Naturell dem Wolfe nahe und ältere Reisende meinten wohl diese Race, wenn sie von den gezähmten Wölfen der Indianer redeten. S. Abbild. Nr. 563.

Der Colsum: **Canis Colsun** ist eine noch weniger bekannte Art wilder Hunde über welche der englische Obrist Sykes berichtet. Sie finden sich in den westlichsten Gegenden Indiens. Als der Obrist eines Tages in Gesellschaft einiger Einwohner an den Ufern des Bhima sich auf der Jagd befand, brachte man ihm ein Exemplar welches ein Jäger so eben erlegt hatte. Man untersuchte und öffnete das noch warme Thier und fand in seinen Magen frisch verzehrtes Wildpret. Der Colsun war 26 Zoll lang und hatte 16 Zoll Höhe, die Hauptfarbe war roth, am Halse, auf der Brust, unter dem Bauche und zwischen den Vorderbeinen minder lebhaft. Das Haar war seidenartig, kurz und glatt, nicht kraus. Verhältnißmäßig sehr klein war der Kopf, er hatte nur 3½ Zoll Länge, der Hals übermäßig lang. Die Vorderbeine haben 5 Zehen, in der Knochenfügung denen des Schakals gleichend, die Ohren breit, gerade aufstehend, an der Wurzel rund. Die Pupillen roth, die Iris braun, die ganzen Züge des Thieres drückten Wildheit aus. Die zugerichtete Haut soll dem Leder des Dammhirsches geglichen haben. Vom Dingo, Dhole, den Hunden von Ceylon und Afrika, so wie vom Schakal unterschied es der Obrist bestimmt. Der Colsun bewohnt die Ufer des Bhima-Schankar und die südlichen Küsten von Makratta. Man findet ihn auch sehr häufig in den Gebirgen von Kitur, in den Bezirken von Balaghat und Heiderabat, in den waldigen Gegenden von Ellur und Radschama-Hendri auf dem Gebiete von Gondscham und an den östlichen Küsten von Koromandel. Er läßt sich mit dem Fuchs vergleichen, hat dieselbe Angriffsweise, auch denselben Hang zum Stehlen. Er geht immer in Gesellschaft, verbirgt sich in die Gebirge und überfällt alle Thiere, denen er begegnet, sogar den Tiger, den er oft, wenn er selbst in starken Heerden beisammen ist, überwältigt. Der Colsun soll unzähmbar seyn, auch bei der besten Behandlung.

Der canadische oder nordamerikanische Hund: **Canis canadensis**, den man bei den Eingebornen Nordamerika's findet, ist zwar wesentlich vom südamerikanischen

*) Quod ex canibus et vulpeculis natae sint.

Digitized by Google

verſchieden, nähert ſich aber mehr der Race, welche auf den Maluinen oder Falklandsinſeln vorkommt*). — S. Abbild. Nr. 567.

Der antarctiſche Hund, Malouinen-Hund Canis antarcticus Penn. Quadrup. t. 29. C. F Malovinicus et culpaeus Walt. Der Culpeu des Molina, der Chili-Fuchs des Shaw. Er iſt grau, die Beine rothgelb, der Schwanz am Ende weiß. Der Malouinenhund iſt größer als der Schakal. Es wurde nur ein Exemplar getödtet als Kapitän Freycinet in der franzöſiſchen Bai an den Malouinen anlegte. Bouguinville brachte das Thier mit, er erzählt, es grabe ſich Höhlen in den Dünen und belle wie ein Hund, die Geſtaltung der Pupille im Auge hat man nicht beachtet. S. Abb. 565 — 568.

Der Durango-Hund: Canis Durangensis in den Höhlen der Berge von Durango in Neubiscaya im ſonſtigen nordamerikaniſchen Spanien. Sie werden ſehr klein beſchrieben, ſie ſollen nicht größer ſein als gewöhnliche Ratten, deren ſchlimmſte Feinde ſie ſind; man ſoll ſie jetzt nach England bringen und anſtatt der Katzen in den Häuſern halten. In dieſem Falle dürften ſie bald näher bekannt werden.

110. 111. Der Dingo, neuholländiſche Hund. Canis Dingo Blumenbach.

Franz.: Le Dingo, le chien de la Nouvelle Hollande. — Engl.: the Dingo, New Holland Dog. — Auſtraliſcher Hund.

Kennzeichen der Art: Der Pelz ſehr dicht, oben fuchsroth und unten weißlich, Ohren aufrecht, ſpitz, Schwanz ein Drittheil ſo lang als der ganze Körper, dichtbuſchig.

Der Dingo hat ziemlich den Wuchs und die Größe des Schäferhundes, der Kopf hat eine ſpitzere Fuchsſchnauze, durch ſeinen dicken Pelz und deſſen Farbe zeigt er überdies faſt das Anſehn des Fuchſes, auch ſeine Ruthe iſt faſt ſo wie deſſen Standare beſchaffen. Das Wollhaar iſt kurz und fein, von grauer Farbe, das lange Oberhaar iſt gröblich und von ihm rührt die Färbung des Thieres her. Die Ruthe zeigt am Skelet 18 Wirbel (bei unſern Hunden meiſt 19.). Die Länge des ausgewachſenen Thieres beträgt von der Naſenſpitze bis zur Wurzel der Ruthe 2 Fuß 5 Zoll engliſch Maas.

Der Dingo lebt in Neuholland und wird ſchon in den Reiſen der Weltumſeegler Dampierre und Cook erwähnt, der Commodor Philipp gab im J. 1789 die erſte Abbildung in London heraus, welcher dann mehrere gefolgt ſind. In neuerer Zeit kam das Thier auch lebendig nach Europa, indem es im zoologiſchen Garten in London, wo unſre Abbildung gefertigt worden, vorhanden iſt und im J. 1806 hatte man bereits ein Exemplar in der Menagerie zu Paris, welches durch Péron und Leſueur bei der Expedition des Kapitän Baudin mitgebracht worden war. Der Dingo ein äußerſt behendes, muthiges Thier, trägt im ſchnellen Laufe den Kopf aufrecht und ſtreckt die Ruthe horizontal aus. Sein Schlaf iſt ruhig und tief, ſeine Muskelkraft übertrifft bei weitem die eines europäiſchen Hundes von gleicher Größe. Wenn er lauſcht, ſo läßt er die Ruthe hängen, in dieſer Stellung iſt er abgebildet. Seine Sinne

*) Der mexicaniſche Hund: Canis mexicanus Linn. Canis silvestris americanus cauda longissima Seba Thesaur I. tab. XXX. f. 1. (nicht 42 F. 2.). Etwas kleiner als der Wolf, röthlichgrau, ſchwärzlich gemiſcht, Schnauze, Unterſeite und Beine weißlich. Iſt nach meiner Anſicht gar kein Hund, ſondern ein den Luxetten verwandtes, vielleicht noch nicht beſtimmtes Thier.

Digitized by Google

scheinen äußerst fein zu sein, allein es dürfte sonderbar genannt werden, daß er nicht schwimmen kann und darum das Wasser flieht. Die Hündin im pariser Garten möchte etwa achtzehn Monate alt sein. Sie lebte frei in dem ihr angewiesenen Raume, allein ungeachtet wiederholter Strafen stahl sie von Geflügel alles, was ihr zu nahe kam. Dasselbe hatte man an einem männlichen Hunde der Art auf dem Schiffe bemerkt, wo er den Strafen endlich unterlag. Für Eigenthumsrecht hat dieser Hund überhaupt durchaus keinen Sinn, auch Barrington erzählt, daß es unmöglich sey, ihn von seinen Anfällen gegen Schaafe, Schweine und Geflügel abzuhalten. Jene Hündin fiel nicht nur alle, auch weit größeren Hunde an, sondern sie sprang auch wüthend gegen die Gitter des Löwen, des Panthers und des Bären, welche mit ihr zugleich in der Menagerie sich befanden, besonders wenn diese Thiere ihr droheten. Diese unkluge und ungemessene Wildheit scheint im Naturell des Thieres zu liegen. Menschen welche ihr mißfielen, besonders Kinder fiel sie ohne Unterschied an und wurde durch die Anwesenheit ihres Wärters, dessen Superiorität sie schon oft gefühlt hatte, keineswegs eingeschüchtert. Daraus erklärt sich, was Watkin-Tirch vom Hasse dieser Thiere gegen die auf Port-Jakson anlandenden Engländer berichtet. Das Thier gehorcht überhaupt niemals der Stimme seines Wärters, Strafe machte es nur noch wilder. Nur den schien es zu begünstigen, der es am längsten frei ließ, ihn erkannte es von fern, machte Freudensprünge und rufte ihm durch einen sanften Klageton zu; sobald er den Käfig öffnete, sprang es mit einem Satze heraus, umging einigemal sein Gefängniß, gleichsam um es zu besehen und kehrte zum Wärter wieder, an dem es dankbar emporsprang und ihm die Hände leckte. Dagegen schien es gefühllos zu seyn gegen Liebkosungen, die ihm gemacht wurden, denn es ertrug dieselben ohne sie zu erwiedern. Die Augen waren ohne Heiterkeit, gewöhnlich verhielt es sich sehr still, aber im Zorne hörte man es drei bis viermal verwirrt knurren. Zur Nahrung nahm es am liebsten rohes Fleisch, doch fraß es auch Brot, aber niemals Fisch. Gern fraß es süße Sachen; was von der Mahlzeit übriggeblieben war, verbarg es. Die Neigung zur Paarung zeigte sich einmal jährlich im Sommer, welcher mit dem Winter in Neuholland zusammenfällt. Das ganze Naturell des Dingo verhält sich zu dem des europäischen Hundes, wie das der menschlichen Bewohner Neuhollands zu denen Europas. Jene sind bekanntlich diejenigen Menschen, bei denen man noch den tiefsten Stand der Wildheit, die geringste Intelligenz antrifft. Was könnte bei ihrer Erziehung ein Hund werden? — Das Exemplar welches nach London kam wurde im Hause eines angesehenen Mannes eingesperrt, es riß sich in der Nacht von der Kette, eilte ins Freie und hatte vor Tagesanbruch mehrere Schaafe getödtet. Der Biß dieser Hunde ist so bösartig daß die Schaafe gewöhnlich an einem einzigen Bisse sterben. Der Dingo verbreitet einen eigenthümlich unangenehmen Geruch, welcher europäische Hunde von ihm abhält. Auch flößt seine Art sich zu vertheidigen, diesen Respect ein.

Der Dingo ist wahrscheinlich über den größten Theil von Neuholland verbreitet. Quoy und Gaimard trafen ihn vom Port Jackson aus bis in die blauen Gebirge. Es ist gleichsam ein halbzahmer Zustand, in welchem er an die wilden Eingebornen Australiens sich anschließt. Er jagt auf die Thiere des Landes, besonders wird er auf die Känguruhs dressirt, und zwar so daß er dieselben in ihrem Laufen oder vielmehr Hüpfen aufhält, um sie herumgeht und sie zum Stillstehen zwingt, bis der Jäger zum Schuß kommt oder sie mit einer Stange niederschlägt. Die Eingebornen machen selbst Jagd

Digitized by Google

auf die Dingos, um sie zu essen und die Jungen zu zähmen. Man hat auch den Dingo mit zahmen Hunderacen gepaart und deren Abkömmlinge zur Jagd auf die dortigen Casuare oder Emeu's und auf Känguruhs besonders geeignet gefunden. Sie sind muthig, zerfleischen aber ihre Beute nicht eigennützig, wie der wildere Dingo zu thun pflegt.

Der sibirische Alpenhund: **Canis alpinus** Pallas oder **Krasnoi Woik** wie er im östlichen Sibirien heist, gehört auch noch unter die wenig bekannten wilden Hunde. Auch er steht in sehr naher Verwandtschaft mit dem Fuchs und gehört wahrscheinlich in dessen Abtheilung; seine Farbe ist fuchsroth, Kehle und Unterseite des Leibes weiß, die Standare sehr dickhaarig, mit schwarzer Spitze. Pallas sahe Felle aus Udskoi Ostrog, gegen die Ostküste des Oceans gelegen und aus der obern Gegend der Lena, ein ähnliches Thier wild auf den Gebirgen um die Quellen des Jenisei. Auch außerhalb Sibirien soll der Alpenhund vorkommen wie diejenigen berichten, welche an der chinesischen Grenze Beobachtungen anstellten. Pesteref (im Journal von Rußland 1794. Januar S. 34.) sagt daß diese Thiere, die er rothgelbe Wölfe nannte, und wilde Alpenziegen zusammen Züge in die schmalen und abschüßigen Vorberge machten, wo dann diese gezwungen, würden durch einen Sprung sich zu tödten, wodurch sie jenen zur Beute würden. Die Alpenhunde kommen auch den Schakals nahe, und es läßt sich erwarten, daß sie auch mit den Haushunden paarungsfähig seyn werden.

Nach Fellen, welche durch v. Billings vom Fluß Uda gebracht wurden, beschreibt sie Pallas folgendermaßen. Der Kopf scheint eine sehr spitzige Schnautze zu haben, wie der Fuchs, übrigens ganz kurz behaart, satt rothgelb, Rand der Oberlippe, Unterkinnlade und Kehle weiß, Ohren mittelmäßig, weichzottig, verloschner rothgelb, Schnurren mittelmäßig, gelbbraunröthlich, Augenlieder behaart, kaum der Rand nackt und schwärzlich. Das Haar lang, straff wie am Wolf, hoch fuchsroth, auf dem Rücken noch gesättigter, gegen die Seiten heller. Unterseits längshin schmuzigweiß. Gliedmaßen mit den Hüften außen blaßröthlichgelb, innerseits weiß, Vorderbeine fünfzehig, Daumen entfernt, mit starker sichelförmiger, schwarzer Klaue, an den übrigen fehlten die Klauen. Schwanz sehr zottig, lockerer als am Fuchs, Haar straffer, fast wie am Bär, ziemlich 6 Zoll lang, rothgelb mit längeren schwarzen Haaren schattirt, an der Spitze ganz schwarz. Von der Nase bis zur Schwanzwurzel 3 Fuß, 9 Zoll, 6 Linien lang, die Haare an der Schwanzspitze über 6 Zoll lang, die Schwanzruthe ohne Haar 1 Fuß 3 Zoll 6 Linien, Schulterhöhe 1 Fuß 6 Zoll.

Der Fuchsspitz: **alopecurus** Walth. Fuchsroth, im Gesicht schwarz, der Schwanz eine wahre Fuchsstandare, die er immer gekrümmt trägt. Selten, wird für Bastard von Fuchs und Pommer gehalten. Er ist mir noch nicht vorgekommen. Pallas spricht auch von einem zottigen Zwerghunde (**canis pumilus villosus**) meist von röthlicher Farbe, den man fast für einen Fuchsbastard halten möchte.

114 und 115. Der Heide-Spitz: campestris Bchst.

Franz.: le chien champêtre.

Kleiner, niedriggebauter Spitz von sehr glattem Haar und fuchsrother oder erbsgelber Farbe mit dünnem Fahnenschwanz. Auf den Dörfern in dürren Heidegegenden, ein kläffiger, beißiger Hund. 116 ist Bastard mit Dachshund.

Digitized by Google

Der javanische Wolf, dem Leschenault mitgebracht hat, ist auch noch nicht näher bekannt. Er gleicht in Größe und Proportionen dem gemeinen Wolf, seine Ohren sind kleiner, der Rücken zieht aus röthlichgelbbraun in das Schwärzliche, ebenso sind Pfoten nnd Schwanz gefärbt.

Der graue Hund oder Wolf von Paraguay, Guaracha der Brasilianer, wahrscheinlich der **Aguarachay** des **Azara**. Graubräunlich, Schnautze und Beine schwarzbraun, Schwanz lang und dicht polsterartig, oben und an der Spitze schwarz. Nach **Desmoulains** soll **Azara's** Abbildung (unsre Nr. 98) hierher gehören.

Der nackte mexicanische Hund: **Xoloitzcuintli**. Sehr großer hundsähnlicher, ganz haarloser Wolf, war in Mexico einheimisch (v. Humboldts Ansichten S. 91.) Er wird über 3 Fuß lang, die nackte Haut hat gelbrothe Flecke, wurde von den eingebornen Amerikanern verschnitten und gemästet, das Fleisch wird hochgeschätzt, wie Schöpsenfleisch bezahlt, auch die Missionäre fanden es wohlschmeckend.

Vierte Race. Jagdhund-Spitze, Kopf und Beine besonders kräftig, denen der Jagdhundracen ähnlich.

576 — 577. Der salzburgische Doggenspitz: Salisburgensis.

Der baiersche Wolfshund oder Barbet Goetz.

So groß wie englische Dogge, deren Kopf und Pfoten, Haar langzottig.

Auf dem ersten Anblick dem Wolfshunde ähnlich aber von allen bisherigen durch den dicken Kopf, die hängenden Lippen, die starke Brust und den sehr verschmächtichten Hinterleib zu unterscheiden. Eine Race von ausgezeichneter Größe und Kraft, welche entweder durch Vermischung von Wolfshunden und Doggen entstanden ist oder vielleicht gar vom Albaneser abstammt. Die Farbe ist schwarz und weiß, auch weiß mit schwarzen Flecken oder aschfarbig und dunkelbraun. Der Hund ist gutartig, etwas pflegmatisch und unbeholfen, und nimmt sich nicht die Mühe kleinere Hunde anzusehen. Er liebt auch fließendes Wasser und schwimmt. Er ist so stark, daß er ein starkes Pferd oder einen starken Ochsen niederreißen kann. Der verstorbene Großherzog von Weimar erhielt mehrere dergl. Hunde vom König Maximilian von Baiern. Sie werden als Wächter der Viehherden gehalten. Die Ohren sind kurz und aufrecht, die Ruthe fehlt meist von der Geburt an. Durch Theod. Götz ist diese Race bekannter geworden. Er versichert daß, ein auf einer Meisterei gestorbenes Exemplar anderthalb Centner gewogen habe. In der Natur dieser Thiere ist vieles, was auf eine Verwandtschaft mit dem folgenden hindeutet. Sie stammen aus den Salzburgischen Alpen.

555. Der Albaneser: Albanus.

Der größte bekannte Hund, Kopf 1 Fuß, Kopf und Leib 4 Fuß 4¼ Zoll Par. Maas lang, sitzend 3 Fuß 3¼ Zoll hoch, Form eines höchst kräftigen Wolfshundes, Hals und einige Parthiendes Leibes zottig, Beine und Pfoten vorzüglich kräftig, Ohren etwas breit und aufrecht. Brustumfang 4½ Fuß.

Alexander der Große erhielt bekanntlich*) einen dieser ungeheuren Hunde vom Könige Albaniens zur Zeit, als er seinen Zug nach Indien begann, und um ihn zu prüfen, ließ er Bären, Eber und Dannhirsche los. Der Hund blieb ruhig, ohne sich zu

*) Plin. hist. nat. ed. Gron. VIII. Cap. 40. ed. Hard. et Franzii VIII. 61.

Digitized by Google

rühren und Alexander wurde darüber ſo ungehalten, daß er den faulen Coloß tödten ließ. Der König von Albanien erfuhr dies, ſendete ihm einen zweiten und ließ ihm dabei ſagen, er möge nur dieſen an größern Thieren, Löwen und Elephanten verſuchen, denn mit ſo kleinen Thieren nähme ſich dieſe Art die Mühe nicht; wenn er aber dieſen wieder tödten laſſe, ſo könne er ihm keinen wieder geben, denn er habe ſelbſt keinen mehr. Man ließ nun einen Löwen los, auf dieſen ſprang der Hund an und zerriß ihn nach geſchicktem Angriff zur höchſten Beluſtigung der Zuſchauer, denn der Boden krachte während des Kampfes. Nach dieſem Hunde fertigte wahrſcheinlich der Hofbildhauer Alexander Lyſippus einen Erzabguß, von welchem wieder andere Nachbildungen in Marmor in Italien gemacht worden ſind. Ein trefflicher Gypsabguß befindet ſich hier im Mengſiſchen Muſeum, nach dieſem iſt unſere Abbildung gefertigt. Strabo hatte von den großen thibetaniſchen Bullenbeißern (unſre 222 — 224.) gehört und verwechſelte dieſe mit dem Albaneſer, den er deshalb einen indiſchen Hund nennt. Solinus u. a. haben wohl richtiger gedeutet. Dagegen iſt die größte Wahrſcheinlichkeit vorhanden, daß dieſelbe Race die iſt, welche ſpäter unter dem Namen Moloſſus von Epirus aus hoch gerühmt worden iſt*). Der ehrwürdige Böttiger beſchreibt unſern Abguß (Zeit. f. d. eleg. Welt 1825. Nr. 112.) und ſagt: „es iſt ein impoſantes, characteriſtiſches Thier! das alte: cave canem! iſt ihm auf der gewaltigen Stirn geſchrieben. Ein ſolcher Packan konnte wohl ſelbſt einen Elephanten feſthalten.“

Wem wäre es zu verargen, wenn er auf die Idee käme, dieſen Moloſſus für den Stammvater der Hunde zu halten; auch er wäre aus der Nähe Caucaſiens entſproſſen! Es mögen auch heut zu Tage in Albanien und Macedonien tüchtige Hunde hauſen, ſie ſind aber leider von den Reiſenden, wie in vielen andern Ländern zu wenig beachtet. — Dieſe Race erinnert an den gigantiſchen Hund der Vorwelt, deſſen Cuvier gedenkt: Canis giganteus G. Cuv. osseu. foos. IV. p. 466. t. 31. F. 20. 21. im Tertiärgebilde bei Auaray gefunden.

Dritte Race. Bluthund-Pudel: Kopf und ausgeſtreckter Schwanz der Bluthunde.

147. 148. Der Calabreſenhund, Abbruzzenhund: calabricus.

Franz.: le chien berger de Naples. — Engl.: the Calabrian Dog, the Neapolitan Shepherds Dog.

Groß, langhaarig, Schnauze, Ohren und Pfoten kurzhaarig, Fahne lang, geſtreckt.

Der ſchöne Abbruzzenhund ſoll durch Verpaarung des ſpaniſchen Seidenhundes oder vielleicht des obigen Schäferhundes, mit dem großen däniſchen entſtanden ſeyn. Die Farbe iſt weiß und das Exemplar, welches ich bei der Zeichnung vor mir hatte, war äußerſt gutmüthig, man hörte es faſt niemals bellen. In den Gebirgsgegenden Unteritaliens, in den rauhen Abbruzzen kann man nur Schaafe ernähren, die man in großen Heerden hält und im Winter in Pferche hinter den ärmlichen Wohnungen zuſammentreibt, um ſie dann in der wilden Jahreszeit wieder auf die Berge und in die Thäler zur Weide zu ſenden. Im wilden Gebirge hauſen Wölfe, zu deren Schutz bedarf es ſo kräftiger Hunde, als dieſe ſind, welche wir jetzt betrachten. Sie werden deshalb in großer Anzahl gehalten, umgehen beſtändig die Wohnungen und Heerden und fallen ge-

*) Horatii epod. 6. 5. et satyr. 2. 6. 114. Virg. georg. 3. 405.

Digitized by Google

gen Fremde mit drohendem Gebell aus, lassen sich aber durch ruhiges Verhalten bald wieder besänftigen.

Vierte Race. Jagdhundpudel: Kopf von Jagdhundracen, aus deren Vermischung sie entstanden sind.

246. Der Burgos: Burgensis s. extrario ⋌ vertagus. Seidendächsel, seidenhaariger Dachshund, Hündchen von Burgos.

Franz.: le Burgos. — Engl.: the Burgos.

Leib des Dachshundes: lang und kurzbeinig, Kleid des Seidenhundes.

Der Wuchs des Dachshundes ist leicht zu erkennen, auch hat das schöne Haar meistens dessen Farbe, obenher schön schwarzglänzend, unterseits rostfarbig oder weißlich. Kommt von verschiedenen Größen vor, meist ziemlich klein, wie man dgl. in Paris zur Zeit der prachtliebenden Könige erzog. Sie bellten wie Füchse. Der Name ist ihnen von der spanischen Provinz Burgos und zwar von deren Hauptstadt gegeben worden.

150. Der große spanische Seidenhund: extrarius major.

Franz.: l'Epagneull — Engl.: the Spaniel. — Großer spanischer Seidenhund oder Seidenpudel und großer Wachtelhund.

Kopf vom dünnschnautzigen Jagdhund, Leib, Ohren und Hinterrand der Beine zottig, Fahnenschwanz kurz und ausgestreckt.

Blendling aus dünnschnautzigem Jagdhund und Seidenhund. Weiß oder gefleckt.

245. Der Pudel-Wachtelhund, krause Seidenhund: extrarius crispus s. anglicus major.

Franz.: l'Epagneull anglois. — Engl.: the english Spaniel. Spaniel-gentle or Comforter.

Kopf vom dünnschnautzigen Jagdhund oder Pudel. Mittelgroß, weiß oder gefleckt. Wird in England zur kleinen Jagd gebraucht.

Dritte Hauptrace. Bluthunde. Canis familiaris laniarius.

Kennzeichen: Schädel länglich, Schnauze lang-kegelförmig, Ohren schmal, von der aufrechten Basis aus hängend, spitzlich.

Erste Race. Spitzbluthunde: Wuchs des Windhundes, Kleid und gebogener Schwanz des Schäferspitzes.

163. 164. Der Jaroslavische Hund, russische oder zottige Windhund: jaroslavensis, grajus villosus s. rossicus Desmar.

Franz.: le levrier russe. — Engl.: the russian, oriental Greyhound. — Russ.: Borsaja Jarolafskaja.

Unter obigen Kennzeichen erscheint nur diese eine Race, sie ist von bedeutender Größe und Kraft, und wird bis drei Fuß hoch. Dies ist die geschätzteste erste Race in der russischen Monarchie, besonders kommt sie in Caucasien und der Krimm, in dieser Wiege des edelsten Menschenstammes vor, zeichnet sich durch ihren schlanken Anstand und Behendigkeit aus. Sie werden zur Jagd auf Hasen, Rehe, Hirsche und

Digitized by Google

Wölfe gebraucht. Die Race scheint aus einer Paarung des großen Windhundes mit dem orientalischen Schäferspitz entstanden zu seyn.

Zweite Race. Pudel-Bluthunde: Mittelwuchs zwischen Pudel und Fleischerhund, Behang etwas breiter und zottig.

173. 174. Der Rüde, Saurüde, Schweinsrüde: Rudo Car. Magn. porcaritius Leg. Allem. Cap. LXXXIII. suillus Gm.

Franz.: le Matin-cochon. Heißt auch Saupacker.

Groß, plump pudelähnlich gebaut, Kopf stark, Stirn flach, Leib vorn sehr stark, nach hinten nimmt der Leib deutlich ab, das Haar ist ungleich, grob, zottig oder kraus, ebenso der ziemlich breite Behang und die ziemlich gerade Ruthe. Der Rüdenhund ist eine der ältesten Racen; aus der Zeit der alten deutschen Urwälder, durch welche der Wiederhall seines furchtbaren Gebelles ertönte, haben sich nur wenige dieser Thiere bis auf unsere Zeit verpflanzt. Die Rüden der Alten waren vielleicht durch das Leben in den rauhen Wäldern umgewandelte Abkömmlinge der Ur-Race, deutsche Nationalhunde, welche man späterhin auch durch Verpaarung von Schäferpudeln und Fleischerhunden zu ersetzen versucht hat. Der Rüde steht in unmittelbarer Beziehung zu dem wilden Schweine, er ist der kräftige Hund, welcher dem Saufinder mitgegeben wird, um das Schwein zu fassen und festzuhalten, bis der Abfang geschieht. Heut zu Tage wird er durch Jagdhundracen vertreten. So gehört der Rüde bereits unter die ausgestorbenen Thiere der Vorzeit. Dem Naturell nach war der Rüde der roheste Hund, auf mannigfaltige Weise den Thieren verähnlicht, deren Vorbild seiner Einbildungskraft unabläßig vorschwebte.

Dritte Race. Eigentliche Blut- oder Wind-Hunde: Kopf am meisten verlängert, Leib sehr schlank und nach hinten verschmächtigt, Beine dünn.

151 — 153. Der afrikanische Bluthund, ägyptische Hund: aegyptius Linn.

Franz.: Chien d'Egypte, d'Afrique, chien turc Buff. — Engl.: the african Bloodhound the Barbary Dog, the Egyptian Dog. — Ruff.: Egipetskaja oder Turczkaja. = Mexican.: perro chinesco oder chino.

Bau etwas gedrungener als am Windhund, Haut nackt dunkel fleischfarbig, in's Schwärzliche übergehend.

Mittelgroß, meist kleiner als Fuchs, auffallend durch den Mangel der Behaarung, indem sich nur um das Maul herum, in der Nähe des Schwanzes und an den Beinen einzelne Haare befinden. Diese Hunde stammen aus dem Innern von Afrika, von woher dergleichen durch den Colonel Denham nach London gebracht wurden. Man nennt sie auch Guineahunde, weil sie von Guinea mit den Sklavenschiffen gewöhnlich nach Westindien gebracht werden. Im Norden von Afrika, in der Barbarei und in der Türkei sind sie nicht selten und befinden sich daselbst ebenso wie in Westindien (von Humbold sahe sie besonders häufig von schwarzer Farbe in Quito und Peru) und Südeuropa wohl. Pallas sagt von ihnen, daß sie in Südrußland, hier und da bis Sibirien gleichfalls, oft ungeschwänzt, weis oder schwarz, auch als Bastarde mit behaarten Ohren und Schwanze vorkommen. In unserem Clima halten sie nicht lange aus. Ich hatte zweimal einen dergleichen Hund, von denen der eine ein paar Jahre auf der Insel Trinidad gelebt hatte. Sie waren äußerst gutmüthig und wachsam, bellten selten, aber dann heftig gegen Fremde, zitterten aber oft an den wärmsten Tagen vor Kälte. Bei der sorgfältigsten Pflez und einer warmen Haltung bekamen

Digitized by Google

sie gegen den Herbst heftige catarrhalische Zufälle, beständiges Husten und Niesen, Gliederreißen und Lähmungen, bis sie starben. Die treulichste Anhänglichkeit bewiesen sie bis zu dem letzten Augenblicke, indem sie, schon des Gebrauchs der Glieder beraubt, mir entgegenkrochen, sobald sie meine Stimme hörten oder mich in ihrer Nähe bemerkten. Die Haut hatte, als sie nach Europa kamen, eine schwärzliche Farbe und verfärbte sich nach und nach, so daß sie fleischröthlich graulich wurde. — Nach dem Bericht von Mr. Cops werden sie in Afrika zur Gazellenjagd gebraucht, wozu sie besonders Talent zeigen. Sie sind unermüdet in Verfolgung der Spur und halten darin nicht nur eine, sondern zwei Stunden aus. Nicht selten machen sie Abwege um dann von da aus das fliehende Wild desto schneller und sichrer einholen zu können. Man dressirt sie besonders um dieser Eigenschaft willen. Sie sind durch Bau und Beweglichkeit wahre Muster zu nennen, und wer ihre Brauchbarkeit kennt, wird finden, daß sie unsere europäischen Hühnerhunde noch übertreffen. Sie scheinen sich noch nicht mit solchen Racen vermischt zu haben, welche eine für die Jagd in Europa passende Nachkommenschaft erwarten ließen. Daß man in Südamerika diesen Hund als chinesisches Product ansieht, geht schon aus der mexicanischen Benennung hervor.

154. Gemähnter afrikanischer Hund: aegyptius subjubatus.

Franz.: le chien turc métis. — Engl.: Barbary dog with mane.

Bastard vom kleinen dänischen Hunde mit voriger Race, erscheint mehr oder minder, besonders am Halse behaart.

155. Zottigohriger afrikanischer Hund: aegyptius lasiotus.

Franz.: le chien turc et gredin Buff.

Bastard des afrikanischen Hundes mit dem Seidenhunde. Mehr oder minder an den Vordertheilen und dem Schwanze behaart.

582. Der Buckelhund: gibbosus.

Mexic.: Itzcuinteporzotli Hernandez, Itzcuinte-potzoli Humb.

Kopf klein, Leib übermäßig dick mit Schulterhöcker, Haut nackt. Diese mexicanische Race war früherhin nur aus Hernandez bekannt, wurde aber neuerlich, wie Griffith bezeugt, nach England gebracht und eben so gefunden. Die Größe wird nicht angegeben, die Farbe ist röthlichgelb, Schnautze, Stirn, Augenbögen, Beine und Schwanz weißlich, der Leib übrigens schwärzlich gefleckt.

Linnée verwechselte nach v. Humboldts Versicherung diesen Hund mit dem stummen Hunde, und andere, auch Griffith ziehen ihn fälschlich mit dem Alco zusammen.

156 — 158. Das Windspiel, der kleine Windhund, Hasenhund: leporarius.

Im Mittelalter lateinisch: veltrus, velthrus, veltraus, veltrahus, veltagra, veltrarius, veltrix, veltrus leporalis, argutorius (lex Sal. T. XVI. §. 2.), odorisequus (Constit. reg. Kanuti.) veltra, spartus (Carol. Magn.) — mittelalt. deutsch: Welter, Wint. Solofanger. — ital.: veltra, veltro, cane veltra. — Alle diese Namen mochten theilweise mit für die folgenden gelten, heißt jetzt auch italiänischer oder englischer Windhund. — Franz.: levron altfranz.: vaulte, vaultroy, vaultroit. — Engl. the italian Greyhound.

Größe des Fuchses oder kleiner, vom schlanksten Bau, Haar sehr kurz und glatt anliegend.

Digitized by Google

Die Schlankheit im ganzen Baue giebt ihnen ein äußerst zierliches Ansehn, um so mehr, als alle Theile in schönem Verhältnisse stehen. Die Fleischpartieen sind so zart, daß man die Muskellagen, so wie das unter ihnen liegende Knochengebäude deutlich sieht. Der Hals ist verhältnißmäßig lang, der Leib nach hinten sehr verschmächtigt, Beine und Schwanz außerordentlich dünn. Die Farbe ist gewöhnlich ledergelb oder aschgraulich, dann aber auch von diesen Farben oder wenn sie zwischen Jagd- und Hühnerhunden gehalten werden, auch weiß und schwarz gefärbt. Sie sind eine der ältesten und edelsten Racen, welche sich bei den Scythen fand und bereits in den Antiken der Griechen und Römer vorkömmt, und vielleicht vom Spartaner (vergl. Nr. 569. 570.) durch Vermischung mit dem afrikanischen nackten Hunde abstammend, denn ich halte den Spartaner für älter, wegen der dem Urtypus zufolge naturgemäßer aufrechtstehenden Ohren.

Bei den Windhunden bemerken wir einen ganz eignen Typus im Bau des ganzen Körpers. Derselbe beginnt mit Verflachung der Stirn, welche dadurch hervorgebracht wird, daß die Stirnhöhlen geschwunden sind. Diese an der Basis befindlichen Knochenhöhlen sind mit einer Schleimhaut ausgekleidet, welche mit der Nasenschleimhaut in Verbindung steht und darum mit ihren Größenverhältnissen zur Bedingung der Stärke des Geruchs beiträgt. Es wird hieraus erklärlich, weshalb die Spürkraft der eigentlichen Windhunde der der Jagdhunde nicht gleichkommt. So wie aber in der Natur eine gewisse Verkümmerung mit anderweitigen höhern Entwickelungen in Verbindung erscheint, so ist auch bei den Windhunden Gesicht und Gehör außerordentlich scharf. Auch ihr äußeres Ohr ist eigenthümlich von dem der übrigen Hunde abweichend, denn es ist noch so frei beweglich wie bei den Spitzhunden, ebenso schmal, aber halb d. h. von der Mitte aus also nur mit dem Obertheile überhängend. Sie stehen demnach in der nächsten Verwandtschaft mit dem Spartaner. Die reinen Windhunde haben keine fünfte Zehe, ihre Geschlechtsorgane sind auch weniger ausgebildet als bei andern Racen, ihre Fortpflanzung beschränkter. Aus der schmalen Form und geringen Masse ihres Gehirns erklärt sich die geringe Erziehungsfähigkeit dieser Hunde. Das was andern Hunden leicht beizubringen ist, fassen die Windhunde nur nach langer Bemühung. Sie wissen indessen eine gute Behandlung anzuerkennen und legen dafür ihre Freude durch lebhafte Bewegungen sogleich an den Tag, nur zeichnen sie damit nicht ihren Herrn aus, sondern spenden dieselben Liebkosungen auch einem jeden andern, daher sie weniger treu sind, nur dankbar, oft falsch und beißig. Sie bellen selten, ihre Stimme ist eigentlich mehr ein Kläffen, sie lassen uns dies nicht oft hören. Sie sind trotz ihrer Schlankheit sehr kräftig und richten daher andere Hunde oft tüchtig zu. Den jungen Windhunden verschneidet man die Nägel, wodurch sie in den Stand gesetzt werden, leichter zu laufen. Wenn der Windhund anderthalb Jahre alt ist, läßt er sich zur Hetze brauchen, wobei man ihn mit einem alten Windhunde auf ein ebenes, freies Revier bringt, wo es wenig Hasen giebt und hetzt erst nur junge, die nicht weiter als 60 Schritte entfernt sind. Der Jäger jagt ihm zu Pferde nach, und nimmt ihn den Hasen ab. Im Character der Bluthunde zerreißen sie das gefangene Wild gern selbst (anschneiden), weshalb wieder andere abgerichtet sind, dies zu verhüten: ein solcher heißt Retter. Ebenso schätzt man die Solofänger, welche im Stande sind einen Hasen allein zu fangen. Die Jagd mit Windhunden wird indessen wegen Zärtlichkeit der Hunde nur im September und October und wegen ihres Nachtheiles auch nur selten ausgeübt und ist sogar gewöhnlich ver-

Digitized by Google

boten. Das meiste, was hier gesagt worden, gilt besonders noch von den großen Windhunden, welche jetzt folgen.

159 — 162. Der große Windhund: grajus leporarius maximus.

Franz.: le grand levrier. — Engl.: the Irish and scotish Greyhound. — übrige Namen s. oben.

Im Wuchs dem vorigen ähnlich, doch bedeutend groß.

Diese Race ist dem Ansehen nach eine der edelsten, bei dem Baue des vorigen erreicht sie die Größe der englischen Doggen, mit Beibehaltung des äußerst zierlichen Anstandes. Die irländischen Windhunde sollen nach Griffith eine Höhe von 4 Fuß erreichen. Diese Hunde stammen mit Wahrscheinlichkeit aus dem Orient und leiten ihren Ursprung von der daselbst noch heut zu Tage anzutreffenden verwilderten Race, den Constantinopolitanischen oder Cairohunden, Nr. 584 — 588. Sie treten unter mehreren Abänderungen auf. Kräftige Formen derselben sind die glatthaarigen sogenannten irländischen Windhunde wie Nr. 159 und 161. Die schlaffhaarigen, rauhen schottischen wie 162. Unter ihnen finden wir vorzüglich die Jagdhunde der Tataren und anderer Scythen-Völker. In den Scythischen Ländern sind sie so stark, daß man Löwen und Tiger mit ihnen hetzen könnte. Sie werden daselbst auch zu Beschützung der Heerden gebraucht. In Curland erhalten sie nur Wasser und trocknes Brod, damit sie schlank bleiben, man gewöhnt sie am Hetzriemen stets neben den Pferden herbei zu laufen. Wenn die oben erwähnte Erscheinung, daß die Windhunde das gefangene Wild, sobald sie die Jäger entfernt wissen, plötzlich selbst zerreißen, aus den Naturtrieben der Bluthunde leicht zu erklären ist, so scheint die Eigenthümlichkeit der sogenannten Retter schwerer erklärbar, denn es muß Bewunderung erregen, wenn deren Sorge für Sicherung des von den andern gefangenen Wildes so weit geht, daß sie sich darüber hinstrecken, die andern drohend abhalten und ängstlich nach dem Jäger rufen und winseln. Meist ist dies Folge der Dressur, aber eine individuelle Anlage für dies Benehmen ist nicht zu leugnen. — Die Griechen und Römer kannten eine dieser sehr ähnliche Race, aus ihr und jenen oben betrachteten Spartanern und Lycisken scheinen sie ihre gewöhnlichen Jagdhunde gezogen zu haben, denn nur diese findet man bei dem Studium der antiken Denkmäler, nicht unsre Jagdhunde.

161. 584 — 588. Der türkische Windhund: grajus s. leporarius turcicus.

Franz.: le levrier turc. — Engl.: the turkish Greyhound.

Ueberaus dürr, an den Ohren und an einzelnen Parthien des Leibes zottig, meistens schmutzig weiß mit großen gelblichen Flecken, seltner braun und schwarz gefleckt oder ganz dunkelfarbig.

Die bekannte verwilderte Race im Orient, die herrenlosen Hunde der Türken.

Diese Hunde erscheinen bereits, wenn man bei Neu-Orsova jenseits der Donau das türkische Gebiet betritt. Sie halten sich in Städten und Dörfern, überhaupt an von Menschen bewohnten Orten auf, und nur von den religiösen Ansichten der Bewohner hängt ihr verwilderter Zustand ab. Das Gesetz Mahomeds verbietet dem Muselmanne, diese unreinen Thiere zu berühren oder dieselben in sein Haus aufzunehmen, aber es verbietet ihnen auch, sie zu mißhandeln oder gar sie zu tödten. Auf diese Weise vermehren sie sich ungestört, sind aber auch genöthigt, für ihren Unterhalt selbst zu sor-

Digitized by Google

gen. Sie erfüllen dennoch die ursprüngliche Bestimmung des Raubthieres um so mehr, da sie nicht nur alle Arten von Aas, sondern auch andere ekelhafte thierische Auswürfe, welche aus den Häusern auf die Straße gelangen, verzehren. Ihr beständiger Aufenthalt unter freiem Himmel und der gänzliche Mangel einer Erziehung, läßt indessen ihr Naturell in seiner ganzen Rohheit hervorstechen. Sie treiben sich heerdenweise auf den Gassen herum und halten ihre Reviere so, daß die Hunde verschiedener Stadttheile in beständigem Kampfe sind, sie zertheilen in größter Schnelligkeit die gefallenen Kameele, Pferde, Esel oder andere Thiere, welche der Muselmann unberührt auf der Straße liegen läßt, und tragen sie stückweise nach ihren Schlupfwinkeln, und feiern ihre beste Mahlzeit bei den Schlächtern, welche das Blut aller geschlachteten Thiere auf die Straßen laufen lassen und die unedleren Eingeweide ihnen vorwerfen. Aber nicht immer und nicht in allen Stadttheilen giebt es solche Leute, daher die Erhaltung dieser Thiere, besonders wenn sie sich stark vermehrt haben, sehr unsicher ist, so daß sie abhungern und gewöhnlich dürr und häßlich aussehen. Dergleichen heißhungrige Hunde sind für den Fremden eine der größten Plagen, denn diesen wissen sie vom Muselmann wohl zu unterscheiden und folgen ihm auf jedem Tritte mit gräßlichem Geheul. Vertheidigung gegen sie verschlimmert das Uebel, denn einer ruft mehrere zusammen, so daß bald die Hunde des ganzen Bezirks beisammen sind, und den Angegriffenen bellend verfolgen. Auch für die Folge wird dies nicht vergessen und der Beleidiger setzt sich, so oft er sich wieder blicken läßt, neuen Anfällen aus. Die Bewohner selbst ahnden es ernst, wenn diesen Hunden jemand ein Leid zufügen wollte, da sie dieselben treulich beschützen und wenn sie krank sind auch verpflegen, so wie in der heißen Jahreszeit mit Wasser versorgen und ihnen, wenn sie Junge haben, Obdach gewähren; auf diese Weise sieht der Fremde durch unkluge Angriffe auf diese Thiere, sein Leben doppelt gefährdet. In der Stille der Nacht erschallt das Jammergeheul dieser Hunde auf den Straßen, und aus den entlegensten Punkten tönt es durch andre wieder, wie ein Lauffeuer durch die Straßen sich fortsetzend. Beispiele, daß durch dergleichen halb wilde Hunde Menschen zerrissen wurden, sind nicht selten und haben sich bis in die neueste Zeit wiederholt; schon aus dieser Ursache pflegt auch jeder anständige Fremde in diesen Städten abends zu fahren, oder wenigstens zu reiten. Diese Hunde werden niemals von der Wuth befallen, wahrscheinlich weil sie im Paarungstriebe nicht gehemmt sind, auch vielleicht wohl, weil sie die ihnen angemessene Nahrung, rohes Fleisch und frisches Blut genießen können.

Jung aufgezogen und von Menschen gepflegt, erscheint der türkische Windhund unter einer edleren Form S. Nr. 161., während die Abbildung Nr. 584—588. eine Gruppe wilder Thiere dieser Art vorstellt. Auch diesen fehlen keineswegs die guten Eigenschaften der Hundenatur. Sie sind die treuesten Wächter der Häuser und Stadtdistrikte, welche ihnen Aufenthalt und Nahrung bieten, und gehorchen dem Worte der Bewohner derselben so pünktlich, als vollkommen zahme Verwandte. Wird ein Fremder von einer Meute derselben angefallen, so kann ihn ein Türke durch das einzige Commandowort „husch!" retten, worauf sie alle auseinanderfahren. Aber ebenso, wie sie Beleidigungen in der Erinnerung bewahren, sind sie auch gegen Wohlthaten dankbar, denn ein Fremder, welcher ihnen nur einmal vor einem Bäckerladen durch Vertheilung eines Brotkuchen einen Schmauß gab, hat sie alle zu Freunden.

Digitized by Google

Vierte Race. Jagdhund-Bluthunde: in Wuchs und Haltung dem Jagdhunde verähnlicht, zum Theil aus Vermischung mit Racen seiner Hauptrace abstammend, Pfoten vorzüglich kräftig, Spur schärfer als bei vorigen.

170 — 172. Der Fleischerhund, Metzger-Schlächter-Hund: laniarius.

Wahrscheinlich begriffen unter ὁ οἰχουρὸς, οἰχοφύλαξ und villaticus Col. VII. 12. — Deutsch im zehnten Säculo: Hovawart, Hofwart (vom sächsischen Worte Hov oder Hof und Wart d. i. Wächter, qui curtem defendit Leg. Allem.) — Franz.: le matin.

Ziemlich groß, Kopf lang und mager, Ohren (des Windhundes) schmal, erst über der Basis überhängend, Haar kurz und steif, glatt und dicht anliegend, Leib nach hinten nur wenig verschmächtigt, Ursprünglich schwarz und unten rostgelb, dann in alle übrige Färbungen übergehend, auch gefleckt.

Man sieht diesen Hund selten unverstümmelt, gewöhnlich sind ihm die Ohren und die Ruthe in der Jugend abgeschlagen, die Ruthe ist ursprünglich ziemlich dick und wenig gebogen, die Beine verhältnißmäßig kürzer als bei vorigen und dicker. Die Race gehört unter die ältesten und unedleren. Die niedrigstehende, geistige Entwicklung in Verbindung mit seinem Pflegma, lassen ihn nur die niedern Dienste des Hundes, Bewachung von Haus und Hof und Heerde verrichten. Hierin ist er unermüdet wachsam und wegen seiner Kraft auch zur Vertheidigung geeignet. Man findet ihn als den gewöhnlichsten Kettenhund; zur Nachtzeit losgelassen umgeht er seinen Distrikt und bellt, sobald ihm etwas Verdächtiges aufstößt. Er ist übrigens ungelehrig und vorzüglich an der Kette beißig. Er ist als Viehhund, vorzüglich für die Rinder, passend und hängt sich, wie der Bullenbeißer, wilden Ochsen an das Maul, in das er sich einbeißt. Nach den alten Gesetzen wurde er weniger geschätzt, als die edleren Racen, besonders die der Jagdhunde.

Die französischen **Matins** Nr. 172 sind meist schlanker gebaut, als die deutschen.

166. 167. Der große Dänische Hund, Kutschenhund: danicus. Buist.

Franz.: le grand Danois. — Engl.: the Danish Dog. the Lyemmer, Leviner.

Größer, schlanker und edler gebaut (als voriger), Beine lang, Läufe schlank, Ohren sehr schmal und kurz, Schwanz sehr dünn, Haar sehr glatt, meist braun, mausefahl oder schwärzlich mit weißer Kehle und Brust, seltner gefleckt. — Er heißt auch der dänische Blendling, indem er aus Dänemark herstammt und sich vielleicht daselbst aus einer Verpaarung großer Windhunde, mit Fleischerhunden oder englischen Doggen erzeugt hat. Einer der schönsten Hunde, den man, bevor die Parforcehunde bekannt wurden, zum Hetzen auf Rothwild brauchte, seltner auf Schweine und Hasen, wozu sie auch nicht geschaffen scheinen, da sie die Hasen überspringen und von den Schweinen leicht verletzt werden. Sie sind äußerst gutartig und sanft, höchst dankbar und treu, so wie sie auch zugefügte Beleidigungen lange im Gedächtniß bewahren. In Deutschland kommt er sehr selten vor und ist überhaupt selten.

169. Der irländische Hund: iricus.

Franz.: le Matin d'Irlande. — Engl.: the Irish Matin.

Vom Wuchs des großen dänischen Hundes, einfarbig röthlichgelb, Hals etwas weiß. Er scheint eine in Irland aus dem großen Dänischen und dem Fleischerhunde entstan-

Digitized by Google

dene Baſtardform zu ſeyn. Es giebt indeſſen noch eine beſondre, durch vorzügliche Größe ausgezeichnete Race in Irland, welche der irländiſche Wolfshund heißt, und mit dem Albaneſer (vergl. oben S. 150) verglichen wird, von dem indeſſen jetzt kaum noch zwei oder drei Individuen in den ganzen britanniſchen Königreichen exiſtiren ſollen.*)

168. Der leichte oder Curländiſche Cur hund, Laufhund, Rennhund, Pürſch- oder Birſchhund: cursorius curonicus.

Franz.: le courant. — Engl.: the Hound.

Größe des großen Windhundes, Bau kräftiger, Schnauze, Beine und vorzüglich die Pfoten dicker. Schöner Blendling vom großen Windhund mit der engliſchen Dogge. Leichter Hetzhund, in Curland erzeugt und daſelbſt auf hohes Wild, Bären, Schweine, Wölfe, Hirſche, auch das Elen in Gebrauch. Exiſtirt auch noch in Sachſen.

583. Der eigentliche Solofänger: solicapus

ſteht dem Curländiſchen Curshunde ungemein nahe, zeichnet ſich aber vor ihm und vor allen Wind- und Bluthunden durch gewölbtere Stirn wegen größerer und mehr erhobener Stirnhöhlen aus, er iſt auch deshalb der verſtändigſte und nützlichſte Hund der ganzen Sippſchaft, welcher am beſten Dreſſur annimmt, das, was er im angebornen Triebe der Bluthunde gefangen hat, unberührt zu laſſen. Aus ſeiner Varietät ſind auch in der Regel die unter den Windhunden erwähnten Retter, Ritter, Beſchützer oder Beſchirmer. Man wählt dazu den ſtärkſten, welcher ſich deshalb bald Achtung bei den andern verſchafft und ihnen die Beute wegnimmt. Es giebt auch ſolche, welche dem Jäger den Haſen zutragen, während andere, wie oben geſagt, ſich darüber hinlegen, jene heißen Apporteurs. Die Dreſſur iſt bei dem eigentlichen Windhunde ſchwieriger und gefahrvoller.

Vierte Hauptrace. Jagdhunde: sagax.

Kennzeichen: Schädel rundlich mit ſtarker Kammleiſte, Schnauze ſtumpf, Lippen und Ohren herabhängend.

Heißen auch: Waid- Wild- Hunde. — Franz.: Dogues. — Engl.: Dogs.

Erſte Race. Spitz-Jagdhunde: Wuchs nebſt Kopf und Pfoten des Jagdhundes. Bekleidung und Ruthe der Schäferſpitze.

149. 237. 238. Der Neufoundländer, große Waſſerhund: terrae novae Blumenb.

Franz.: le chien de terre neuve. — Engl.: the New foundlands Dog.

Groß, auch ſehr groß, Schnauze des länglichen Kopfes dicklich, Ohren hängend, mittelmäßig, Zehen durch große Schwimmhäute faſt bis an die Nägel verbunden. Haar langzottig, Fahne lang. Schwarz, braun, weiß, auch gefleckt.

*) „But transport the matin into Ireland, the Ukraine, Tartary, Epirus, Albania — and he is converted into that great wild dog, perhaps the most majestic of his species, called the Irish wolfdog (Canis Laconicus), of wich last only two or three individuals are said to be now existing in all the British isles." Vicomb in Lands. sketches. L wie Buffon.

Digitized by Google

Als die Engländer im Jahre 1622 sich auf Neufoundland zuerst niederließen, fanden sie diese Hunde noch nicht vor. Es ist ungewiß wie sie später dahingekommen, wahrscheinlich, daß sie aus Verpaarung einer Schäferspitz- und Jagdhundrace entstanden. Sie sind sehr verständige Hunde und gutmüthig, mit Ausnahme dessen, daß sie oft die gewöhnliche Berührung, das Streicheln des Kopfs ungern haben und dieselbe besonders von Fremden und Kindern ungern leiden, und sogar beißen, weshalb man bei ihrer Haltung im Hause vorsichtig seyn muß. Außerdem äußern sie die stolze Ruhe der großen Hunde, sich um die kleinen und kleinern Thiere überhaupt nicht zu bekümmern. An ihrem Herrn hängen sie mit großer Treue, und vertheidigen ihn eifrig und heftig. Ihr Erinnerungsvermögen ist ebenso groß für Wohlthaten als Neckereien. Eigenthümlich zieht ihn sein Naturell zum Wasser, in welches er im Sommer und Winter zum Zeitvertreib geht, oft ohne Geheiß apportirt, dann nur mit Mühe wieder herauszubringen ist und wichtig wird, durch Rettung verunglückter Menschen, wovon so viele Beispiele bekannt sind. Man hält ihn deshalb vorzüglich auf Schiffen, so wie in der Nähe gefährlicher Bergströme, jetzt auch anstatt der ehemaligen Bernhardshunde in dem Kloster auf dem St. Bernhard und in Paris an der Seine. Mehrere ausgezeichnet schöne Exemplare sind auch hier in der Nähe der Elbe in Dresden. Dieser Hund qualificirt sich zu Anstellungen vielfacher Art und scheut sich nicht, wie andere, vor dem Wolfe, sondern greift diesen mit Muth und Erfolg an.*)

Zweite Race. Pudel-Jagdhunde: Wuchs pudelartig kurz und kräftig, Haar zottig Ruthe lang, ziemlich gerade.

239 — 241. Der St. Bernhardshund: Sancti Bernhardi.

Franz.: le Doque. du St. Bernard. — Engl.: the Dog. of the St. Bernard.

Groß, Kopf groß und kurz, Schnauze dick, Behang breit; Haar zottig, braun oder weißlichgelb und von beiden Farben gefleckt.

Die so rühmlich bekannte Race der wohlthätigen Bernhardshunde wirkt eine Reihe von Jahren für Erhaltung von Menschenleben, bis sie in diesem Berufe unterging und durch Neufoundländer ersetzt wurde, oder, wie andere berichten in wenigen Individuen sich noch erhalten hat. Man erzählt, daß ein neapolitanischer Graf Mazzini sie von einer nordischen Reise mitgebracht und dem Kloster geschenkt haben soll. In der Folge vermischten sie sich auch mit Walliser Schäferhunden. In dem öden, hohen Felsenthale, von mit ewigem Schnee bedeckten Felsen umschlossen, steht die höchste menschliche Wohnung in der alten Welt, das Kloster des heiligen Bernhards. Hier wohnen zehn bis zwölf fromme Mönche, deren einziges Geschäft darin besteht, die Reisenden unentgeldlich zu bewirthen und ihnen alle Hülfe, deren sie bedürfen, angedeihen zu lassen. In den acht oder neun Monaten des Jahres, wo Schnee, Nebel, Ungewitter und Schneelawinen den sehr gangbaren Bergpfad aus dem Wallis nach Italien sehr gefährlich machen, streifen die Geistlichen und ihre Diener täglich umher, um Verirrte aufzusuchen, oder versunkene zu retten. Schon viele Jahre lang bedienen sie sich zur Rettung der Verunglückten auch jener sorgfältig abgerichteten

*) a famous Newfoundland dog. H. B. Chalon animal painter to the Duk and Duchess of York del. C. Turner sculps. in aquatinta. Publ. Jan. 1805 by Edw. Orme his Maj. Printseller. Bond Strect London. Ein bekanntes, ausgezeichnetes Aquatinta-Blatt.

Digitized by Google

großen Hunde. Diese gehn entweder allein aus, oder in Gesellschaft der Mönche. Sobald der Hund einen Verunglückten ausgewittert hat, kehrt er in pfeilschnellem Laufe zu seinem Herrn zurück, und giebt durch Bellen und Wedeln und unruhige Sprünge seine gemachte Entdeckung kund. Dann wendet er um, immer zurücksehend, ob man ihm auch nachfolge und führt seinen Herrn nach der Stelle hin, wo der Verunglückte liegt. Oft hängt man diesen Hunden ein Fläschchen mit Branntwein, oder andern stärkenden Getränken und ein Körbchen mit Brod um den Hals, um es einem ermüdeten Wandrer zur Erquickung darzubieten. Ein solcher Hund — nach Schinz Versicherung der letzte Sprößling der ächten Race — war Barry, s. unsre Abbildung Nr. 239. Zwölf Jahre lang war er unermüdet, thätig und treu im Dienste der Menschheit, und er allein hat in seinem Leben mehr als vierzig Menschen das Leben gerettet. Der Eifer, den er hierbei bewies, war ausserordentlich. Nie ließ er sich an seinen Dienst mahnen. Sobald der Himmel sich bedeckte, Nebel sich einstellten, oder die gefährlichen Schneegestöber sich von weitem zeigten, so hielt ihn nichts mehr im Kloster zurück. Nun strich er rastlos und bellend umher und ermüdete nicht, immer und immer wieder nach den gefährlichen Stellen zurück zu kehren und zu sehen, ob er nicht einen Sinkenden halten, oder einen Vergrabnen hervorscharren könnte, und konnte er nicht helfen, so setzte er in ungeheuren Sprüngen nach dem Kloster hin und holte Hülfe herbei. Als er einst zwischen dem schauerlichen Valsore-Glätscher in der Pointe de Dronaz herumschweifte, fand er in einem Eisgewölbe ein schlummerndes, halberstarrtes Kind. Der grüne Asbest und der Glimmerschiefer, die zwischen den Schneeschichten an den Felswänden durchschimmerten, mochten den kleinen Wanderer angelockt haben, er kam vom Wege ab und Kälte und Schlaf überwältigte ihn. So fand Barry das Kind, beleckte es mit der wärmenden Zunge, weckte es und wußte es dann durch Liebkosungen zu bewegen, sich auf seinen Rücken zu setzen, an seinen Hals anzuklammern, in welcher Stellung es dem treuen Thiere gelang, seine süße Last triumphirend in das Kloster zu fernerer Verpflegung und gänzlicher Rettung zu bringen. Als der Hund alt und kraftlos wurde, sendete ihn der wurdige Prior des Klosters nach Bern in freundliche Pflege. Nach seinem Tode wurde das treue Thier im dortigen vaterländischen Museum der Naturgeschichte, mit dem Fläschchen des stärkenden Trankes am Halse, das von ihm oft Sterbenden zur Rettung geboten ward, ausgestopft aufgestellt. Im Dezember 1816 wurden die übrigen dieser treuen Thiere in ihrem Berufe unter dem Schnee einer Lawine begraben, wodurch die ganze Zucht ausstarb. — Hier sehen wir die Kraft und Ausdauer, die Feinheit der Witterung und die Klugheit des Jagdhundes mit der Treue des Pudels vereint, vielleicht die höchste und in ihrem Erfolg wohlthätigste Combination für den Menschen!

Dritte Race. Blutjagdhunde: Wuchs wie Fleischerhund, Brust sehr stark, Behang schmal, dessen Basis aufrecht, Augen sehr schief.

214 — 216. **Der Mops, Mopsel, Steindogge: fricator. L. Gm.**

Franz.: le dogum. — Engl.: the Pug-Dog.

Klein, kaum einen Fuß hoch, bräunlichgelb, Maul schwarz, Nase aufgestülpt.

Gleichsam der Bullenbeißer, dessen Sippschaft er eröffnet, im Kleinen. Er soll durch Vermischung des Bullenbeißers mit dem kleinen dänischen Hunde entstanden sein.

Digitized by Google

Sein Kopf ist rundlich und oben platt, die Schnautze kurz, zwischen den Augen eingedrückt und schwarz. Die Nase ist aufgeworfen und breit, die Lippen kurz, der Leib kurz gebaut, der Schwanz aufwärts geringelt, die Ohren halb hängend. Das Haar ist sehr kurz, dicht anliegend und grob, erbsfarbig, oft über Hals und Rücken nach der Ruthe hin schwärzlich. Ohne Rücksicht auf das Größenverhältniß ist sein Kopf noch schwächer, als bei dem Bullenbeißer und seine Lefzen dünner und kürzer. — Die Race hat bei der Haltung in Stuben, wozu sie allein fähig ist, viel Unangenehmes; das ausdruckslose Gesicht steht allerdings mit einem Mangel an geistigen Fähigkeiten in Verbindung; dazu kommt noch, daß diese Hunde sehr leicht von der Räude, Gicht, Blindheit und Hundswuth befallen werden, daß sie ferner, besonders wenn sie einige Jahr alt sind, äußerst viel bellen und knurren, gegen Fremde immer falsch und bösartig sind, weshalb sie heut zu Tage immer seltner werden, obwohl sie ein sehr hohes Alter erreichen.

Der Artoishund, artesische Hund: artesius.

Franz.: Chien d'Artois, Issois, Quatre-vingt. — Engl.: the Artois Dog.

Bastard von Mops und Roquet, mit einer kurzen und so platten Schnautze, daß leicht ein übler Geruch aus der Nase oder Schnautze entsteht, daher man sie nicht fortgezogen hat. Sie kamen aus der französischen Provinz Artois, existirten dann in Ryssel und Flandern, weshalb man sie Ryssel'sche Hunde nannte, den Namen Achtziger erhielten sie vielleicht von der Jahreszahl, unter welcher sie bekannt geworden. Sie mögen so selten gewesen seyn, daß sie auch Buffon nicht hat zu sehen bekommen können, sonst würde er sie abgebildet haben.

581. Der Alikante Hund, alicantische Hund: alicantensis.

Molossus Andalusiae Fitz. Franz.: Chien d'Alicante ou de Cayenne. — Engl.: the Alicante Spaniel.

Mops mit Seidenhaar, Blendling von Mops mit Bologneser, oder spanischem Wachtelhunde. Stammen aus Alikante in Spanien und sind wahrscheinlich auch in Cayenne vorgekommen, deshalb auch mit andern Hunden aus Cayenne verwechselt, und Cayennehunde genannt worden.

217. Der Roquet, Bastardmops: hybridus.

Franz.: le Roquet. — Engl.: the Bastard-Pug.

Größe des Mopses, Kopf klein, Nase dick, Schnautze aufgeworfen, Augen groß und vorstehend, Beine lang und dünn, Haare glatt und anliegend. Weiß, mit oder ohne schwarze Flecken.

Bastard des Mopses mit dem kleinen dänischen Hunde. Die gefleckten nennt man noch übrigens Harlekine, andere nennen den kleinen dänischen so, wenn er gefleckt ist.

165. Der kleine dänische Hund: variegatus Gmel.

Franz.: le petit Danois. — Engl.: the little Danish Dog, the Harlequin Dog.

Ist durch die enge spitzige Schnautze und die dünnere Ruthe von vorigem verschieden, dabei gewöhnlich einfarbig braun oder grau oder schwärzlich mit weißer Kehle,

Digitized by Google

was alles dazu beiträgt ihn als den dänischen Hund Nr. 166 im Kleinen darzustellen, mit dem man ihn allerdings auch verwandt nennen kann. Er kömmt auch gefleckt vor und heißt dann ebenfalls Harlekin. Er hat große Augen, magere Beine und die Ruthe ist sehr hoch angesetzt. Er ist ein kleiner, kläffiger Stubenhund ohne Fähigkeiten. Buffon sagt sonderbar: „der Bullenbeißer, als er von England nach Dänemark gebracht worden, verwandelte sich in den kleinen Dänischen, und aus diesem entstand in heißeren Ländern der türkische Hund." —

218. Der Bullenbeißer: Molossus Linn.

Franz.: le Dogue. — ital.: alano. — Engl.: the Bull-Dog. — mittelalt.: C. ursarius, qui ursos capit Leg. Allem. Cap. LXXXIII. — Russ.: Datskaja Sobaka. — Bärenhund, Bärenbeißer, Wachthund.

Großer kräftiger Hund vom Wuchs des Mopses, Größe des Wolfs. Er hat ein plumpes, stupides Ansehen, starke Muskeln besonders an den Schenkeln, kurzes, dickes Maul, tief herabhängende, immer geifernde Lippen, Nase stumpf, breit und aufgeworfen, mit tiefer Furche über die Scheidewand, Augen klein und schief, Stirn flach, Ohren schmal und halbhängend, Wangen schwappig. Der Hals ist sehr dick und kräftig, der Schwanz fast gerade auslaufend nur gegen das Ende aufwärts gebogen. Die Farbe ist fahl, erbsfarbig, das Haar kurz, steif und glatt anliegend, Schnautze und Ohrspitzen schwarz. Die Bullenbeißer sind ausserordentlich starke, dabei phlegmatische, gereizt aber wilde, übrigens trotzig bösartige Hunde. Ihrem Herrn sind sie treu ergeben, für Fremde jederzeit gefährlich. Man brauchte sie ehemals zu Thierhetzen, ließ sie gegen Bären, Wölfe und Schweine gehen, oder auch mit Auerochsen kämpfen, wie ehedem in den Thierhetzen in Wien geschehn. Heut zu Tage hält man sie auf Höfen als Wächter, oder wählt sie zu Begleitern auf Reisen, auch vertreten sie oft die Stelle der Fleischerhunde, wozu sie als nahe Verwandte der Bluthunde sehr gut passen. Sie sind tüchtige Thierwächter und bringen die wildesten Ochsen zum Gehorsam, indem sie so lange um sie herumspringen, bis sie sich in ihr Maul einbeißen können, so daß sie daran hängen bleiben, worauf der Ochse sich gewöhnlich beruhigt. Die Race soll in England entstanden sein. Die Molossischen Hunde der Alten aus Molessia in Epirus *), sind bei dieser Nachricht nicht berücksichtigt, und doch finden wir die wahrscheinliche Stammrace der Bullenbeißer (vergl. Nr. 222 — 224) in Thibet, so daß auch die gegenwärtige den Griechen und Römern recht wohl bekannt gewesen sein könnte, um so mehr, als sie die von ihr entsprungenen Doggen schon kannten. Uebrigens vergl. was bei dem Albaneser am Schlusse der ersten Race gesagt worden ist. Der feste, trotzige Character des Bullenbeißers erklärt sich leicht aus seiner Kopfform, da bei ihm die Dimensien zwischen den Mittelpunkten der Schädelwandbeine größer ist, als bei anderen Racen, sie sind also die Dickköpfe unter den Hunden.

219. Die Doppelnase, Hasenscharte: Molossus Nasica s. palmatus.

Franz.: le double-nez.

Abanderung des Bullenbeißers, bei welcher die Nasenfurche mehr oder weniger tief in die Scheidewand hineindringt und auf diese Weise das Ansehen zweier getrennter

*) Aristot. hist. animal. IX. 1. Horat. Sat. 6. 114.

Digitized by Google

Nasen hervorbringt, zugleich die Zehen mit großen Schwimmhäuten an allen Füßen versehen sind. Findet sich einzeln hier und da, und gilt von ihm übrigens dasselbe, wie von vorigem.

220. 221. Der Rundkopf, rundköpfiger Bullenbeißer: Molossus orbicularis.

Franz.: le dogue a tête ronde.

Eine sehr eigenthümliche etwas kleinere Abänderung, welche vielleicht die reinste Zucht des englischen Bullenbeißers ist. Die sehr breite hochgewölbte Stirn zeichnet dieselbe aus und bildet einen fast ganz runden Schädel. Sie ist selten und ich habe nur ein einziges Exemplar vor mir.

222 — 224. Der Thibetanische Bullenbeißer: Molossus thibetanus.

Franz.: le doque du Thibet. — Engl.: the Thibetan Dog.

Größer als die größte englische Dogge, Hautfalte über den Augenbraunen, auch Wangen und Oberlippe tief herabhängend, Kleid langhaarig, Fahnenschwanz, Farbe schwarz.

Schon Strabo, welcher bald nach Christi Geburt schrieb, erwähnt die ausgezeichneten indischen Hunde, welche man vorzüglich in Panschab (Panjab, Lahor) in Vorderindien hielt, auch Aelian (hist. anim. 19.) spricht von indischen Hunden und Marco Polo erwähnt Thibetanische Hunde von der Größe der Esel, man bediene sich ihrer, um wilde Ochsen zu fangen. Nachdem die Erzählung von den großen Hunden, welche Alexander von Albaniens König erhalten hatte (vergl. Albaneser oben S.) bekannt geworden, verwechselten einige diese mit den aus Strabo bekannten indischen Riesenhunden und Solinus suchte sich gar den Namen Albani daraus zu erklären, daß sie mit weißen Haaren geboren würden*), während doch seine Vorgänger deutlich erzählt hatten, daß Albaniens König sie geschenkt hätte.

Erst dies laufende Jahrzehnt war im Stande, von England aus eine Kenntniß dieser gewaltigen Race über den Continent zu verbreiten, indem im J. 1830 durch die ausgezeichnetsten Thiermaler Englands Thom. Landseer und William Harvey Abbildungen und Beschreibungen publicirt wurden. Der berühmte Wallich, Prof. der Botanik in Calkutta, theilte über die merkwürdigen Thiere folgenden Bericht mit, den ich zum erstenmale in deutscher Sprache gebe. Er sagt:

Diese edlen Thiere sind die Wachthunde des hohen Plateaus auf dem Himalaiagebirge, im Districte von Thibet. Ihre Herren, die Bhoteas, denen sie gänzlich ergeben sind, bilden einen eignen kupferrothen Menschenstamm, welcher die dort oben sie umwehende Luft athmet, zwar mehr klein, aber sonst von trefflicher Gesundheit. Ihre Bekleidung stimmt mit dem kalten Clima, in welchem sie leben, zusammen und besteht aus Pelz und Wolle. Die Männer bebauen den Boden und hüten Schaafe; von Zeit zu Zeit kommen sie nach der Stadt und bringen Borax, Tinkal und Moschus zum Verkauf. Bisweilen gehen sie bis Calkutta. Die Frauen bleiben indessen zu Hause mit den Hunden, die letztern bewachen die Besitzung und haben eine unversöhnliche Abneigung gegen Europäer, ja insgemein fliehen sie wüthend bei Erblickung eines weißen Gesichts. Ein wärmeres Clima erschlafft alle ihre Kraft, und schon im Thale von Nepaul arten sie aus und werden schwächlicher.

*) Albani autem ideo dicti, quia albo crine nascuntur. Solinus. 15.

Digitized by Google

Die Exemplare vor uns sind von dem edelen Stamme aus der Nachbarschaft von Diggarschee, der Hauptstadt von Thibet, und sind wahrscheinlich die einzigen, welche von Europäern gezähmt wurden. Der brittische Consul am Hofe des Rajah von Nepaul und Katmandoo Edward Gardner hat nie anderwärts von einem solchen Falle gehört, und betrachtet diese Hunde deshalb als eine außerordentliche Seltenheit. Dr. Wallich brachte sie aus ihrem Vaterlande nach London für die ostindische Compagnie, diese machte damit dem Könige ein Präsent, und dieser geruhete dieselben in den Garten der zoologischen Societät bringen zu lassen. Leider — setzt die zoologische Societät hinzu — müssen wir melden, daß sie bald nach ihrer Ankunft daselbst starben. Dieselbe giebt noch ferner folgende Nachrichten.

Kapitän Turner war der erste in neuerer Zeit, welcher dieser Hunde erwähnte, und zwar in seinem Bericht über die Sendung an den Hof des Teshoo Lama in Thibet, welcher im J. 1800 erschien*). Er sagt: „das Wohnhaus des Raja von Bootan stand rechts, und links sahe man eine Reihe hölzerner Käfige, in denen sich eine Anzahl großer, furchtbar wilder, starker und entsetzlich lärmender Hunde befand. Sie waren von Thibet, und mochten sie entweder von Natur wild, oder über ihre Einsperrung noch mehr erzürnt seyn, so waren sie doch so unbändig, daß man Niemand hätte rathen mögen, in Abwesenheit der Wärter, sich ihrer Wohnung zu nähern." Einige Blätter weiter stellt der Verfasser das freundlichere Bild auf, wo er sie schildert als Wächter der Heerden. Anderwärts erzählt er folgende Anekdote. Ich war — sagt er — bei meinem Eintritt in ein thibetanisches Dorf mißvergnügt gestimmt, und zum bloßen Zeitvertreib ging ich längs den Häusern dahin, und als ich alles still und ruhig fand, begab ich mich in eine steinerne Vermachung, welche zur Aufnahme der Viehheerden dienen. In dem Augenblicke, als ich eintrat, erschrack ich nicht wenig, als ein ungeheurer Hund auf mich losfuhr, der so kräftig als groß war, um einen Löwen bekämpfen zu können. Er empfing mich mit einem lauttönenden Bellen, und ich war erst eine zeitlang betroffen, bis ich mich wieder erholte und noch ganz still stand, denn da ich einmal einen besessen hatte, so wußte ich, daß sie nur dann bös sind, wenn man ihnen Furcht zeigt; wäre ich entflohen, so setzte mir auf jeden Fall der Hund nach, und riß mich in Stücken, bevor irgend jemand zu meiner Rettung herbeikommen konnte. — Auch andere Schriftsteller stimmen darin überein, daß sie diese Doggen so ungeheuer groß, so wild und so feindselig gegen die Fremden schildern, so daß diese Eigenschaften zu ihrer Charakteristik gehören dürften. Kapitän Rapes, in seiner Erzählung der Expedition zur Entdeckung der Quellen des Ganges, spricht auch davon, daß die Einwohner von Bootan unter ihren Handelsartikeln auch große Hunde zu Markte gebracht hätten. Von einem sagt er, er sey ein schönes Thier, so groß als ein großer Neufoundländer gewesen, mit sehr langem Haar bekleidet und vom Ansehn eines Bullenbeißers. Sein Schwanz war von bedeutender Länge, wie ein Fuchsschwanz, und nach dem Rücken hin aufwärts gekrümmt. Er war übrigens so wild, daß er keine Fremden in seine Nähe ließ, und derselbe Eigensinn war auch bei den übrigen dieser Art bemerkbar. Auch Mr. Moorcroft sagt in seiner Reise nach dem Manasarovara See: die Unipas haben Hunde mit sich, welche sehr wild und vorzüglich geneigt sind, die Fremden anzufallen. Es ist nun wohl kein Zweifel, daß in diesen Erwähnungen die

*) Account of an Embassy to the Court of the Teshoo Lama in Tibet, published in 1800.

Digitized by Google

ächten thibetanischen Bullenbeißer gemeint sind, allein es ist im Gegentheil wahrscheinlich, daß Mr. Traser in seiner Reise über einen Theil der Himalaiagebirge, dieselben mit andern Racen verwechselt hat. Er erwähnt oft die Hunde von Bischur, deren Kraft und Behendigkeit er auf eine wundervolle Weise erzählt, allein mit einem Scheine von Unglaublichkeit, sowohl in Beziehung auf ihre Größe, als auf ihre Kräfte. Dies läßt uns muthmaßen, daß er nie die ächte Race gesehen hat, welches Mißtrauen besonders dann bestärkt wird, wenn er von ihren Kennzeichen spricht, und unter andern sagt, diese Hunde wären nicht dicker als ein Hühnerhund, so läßt sich dies wohl weder mit der Größe noch mit dem dicken Pelze der ächten Race zusammenräumen.

Unsre Exemplare im zoologischen Garten waren größer, als irgend ein englischer Bullenbeißer von uns jemals gesehen worden. Ihre Farbe war tiefschwarz, an den Seiten leicht gewölkt, ihre Pfoten und ein Fleck über jedem Auge satt rostfarbig oder hellbraun. Sie hatten eine breite, abgestutzte Schnautze wie ein Bullenbeißer und Lippen, welche noch mehr als bei diesem herabhingen. Man bemerkte in der That eine eigenthümliche Schlaffheit des Felles an ihnen, welche Desmarest als Kennzeichen des thibetanischen Bullenbeißers anzeigt, ohne ihn jedoch zu beschreiben. Er mag wohl dasselbe Thier meinen, aber wir wissen nicht, wie ihm jene Notiz zugekommen ist.

Vierte Race. Eigentliche Jagdhunde, venatorius: eigenthümlicher Wuchs, ausgebildetstes Spurvermögen, längster und breitester Behang.

Anm. Nur die Bastarde aus der Bullenbeißer-Sippschaft machen eine Ausnahme durch schmalen Behang.

589 — 591. Der ächte Otterhund: platyurus.

Ruthe plattgedrückt, Schwimmfüße.

Von allen Racen durch das erste obiger Kennzeichen höchst ausgezeichnet. Diese Hunde, deren Kenntniß ich der Güte des durch seine Mittheilungen über Amerika rühmlichst bekannten Herrn Bromme verdanke, sind drittehalb Fuß lang, der merkwürdige, platte Otterschwanz hält einen halben Fuß, die Beine sind gerade, aber so kurz als die der Fischotter, deren Kleid der Hund trägt, sowohl in Beziehung auf Länge und Lage, als auch auf die braune Farbe der Haare. Von der Nasenwurzel aus wölbt sich die Stirn hoch, die Augen sind klein und schiefliegend, der Behang von außerordentlicher Länge, so daß er das Knie erreicht, der Leib ist noch länger gestreckt als bei dem Dachshunde, und die Zehen mit einer sehr vollkommnen Schwimmhaut versehen. Diese Otterhunde finden sich auf den kleinen Antillen häufiger als anderswo in Amerika, man ist dort unsicher über Abkunft und nennt sie bald chinesisch, bald guineisch. Ihre Neigung zum Wasser ist größer als bei irgend einer andern Race, daher sie bei dessen Anblick instinctmäßig hineingehen und geschickt und anhaltend tauchen, deshalb zur Wasserjagd unvergleichlich sind. Auf dem Lande ist das Thier unbehülflich, hat denselben wackelnden Gang, wie die Fischotter, folgt aber treulich seinem Herrn, an den es die größte Anhänglichkeit hat.

Die genealogischen Verhältnisse dieser Race zu ergründen, dürfte eine der interessantesten Aufgabe für den Physiologen seyn. In den bisherigen Naturgeschichten der Hünde vermisse ich eine Erwähnung dieser, so wie vieler andrer Hunderacen, denn die Riedingerschen Otterhunde scheinen nur eine ähnliche, nicht dieselbe Race zu seyn.

Digitized by Google

176. **Der eigentliche Dachshund: vertagus L. Gm. vertagus valgus. — Can. Bersarius, Bevetarius, Bibracco (*canis qui fibres venatur* Leg. Bojor. tit. XIX. §. 4. qui sub terra venatur.).**

Franz.: le Basset à jambes torses. — ital.: Cane bassoto. — Engl.: The Turn spit with the fore legs crooked. — Heißt noch: Dechsel, Dächsel, Dachsfinder, Dachskriecher, Dachsschlieser, Dachswürger, Bibarhund (im X. Säculo, jagte unter der Erde).

Kopf groß mit platter Stirn und langer Schnauze, Leib sehr lang, Beine sehr kurz und verdreht, Ruthe dick; Haar kurz und glatt, glänzendschwarz, ein Fleck über jedem Auge, Wangen, Brust, Bauch, die Beine innerseits und unten rostfarbig.

Der Dachshund ist derjenige, welcher am häufigsten in der Urfarbe erscheint; das was in der Regel rostfarbig ist, erscheint auch bisweilen weißlich. Sie sind entweder klein, kaum einen halben Fuß hoch, oder etwa um die Hälfte höher, dabei aber unverhältnißmäßig lang. Die Verdrehung der Beine, wodurch diese krumm und nach außen gerichtet erscheinen, hat ganz das Ansehen einer Knochenkrankheit, einer erblichen Rhachitis. Die Zehen sind mit kräftigen Klauen versehen, auch an den Hinterpfoten sind diese stark und noch eine Afterklaue vorhanden. Der ganze Bau des Thieres macht es geeignet zum Graben und daher zur Jagd in ziemlich engen unterirdischen Räumen, vorzüglich in den Höhlen der Dachse. Man erzieht sie erst, wenn sie ein Jahr alt sind zur Dachsjagd, indessen bereitet man sie bisweilen durch Entfernung der krallenartigen Afterklauen an den Hinterbeinen dazu vor, indem man diese den jungen Thieren abschneidet, damit sie nicht selbst darin hängen bleiben. Sie sind sorgfältig abzurichten. Lenz beschreibt die Behandlung und Abrichtung. Man hält sie im Sommer in einem freien Zwinger, im Winter in einem warmen Stalle. Des Hundes angeborne Neigung zum Jagen beurkundet sich, sobald er ins Freie kömmt, und man muß ihn sorgfältig abhalten, auf der Erde zu jagen, wenn man ihn zur unterirdischen Jagd bilden will; er kann sich in dieser Hinsicht sehr leicht verwöhnen. Man führt ihn also an einer Leine, oder trägt ihn in der Jagdtasche im Monat Mai zu einem Fuchsbau, wo man ihn die erste Probe machen läßt. Sobald man sich überzeugt hat, daß die Jungen darin sind, läßt man einen guten alten Hund hinein und sendet den jungen nach, mit dem Zurufe: faß das Füchschen! Will der junge nicht folgen, so muß man ihn wieder aufnehmen und einen Einschlag in den Bau machen, der zu den jungen Füchsen führt, man läßt ihn dann darin hinab, um die jungen Füchschen zu würgen. Nachdem dies einigemal wiederholt worden, braucht man ihn allein. So oft er wieder aus dem Baue herauskommt und den Herrn sucht, nimmt ihn dieser ein wenig auf, denn dadurch vermehrt sich seine Begierde hinein zu kriechen immermehr. Erst nach und nach übt man ihn, so daß man wagen darf, ihn an einen alten Fuchs, oder an einen Dachs zu lassen. In dem Baue muß ein guter Dachshund den Fuchs oder den Dachs in dem Kessel hineintreiben und dann in geringer Entfernung von ihm so lange liegen bleiben und bellen, bis vor ihm eingeschlagen ist. Wenn er den Fuchs nicht in den Kessel treiben kann, so muß er ihn herausbeißen. Es ist fast unglaublich, wie muthig und tapfer diese kleine überhaupt bißige und zänkische Race von Hunden ist. Sie beißen sich mit den größten Hunden herum, und greifen diese selbst an, bei dem Kampfe mit Füchsen und Dachsen erleiden sie freilich oft auch heftige Wunden, werden aber dadurch nur immer boshafter und eifriger in ihrem Geschäft, so daß sie sich oft gänzlich verbeißen. Nächstdem braucht man die Dachshunde auch

Digitized by Google

zur Jagd auf Kaninchen, Biber und Fischottern, ja sogar auf Hirsche und Schweine, wozu sie gar nicht unpassend sind, da die Hirsche nicht so schnell vor dem langsamen und nicht weit in die Ferne sehenden Dächsel, als vor dem schnellfüßigen, scharfäugigen Jagdhunde fliehen, und da die Schweine dem niedrigstehenden Feinde nicht so mit ihren Hauern beikommen können, als den größeren Packhunden. Sie haben aber das unangenehme bei dem Jagen über der Erde, daß sie, wie gesagt, etwas blödsichtig sind und zweitens nicht auf den Ruf hören (nicht Apell haben) und oft stundenlang nicht wieder zurückkehren, da sie, wenn sie sich ermüdet fühlen, sich am ersten besten Orte niederlegen und ausruhen. In der Jugend sind die Dachshunde ziemlich angenehme, muntere Thiere, im Alter immer mürrisch, beißig und begegnen selbst ihren Herrn knurrend und zähnfletschend. Gegen große Hunde erlaubt er sich alles, da diese in der Regel sich um die kleinen wenig bekümmern, will indessen ein großer Hund sich vertheidigen, so legt sich der Dachs auf den Rücken und beißt den großen von unten an die empfindlichsten Theile, so daß er vor Schmerzen vom Kampfe abstehen muß. Sie sind besonders im Alter der Raude, Mundfäule, dem Blindwerden, dem Gliederreißen und der Wuth leicht ausgesetzt.

177. 178. Dachshund mit dem Schweinschwantze: vertagus syosorus.

Franz.: Basset à quenc de cochon.

Wie voriger, Ruthe länger, dünne und spiralig gebogen.

Eine eigne, sich gleichartig fortpflanzende Abänderung, von welcher alles gilt, was oben gesagt worden, obwohl sie nicht so geschätzt wird, als die reine Ur-Race.

179. Der braune Dachshund: vertagus brunneus.

Franz.: Basset brun.

Hellbraun bis kastanienbraun, scheint ursprünglich nur individuelle Abänderung, bei gleichartiger Paarung pflanzt sich dieselbe indessen auch gleichartig fort. Sonst gilt von ihr das obige.

180. Der gestreifte Dachshund: vertagus striatus.

Franz.: Basset strié.

Mittelgroß, oder fahl, mit schwarzen Querstreifen.

Bisweilen von der Größe des Fleischerhundes, Bastard vom Fleischerhunde, oder der gestreiften Dogge Nr. 225. und dem Dachshunde. Als Fleischerhund brauchbar.

181. Der bunte Dachshund: vertagus varius.

Franz.: Basset varie.

Weiß und schwarz gefleckt.

Bastard vom Hühnerhund, Haar glänzend glatt, deshalb auch Porcellanschecke genannt.

182. Der langhaarige Dachshund: vertagus longipilis.

Franz.: Basset vélu.

Durchaus weichhaarig, hellbraun.

Ursprünglich wohl Bastard aus Pudel und Dachs. Nicht sehr geschätzt und deshalb selten.

Digitized by Google

183. Der zottige Dachshund: vertagus villosus.

Franz.: Basset touffu.

Ueberall zottig, Baſtard vom großen Seidenhunde. Er gehört eigentlich mehr in die Race der Seidenhunde neben den Hund von Burgos, welcher Baſtard mit dem kleinen Seidenhunde iſt. Vergl. oben S. 152.

184. 185. Der geradbeinige Dachshund: vertagus rectipes.

Franz.: Basset à jambes droitas. — Engl.: Turnspit with the fore legs straights.

Kopf kürzer, Beine gerade, ſonſt wie Dachshund.

Verbindungsglied zwiſchen Dachshund und Stöberhund Nr. 209. 210. Das Naturell dieſer Hunde nähert ſich mehr dem der Hühnerhunde, ſie haben indeſſen die Wuth und Schärfe der Dachshunde, paaren ſich auch nach beiden Verwandtſchaftslinien hin, ſo daß auch langſchnautzige Dachshunde mit geraden Beinen vorkommen. Zur unterirdiſchen Jagd paßt der geradbeinige Dächſel weniger.

186. Der Trüffelhund: tuberisequus, vertagus barbatus:

Engl.: the terrier

welcher Baſtard von Dächſel und Schäferhund ſeyn ſoll, iſt oben in der Verwandtſchaft der Schäferhunde, zu denen er ſich vorzugsweiſe hinneigt, beſchrieben worden, vgl. S. 145 und wird auch bei den Engländern zur Jagd auf Dachſe, Marder, Ottern u. dgl. gebraucht.

187. 188. Der glatte Pinſcher: fricatore-vertagus, vertagus gracilis.

Franz.: le Basset grêle. — Engl.: the Pincher.

Schlanker und in allen Theilen proportionirter gebaut, mit ſchmalem, an der Baſis aufrechten Behang, Urfarbe, oder ganz ſchwarz.

Urſprünglich Baſtard von Mops und Dachshund, oder vielleicht wahrſcheinlicher vom kleinen Windhund und Dächſel. Die Afterzehe an den Vorderpfoten iſt ſehr ausgebildet, mit ſtarkem gebogenem Nagel, an den Hinterbeinen fehlt ſie gänzlich. Dieſe nette Hunderace iſt erſt in neuerer Zeit aufgekommen, ſcheint aus England entſproſſen, und hat in Deutſchland gleichſam die Stelle der Mopſe eingenommen. Der Pinſcher iſt ungeachtet ſeiner Schlankheit kräftig gebaut, von beſtändig heiterem Temperament, daher immer beweglich und unruhig, ohne Falſchheit. Er liebt die Wärme und hält ſich vielleicht deshalb gern in Pferdeſtällen auf. Bei ſeiner großen Lebhaftigkeit darf er zur Laufzeit nicht eingeſperrt werden, weil er in dieſem Falle der Hundswuth leicht ausgeſetzt iſt. Seine Neigung zum Jagen iſt ihm ſo angeboren wie dem Dachshunde, in Häuſern gehalten ſucht er ihr wenigſtens dadurch zu genügen, daß er ſich Abends auf den Hof begiebt und den Ratten nachſtellt, oder in die Gärten geht, um den Maulwürfen aufzulauern.

189. 190. Der dünnſchnautzige Jagdhund: venaticus conirostris s. normannus.

Der Normann. Franz.: le chien de Normandie.

Schlank aber kräftig gebaut, Schnautze etwas lang kegelförmig, Behang kürzer als bei dem eigentlichen Jagdhunde. Ruthe (urſprünglich) lang.

Digitized by Google

Eigne Nebenrace der Jagdhunde, vielleicht erst aus Mischung mit Windhunden entsprossen. Stammt aus der Normandie. Sie erscheinen wieder unter mehreren Abänderungen und lassen sich zu den verschiedenen Verrichtungen des Jagdhundes dressiren. Hierher gehören noch die folgenden.

191. Der schottische Jagdhund, Schweißhund: conirostris scoticus, s. anguisequus.

Engl.: the Scotish Hound, Blood-hound.

Die Bestimmung und Beschreibung dieses Hundes, wie sie F. W. Freiherr von der Borh*) gegeben, ist folgende:

Die Höhe beträgt einen Fuß und mehrere Zolle, die Länge aber drei Fuß, der Kopf ist stark, die Nase breit, mit weiten Höhlen versehen, die Hirnschale erhaben, die Ohrenlappen lang, breit und an den Backen anliegend, die Augen vorragend, dunkel von Farbe, der Mund weit geschlitzt, mit starken Zähnen versehen. Die Vorderbeine stark, etwas eingebogen, kürzer als die hintern; die Schenkel mager, die Farbe des kurzen, glatten Haares ist hellbraun, der Bauch weiß und weniger behaart als der übrige Körper, die Ruthe jener des Jagdhundes ähnlich. Die Stimme, der Hals-Laut, ist der Herold der dem Thiere inwohnenden Kraft, die sich auch in den Bewegungen des Körpers äußert.

Mannichfaltig zeigen sich aber die Abweichungen von diesem Urbilde, in der Größe, Bildung und Bekleidung. Schweißhunde von dunkelbrauner, schwarzer, gefleckter und gestreifter Farbe sind keine Seltenheit, so wenig wie sehr hochbeinige, kurz behangene und zottige Exemplare. Auch unter diesen leisten manche vortreffliche Dienste, wer aber auf die Bestimmung des Thiers zurückblicken will, kann sich leicht überzeugen, daß das oben beschriebene Vorbild den Vorzug verdient, welches man daher rein erhalten und nicht mit Leit- und Hühnerhunden verpaaren mag. — Die Vorrichtungen, welche der Waidmann von seinem Schweißhunde verlangt, haben ein durchaus bestimmtes Ziel: das verwundete, angeschossene, angeschweißte, angefärbte Wild sowohl am Riemen aufzusuchen, als auch im Freien zu verfolgen und zu hetzen. Edel- Dann- Schwarz- und Rehwildpret sind die gewöhnlichen Gattungen, auf die es abgesehen ist und denen der Jäger mittelst des Anstandes, der Schleich- oder Pürsche-Jagd am häufigsten nachstrebt, daher führt er auch den Namen Pürschhund. Die Benutzung des Hundes geschieht nicht unmittelbar nach dem Anschuß, sondern man läßt dem Thiere Zeit von der ersten Aufregung, nach welcher es flüchtig geworden, sich zu erholen, worauf es sich niederlegt (niederthut) auch wohl stirbt (verendet), so daß man den Schweißhund etwa nach einer halben Stunde von der Stelle aus, wo das Thier Blut verloren (geschweißt) hat, nach demselben aussendet, oder wenn der Schuß Abends geschehen, thut man dies wohl erst am andern Morgen. Findet man das Wild lebendig, so stellt er es mit unaufhörlichem Gebell, ist es verendet, so giebt er dies durch Anschlagen oder Geheul zu erkennen. — Zur dünnschnautzigen Race gehört auch:

192. Der englische Fuchshund: conirostris vulpicapus.

Engl.: the Fox-hound.

Die schlankste Form des Jagdhundes, auch kleiner als vorige.

*) Im Sylvan für 1817—18. — Daselbst das ausführlichste über Erziehung und Benutzung des Hundes.

Digitized by Google

Etwas über einen Fuß hoch, Kopf mager mit mäßigem Behang, Hals lang und dünn, Brust breit, Ruthe lang. Sie sind meistens weiß und dunkelbraun und gelblich gefleckt, durchaus kurzhaarig, die folgenden sind als theilweise langhaarige Abänderung derselben Race zu betrachten. — Bekanntlich gehört die Fuchsjagd, eine dem Parforcejagen ähnliche Renn- und Hetzjagd unter die Lieblingsbelustigungen der Engländer, deshalb trifft man auch bei jedem Grundbesitzer in England eine Anzahl solcher Hunde, welche in zahlreichen Meuten zur Jagd auf Füchse oder Hasen gehetzt werden.

193. 194. Der Fahnen-Fuchshund: conirostris vulpicapus lasiurus.

Wie voriger, mit Fahnenschwanz, auch wohl zottig an Brust, Bauch und Hinterbacken wie Nr. 194.

Deutet auf Abstammung vom Seidenhunde, ist indessen nicht der wahre Wasserjagdhund. Sein Gebrauch ist ganz der des vorigen.

195. Der große Hühnerhund: crassirostris avicularius maior.

Franz.: le grand chien d'arrêt. — Engl.: the great pointer.

Gehört zur Race des großen deutschen Jagdhundes, worüber man 211. 212 vergleichen mag, als Hühnerhund, wie häufig zu geschehen pflegt, dressirt, worüber bei 204—208 das Nöthige gesagt ist.

596. Der rottige Hühnerhund, Wasserhühnerhund: aquatilis.

Wuchs des Hühnerhundes, Bekleidung langzottig.

Bastard des Hühnerhundes mit großem Pudel; es erzeugt sich auch eine ähnliche Race mit dem Neufoundländer oder mit dem großen Seidenhunde. Die Anwendung ist die des Hühnerhundes, besonders bei der Wasserjagd.

196. 197. Die Brakke: Bracca.

Franz.: le Braque, clabaud. — Ital.: Bracco, Braccho. — Engl.: the Harrier, the Dalmatian Hound.

Mittelschlag zwischen langschnautzigem Jagdhund und Hühnerhund, von ersterem die kegelförmige Schnautze, doch kürzer, von letzterem der breit gewölbte Kopf, so wie der ganze Wuchs, Behang kurz!

Die Brakke ist sehr wahrscheinlich der erste und zwar aus dem Süden, aus Italien entsprungene Jagdhund gewesen, denn sie ist der heraldische Hund und findet sich theils mit halbem Leibe, theils ganz auf den alten Wappen, wo sie entweder aus den Helmen hervorragt, oder auf den Schildern angebracht ist. Der Hund findet sich gelblich mit Schwarz gedeckt oder isabellgelb mit einem weißen Halsringe und weißer Brust, auch ganz weiß oder schwarz. Die Ruthe ist sehr lang, gewöhnlich kurzhaarig, kommt aber auch als Fahne vor. Die Brakke ist von roherem Naturell als die übrigen Jagdhunde, deshalb wenig im Gebrauch, in älteren Zeiten sogar schon in manchen Jagdordnungen ihrer Raubsucht wegen verboten, und wer ein kleines Jagdrevier hat, wäre — wie Walther sagt — ein Thor, wenn er sich Brakken hielte, die ihnen alles Wild auseinander und über die Gränze sprengten. Sie jagen auf jeder frischen Fährte, sind aber schwer nur auf eine Wildart einzujagen. Die Brakken sollen aus Dalmatien entsprungen seyn, man nennt die weißen, schwarz kleingefleckten (S. Nr. 594.) deshalb ra-

Digitized by Google

gusanische und wahrscheinlich fälschlich auch bengalische Brakken oder Jagdhunde. Dagegen ist 196 die Corsikanische Brakke, weiß mit noch kleineren, regelmäßigen, schwarzen und gelben Fleckchen geziert; ich weiß nicht ob sie immer so wie in unsrer Abbildung einen so schlanken Kopf hat, sie würde dann in dieser Bildung nicht unbedeutend abweichen.

594. 595. **Die bengalische oder ragusanische Brakke: Bracca bengalensis s. ragusanus.** —

Franz.: le braque du Bengale ou dalmatique. — Bengalischer oder englischer Hühnerhund, Tigerhund.

Dieselbe Form wie vorige, weiß, fein schwarz gesprenkelt, kenntlich und von einem ähnlich gezeichneten Jagdhunde unterscheidbar: durch den kurzen Behang. Es ist ungewiß, ob die Herleitung aus Bengalen oder aus Ragusa die richtigere ist, oder ob sie, was mir am wahrscheinlichsten ist, aus Ostindien entsprossen, dann über Ragusa sich in Europa verbreitet haben. Er ist weniger gelehrig.

198. **Der englische Jagdhund: acceptorius anglicus.**

Engl.: the English hound., the stag-hound. — Franz.: le chien de chasse anglais,

hat einen kleinern Kopf, etwas kürzern Behang, längere Schnauze, dünnere Beine, seine Farbe ist ursprünglich aschgrau und klein schwarz gefleckt.

199 — 202. **Der französische Jagdhund: acceptorius gallicus.**

Franz.: le chien de chasse francois. — Engl.: the french hound,

sind ebenfalls französische Parforcehunde doch wahrscheinlich schon mit deutschen vermischt, wie 199. 201 und 202, so wie mit englischen, wie 200.

211. 212. **Der deutsche Jagdhund: germanicus, chien de chasse allemand,** ist kräftig gebaut, doch leicht und höchst ausdauernd im Laufe. Er hat sich wahrscheinlich in Deutschland erzeugt und ist der Stammvater ausländischer Jagdhunde, da bei ihm die Urfarbe, d. h. schwarz mit Dachszeichnung noch am häufigsten vorkömmt. Damit stimmt auch das überein, was die Schriftsteller, welche die Umwandlung der Hunde nach den Ländern, in welche sie übergehen, beschreiben, so sagt noch jetzt der Erklärer zu Thomas Landseers trefflichen Skotches, daß der Schäferhund nach England gebracht in den Bullenbeißer, in Frankreich in den Fleischerhund und in Deutschland in den Jagdhund sich verwandele*).

Der polnische Jagdhund ist schwerer als der deutsche, von wolfsgrauer, schwarzer oder rothbraungelber Farbe, wie der vorige, ihm überhaupt sehr ähnlich, aber weichhaarig, von mittler Größe und Ausdauer.

Auch bei Abrichtung des Jagdhundes ist das Erste, sobald der oder diejenigen, welche man vom Wurf ausgewählt hat von der Mutter abgewöhnt sind, daß man sie auf einen bestimmten Namen hören lehrt, so daß man sie bei diesem Namen oft ruft, auch

*) This shepphends dog — in England he certainly rises into the mastiff; in France, into the matin; in Germany into the hound (Jagdhund). — Aehnliches behaupten Buffon und Griffith.

Digitized by Google

zur Fütterung ladet und wo es üblich ist auch an den Ton des Jagdhorns gewöhnt. Noch bevor der Hund ein Jahr alt ist, koppelt man ihn mit einem andern, welcher in Größe, Temperament und Stimme recht zu ihm paßt, aber bereits die nöthige Führung hat, leicht zusammen (macht sie koppelbündig). Man führt diese Koppel wenigstens dreimal wöchentlich spatziren, aber nur an einsame Orte, wo man keinem Wilde begegnet. Dabei muß auf Unterdrückung von Unarten, welche sich leicht entwickeln, gesehen werden, man läßt sie nicht allein herumlaufen (schwärmen), nicht vorlaut und nicht beißig werden und gewöhnt sie zur gehorsamen Folge auf den Ruf (Zuspruch). Nach einiger Zeit führt man sie auch zu Pferde.

Die erste Lection im Jagen ist das **Anhetzen**, es muß bei feuchtem Boden und in einem an Wild armen Reviere geschehen. Der Neuling erhält die erste Anleitung von einem gut eingehetzten Jagdhunde, der bedächtig sucht und gut findet, am besten wenn dies sein Koppelgefährde seyn kann. Der Jäger hilft dabei noch, im Fall er, wie dies gewöhnlich geschieht, sollte allein suchen und jagen wollen. Man darf, um dies zu verhindern, den Zögling nie lange aus den Augen verlieren. Er muß sich an die Leine und den Zuruf gewöhnen, mit gesenktem Kopfe das Wild aufsuchen, sobald er es gefunden hat, laut werden und es nun mit fortwährendem Gebell (Geläute) verfolgen. Die Anwendung des Jagdhundes will mit aller Vorsicht geschehen, denn jede Wildgattung flieht die Gegend, wo sie einmal von einer Meute aufgesprengt und hitzig verfolgt worden; in wildarmen Gegenden jagt man also nicht mit Jagdhunden, wohl aber in weit ausgedehnten, wildreichen Waldungen, in unzugängliche, Felsgegenden, in Steppen und brüchigen Wildnissen. — Zur Parforcejagd, welche in der Naturgeschichte des Hirsches beschrieben werden soll, bediente man sich dieser großen Jagdhunde in Meuten von 20 bis 60 Stück, dergleichen waren besonders von französischer Race, unter Nr. 597—99 abgebildet in Sachsen noch bis in das Jahr 1827 in Gebrauch.

Im zwölften Jahrhundert, welches als die Blüthezeit einer geregelten Jagd angesehen werden kann, unterschied man den **Seuces** oder eigentlichen Jagdhund, besonders in den verschiedenen Functionen, als 1) **Leithihunt**, wahrscheinlich Anführer der Meute, welcher einen ihm folgenden Jäger führte*), 2) **Triphunt** oder **doctus**, der zweite Läufer und 3) **Spurihunt**, welcher an der Leine die Fährte hielt. Sein Unterschied vom Leithunde scheint nicht ganz klar zu seyn, im Fall nicht der obige als Schweißhund zu betrachten ist, in welchem Falle er aber doch in der Stellung nicht der erste seyn würde.

597—599. Die französischen Parforcehunde: gallicus.

Franz.: le chien de chasse françois. — Engl.: the french hound, vorzugsweise auch Treibhunde, Laufhunde genannt.

sind meist weißlich oder isabellgelb mit dunklen, rothgelben und braunen großen Flecken, nicht zu lang gestreckt, haben einen leichten aber kräftigen Kopf, verschmälerte Schnautze, große hervortretende, reine funkelnde, muntere Augen, große breite und lang herabhängende weiche Ohren, sein Körper ist rund gebaut, gerade und wohlgebildet, die Rippen sind kräftig und von außen sichtbar, die Schenkel dünn, die Lenden hoch breit und kräftig, ohne sehr fleischig zu seyn, der Bauch verschmächtigt sich, die Dickbeine liegen frei und rund, gehen in magere Dünnungen über, die Ruthe steht hoch ist leicht beweglich und

*) Qui hominem sequentem ducit, quem Laithunt dicimus. Leg. Allem. c. LXXXIII.

Digitized by Google

am Ende nicht haarig. Die Pfoten sind kurz und mager gebaut, die Nägel stark und grob. Insbesondere zur Parforcejagd geeignet, sie haben vortreffliche Nase und sind unermüdet eifrig in der Nachfolge.

592. 393 **Die Steinbrakke: Bracca minor Walth.**

Franz.: le petit Braque.

Größe eines großen Dachshundes, Wuchs der vorigen, mit langem Behang, Farbe gelbbraun oder kastanienbraun.

Diese kleine Brakke unterscheidet sich von der vorigen nur durch die geringere Größe, variirt auch wie jene in der Farbe, so daß sie auch mit weißer Abzeichnung oder gefleckt vorkömmt, im Naturell stimmt sie mit ihr überein, denn sie geht im Jagen, so lange sie Fährte hat, laut, wie die Parforcehunde und bringt den Schützen das Wild zum Schuß, schneidet es aber auch eben so raubgierig an, als die größere thut. Wegen der Steinbrakke anderer Schriftsteller vgl. Stöberhund Nr. 209. 210.

204 — 208. **Der eigentliche Hühnerhund: avicularius genuinus.**

Franz.: le Chien d'arrêt, couchant. — Ital.: bracco da fermo. — Engl.: the pointer. — Russ.: Lehavaja.

Mittelgroß, mit starkem Oberkopf, breiter Stirne, lebhaften, reinen, nußbraunen Augen, breiter Nase, großen weit geöffneten Nasenlöchern, breitem langen Behang, breiter Brust, starkem aber nicht plumpen Knochenbau, kurzer Ruthe.

Wenn wir bereits oben gesagt haben, daß beide Racen der Jagdhunde als Hühnerhunde dressirt werden können, so scheint doch eine dritte ganz vorzüglich dazu geboren. Ihr Haar ist kurz und glatt, doch giebt es auch zottig langhaarige aus Vermischung mit Seidenhund entstanden, welche zugleich Schwimmhäute haben und Wasserhunde genannt werden. Die Farbe ist gewöhnlich weiß, dann mit braunem Behang und braunen Flecken, auch ganz braun, grau oder gelblich, selten schwarz. Die höchste Ausbildung des Geruchssinnes ist ihm eigen, sie macht es ihm möglich, die Spur des Wildes aufzusuchen und zu verfolgen, auch wohl Trüffeln unter der Erde zu entdecken. Nächst feinerm Geruch (guter Nase) sieht man auf den schönen Behang und auf das Benehmen des Hundes. Er muß nämlich sehr ruhig suchen, dabei wohl den Kopf senken, aber nicht mit der Nase die Erde beschnuppern, sondern das Wild in einiger Ferne aufspüren, er muß nicht in gerader Linie laufen, sondern hin nnd her revieren und wenn er dann etwas riecht (in die Nase bekommt), sich behutsam nähern (anziehen) und zehn bis sechszehn Schritte weit von dem sich duckenden Wilde, nämlich Rebhühnern, Schnepfen, Fasanen oder Hasen vorstehen, nie aber das flüchtige Wild ohne Befehl verfolgen. Das Vorstehen ist das diesem Hunde eigenthümliche Manöver, weshalb er auch Vorsteherhund oder vorstehender Hund genannt wird. Die Individuen haben verschiedene Weisen, wie sie dasselbe ausführen. Mancher steht steif und starrt das Wild an, andre heben dabei einen Vorder- oder einen Hinterfuß in die Höhe, noch andre legen sich nach vorn tiefer, immer halten sie aber den Kopf nach der Richtung hin, aus welcher die Witterung kömmt. Der Jäger, welcher seinen Hund kennt, kann aus der Art des Vorstehens abnehmen, ob der Hund Rebhühnern oder Hasen vorsteht. Nachdem er das Wild gestellt und der Jäger dadurch in den Stand gesetzt worden, es zu schießen, so tritt die Pflicht des Hundes ein, dasselbe augenblicklich zu bringen (ap-

Digitized by Google

portiren). Ein guter Hund verfolgt auf Befehl auch den blos angeschoßnen Hasen, bis er ihn erreicht und würgt ihn, um ihn seinem Herrn zu bringen. Eine fernere Tugend eines guten Hühnerhundes besteht darin, daß er gehorsam auf den Ruf oder Pfiff, an den man ihn gewöhnt hat, zum Herrn plötzlich zurückeilt (gehorsamen Apell hat). Die Hühnerhunde sind meist gutmüthig, nur die englischen haben etwas Tücke.

Diese Hunde sind für den Jäger, wegen ihrer ausgedehnteren Brauchbarkeit und für die alltägliche Praxis anwendbaren Eigenschaften die wichtigsten, ihre Dressur aber auch die schwierigste. Sie zerfällt in die Stuben und Wilddressur, letztere in die eigentliche Feld, dann in die Holz- und Wasserarbeit. Die Kunst besteht darin, sich dem Hunde verständlich zu machen, Lob und Tadel passend anzubringen und ihn durch die einzelnen Lectionen nicht zu ermüden. Diese finden täglich zweimal statt, einmal Vormittags vor der Fütterung, dann des Nachmittags; sie dauern nicht länger als zehn Minuten bis eine Viertelstunde. Der Herr muß mit dem Hunde ganz allein seyn, ihn auch ganz allein füttern und stets gut und vernünftig behandeln. Die Dressur selbst beschreibt Lenz sehr deutlich und ausführlich.

Im ersten Lebensjahre hält man den Hund in einem freien, wohlverwahrten Tummelplatze. An seinen Namen, an Ruf und Pfiff muß er zeitig gewöhnt werden. Ist er dreiviertel Jahr alt, so wird er leinenführig gemacht: man führt ihn an einer an das leichte Halsband befestigten Leine, und lehrt ihn ruhig linker Hand vorauszugehen, läßt ihn auch späterhin öfter in das freie Feld, um seine Neigung zum Jagen zu prüfen. Bei dem Alter von einem oder anderthalb Jahre beginnt die eigentliche Dressur im umschloßnen Raume, womit man im Februar oder im Juli oder August beginnt. Während der ganzen Zeit, in welcher der Hund dressirt wird, legt man ihn an einen stillen Ort an die Kette, er darf blos seinen Herrn sehen und nie kurz vor der Lection Nahrung erhalten. Eine Dressirleine von 10 Fuß Länge hat am Vorderende ein Oehr, hinter welchem in Entfernung von zwei zu zwei Zoll dicke Knoten geknüpft werden, so daß diese nicht durch das Oehr laufen können, worinn man das andere Ende durchgezogen hat, so bildet sich ein dem Hunde passendes Halsband. Noch braucht man eine kurze Peitsche und einen Dressirbock. Dieser ist ein Strohbündel, 16 Zoll lang und 1¼ Zoll dick, fest mit Bindfaden umwunden, so daß nur 3 Zoll auf jedem Ende frei bleiben. Diese Enden werden umgebogen, so kommt der Bock auf diese zu stehen. Die erste Lection von 10 Minuten lehrt ihm das Herbeikommen auf den Pfiff oder Zuruf, woran er sich gewöhnen soll. Man ruft „hierher!" und wenn er kömmt, wird er gelobt, gestreichelt, auch wohl mit Brot belohnt, kommt er nicht, so wird er mit der Leine gezogen. Hat er das „hierher" gelernt, so folgt das „herum" indem man ihn bald auf die eine bald auf die andere Seite während des Herumführens kommen läßt. Nach Beendigung der Lection kommt er wieder an seine Kette und erhält seine Fütterung.

Die zweite Lection beginnt mit Wiederholung der ersten, fällt diese günstig aus, so kann der Uebergang zum Fassen und Apportiren geschehen. Der Apportirbock liegt an der Erde, man zieht den Hund mit der Leine dahin, drückt den ganzen Leib desselben platt auf den Boden, fasst ihn am Genick und erhält ihn so in liegender Stellung. Mit der andern Hand schiebt man ihm jetzt den Bock vor das Maul mit dem Worte: „fass!" greift ihm zugleich von beiden Seiten in die Maulwinkel, öffnet ihm das Maul und schiebt ihn den Bock bis hinter die Eckzähne (Fänge), ruft wiederum „fass!" und schließt ihm das Maul mit der Hand. Nach kurzer Zeit comman-

Digitized by Google

dirt man „aus!“ und nimmt ihm den Bock, wenn er ihn nicht sogleich von selbst losläßt, in derselben Weise wieder ab. Dies Alles wird öfter wiederholt. In der dritten Lection folgt nach Wiederholung des Obigen das eigentliche Apportiren. Man läßt ihn mit dem Apportirbocke im Maule, welches man zuhält, einige Schritte vorwärts gehn, nachdem man ihn aufgehoben hat, auf den Zuruf „apporte!“ muß er kommen lernen, dann folgt wieder das „aus!“ und er muß die Beute ablegen. Er lernt nach und nach das Maul allein zuhalten und den Bock so lange tragen, bis er zum Ausgeben commandirt wird. Ist er so weit, so werden die umgebognen Strohbeine des Bocks abgeschnitten und er wird gewöhnt ihn länger zu tragen. Man giebt dann, wenn dies gelungen, anstatt dessen auch andere Dinge, z. B. Stücken Holz, und wirft sie weit von sich, damit er sie holt. Ist er darauf gehörig ausgeübt, so folgt anstatt jener Dinge ein Hasenbalg, mit Steinen nach und nach angefüllt, wirkliche Hasen, Rebhühner zuletzt Raubthiere und Raubvögel, Krähen, Elstern u. dgl. Nachdem er sich an dies Alles gewöhnt, folgt der Unterricht über das Verlorensuchen. Man läßt während des Gehens einen Gegenstand, den er zu apportiren sich gewöhnt hat, fallen, bleibt nach etlichen Schritten stehen und ruft: „such verloren!“, man leitet ihn dabei nach den Gegenstand und zeigt ihm denselben und ruft „apporte!“ — Hat er auch dies gelernt, so folgt das tout beau – Machen. Der Apportirbock wird einige Schritte vor ihm auf den Boden gelegt, der Hund dann mit der einen Hand auf den Rücken, mit der andern auf den Kopf niedergedrückt, dabei ruft man „tout beau!“ läßt ihn eine Zeitlang ruhig liegen, ruft dann „avance!“ indem man ihn etwas vorwärts zieht, man wiederholt jenes und dieses und läßt ihm später, wenn er gelernt hat, am Bock fressen und Apportiren. Dies letzte Manöver der Stubendressur ist eine wichtige Vorschule für das folgende. Hat er indessen obiges alles gut behalten und eingeübt, so versucht man dasselbe ohne Leine, nimmt indessen dieselbe wieder, wenn er etwas verweigert. Nachher wird dasselbe Verfahren erst mit, dann ohne Leine im umschlossenen Garten angewendet, alle einzelne Tempo's werden länger ausgedehnt.

Zur Feldarbeit führt man den Hund an der Leine und mit der Peitsche in der Hand ins Freie, wo es wenig Wild giebt. Man löst das Halsband von der Leine und läßt ihn mit diesem los. Entfernt er sich zu weit, so commandirt man „herum!“ und wenn er zu hitzig ist: „sachte! sachte!“ Folgt er noch nicht, so ruft man „hierher!“ und nimmt ihn wieder, je nachdem er bald oder später kann, länger oder kürzer zur Leine. Man läßt ihn nachher wieder los, mit dem Zurufe „such! such!“ Suchen nach Lerchen und dergl. kleinen Vögeln wird ihm mit dem Zuruf „Pfui!“ untersagt und niemals dergleichen vor ihm geschossen. Hat er sich im Suchen folgsam bewiesen, so bringt man ihn dahin, wo Rebhühner liegen, aber wenig Hasen, läßt ihn gegen den Wind gerichtet (unter dem Winde) suchen und ruft ihm, sobald er etwas spürt (in der Nase hat), zu „sachte!“ Sobald er stutzt (anzieht), wird gerufen „tout beau!“ er beachtet dies anfangs nicht, sondern sprengt die Hühner auf, darauf wird er an die Leine genommen und gezwungen, vor dem Lager der Hühner so lange tout beau zu machen, bis der Jäger das Lager einigemale umkreist hat. Hierauf wird er dahin gebracht, wo die Hühner nach ihrer Verscheuchung eingefallen sind, hält ihn an der Leine, läßt ihn dem Winde entgegen suchen, ruft ihm wieder zu „sachte“ und läßt ihn tout beau machen, sobald er Miene macht, stutzen oder hinspringen zu wollen. Wenn er fast niederliegt oder aufsteht, kreist man um das Lager der Hühner, bis man sie sieht,

Digitized by Google

geht dann zurück und führt den Hund unter dem Zurufe „hierher!“ ab, läßt ihn wieder avanciren und tout beau machen, kreist wieder und stößt endlich die Hühner auf, während man den Hund vom Nachfahren abhält. Man folgt der Stelle, wo sie wieder eingefallen sind, und wiederholt dies alles so lange, bis der Hund seine Pflichten gelernt hat. Man bemüht sich dann ein Huhn im Sitzen oder im Fluge zu schießen und nimmt sich dabei sehr in Acht, einen Fehlschuß zu thun. Das gefallne Huhn läßt man vorschriftsmäßig, d. h. ohne es zu schütteln oder zu zerbeißen, apportiren. Ist er dabei zu hitzig, so darf er an die folgenden geschossnen Hühner nicht eher, bis sie gänzlich todt sind. Nach dem Schusse muß er sich ruhig zurückbegeben und neben dem Jäger niedersetzen, nicht schwärmen. Die beste Zeit zur Einübung auf die Hühner ist im März und April, wo dieselben paarweise liegen und der September, wo die Jungen noch nicht wild sind. Die Einübung auf Schnepfen und Hasen geschieht ganz auf ähnliche Weise, im September.

Für die Holzarbeit wird der Hund in Gebüsch gebracht, wo ihn indessen der Jäger immer sehen kann, und vorzüglich auf das „herum!“ eingeübt, indem man oft schwenkt.

Die Wasserarbeit beginnt mit dem Apportiren eines beliebigen Gegenstandes, den er gut fassen kann und welchen man immer weiter in das Wasser hineinwirft. Nur muß man den Hund selbst nicht mit Gewalt in das Wasser werfen. In der Mitte des Juli lehrt man ihn auf junge Enten gehen, am besten wo man selbst mit hineinwaden kann und kein schneidendes Schilf ist, auch wohl unter Anleitung eines guten schon eingeübten Hundes.

Hat man die allgemeine Dressur im Februar begonnen, so muß dieselbe im November vollendet seyn und der Hund bei einem guten Schützen gut bleiben. Das Glück im Dressiren ist oft mehr eine Prüfung der Eigenschaften des Meisters als deren des Hundes. Ein gewisser Grad von Festigkeit und Würde des Characters, eine reine Humanität und ein klarer Verstand sind Erfordernisse, ohne welche der Mensch sein Uebergewicht über das Thier nicht in Ausübung zu bringen vermag. Eine leicht verständliche Mittheilung, eine verständige Ruhe, geprüfte Geduld und präcise Gleichförmigkeit in der Anstellung und im Commando für jedes einzelne Tempo, eine milde Anerkennung eines jeden guten Erfolgs durch freundliche Worte und Abkürzung erfolgreicher Belehrungen, eine ernste und augenblickliche Verweisung von Fehlern, nur im äußersten Falle Schläge mit der Peitsche und nur gegen Bosheit, vorzüglich gegen Bisse nach der Hand des Lehrers, für eine kurze Zeit noch überdies das Anschließen mit Niederdrücken, indem man die Leine durch einen am Boden befestigten Ring zieht, eine liebevolle und Vertrauen erweckende Behandlung außer den Lectionen und eine gänzliche Abschließung von Berührung mit andern Menschen sind geeignet gute Hunde zu bilden und solche gut zu erhalten. Dagegen werden auch die besten Hunde durch Rohheit und Ungeduld von Jägern, welche selbst schlechte Erziehung und Vorbildung genossen haben, oder zu wenig Würde besitzen, um sich Auctorität durch Güte zu erhalten, gänzlich verdorben (sie verschlagen), während der humane Lehrer höchst selten in den Fall kommen wird, einen Hund für unfähig erklären zu müssen. Wie sehr schon die Alten die Humanität bei Abrichtung der Hunde empfehlen, finden wir mit trefflichen Worten geschildert im Cynegeticon von Nemesianus, welcher zu Ende des dritten Jahrhunderts zu Carthago lebte. Eine höchst gelungene Uebersetzung eines

Digitized by Google

Stückes dieses schönen Gedichtes gab der Reg. Rath Bunsen in Wildungens, Taschenbuch für Forst- und Jagdfreunde 1807. S. 106—119. Dort ist vorzüglich von Windhunden die Rede, unsre Jagdhunderacen wurden erst später bekannt.

209. 210. Der Stöberhund, Stöber, Spionhund: irritans, vertago ≍ avicularius.

Franz.: Chien de guête, requerant. — Engl.: the beagle. — Der kleine Jagdhund, Die Steinbracke nach v. d. Borch. vgl. Sylvan 1815.

Wuchs des Hühnerhundes, Größe, Farbe und Abzeichnung des Dachshundes.

Ein Mittelschlag aus kleinem Jagd- oder Hühnerhund und Dachshund erzeugt, dies ist der Stöberhund bei Walther, Behlen u. a., welche vorzüglich in den Niederlanden vorkömmt. Andere, besonders in England nehmen zum Aufstöbern den großen Seidenhund, der immer noch klein genug ist, um im dichten Gestrüpp und in Hecken zu arbeiten, wobei der glatthaarige indessen mehr zu empfehlen ist. Auch die Alten hatten ihre Stöberhunde: Κύνες ἰχνευτικοί oder investigatores. Die Stimme (Hals, Laut, Geläute) ist verhältnißmäßig stark und von besonderem Ausdruck, das Thier selbst gelehriger, anhänglicher und reinlicher als der große Jagdhund. Er wird zu Schonung des Wildstandes als Jagdhund empfohlen, wenn die erforderliche Aufmerksamkeit auf seine Erziehung und Führung verwendet wird. Er erhält zuerst die Koppelführung, man lasse sich aber auch die Mühe nicht verdrießen, ihn zum Gehorsam des Hühnerhundes zu gewöhnen, damit er dessen Apell erlernt. Der größte Vortheil für den Schützen besteht darin, daß das Wild solche Reviere nicht flieht, wo es nur durch kleine und langsam jagende Hunde aufgesprengt wurde, auch hat man den Vortheil, daß ihm alles Wild gut und trollend anläuft. Diese Race wird als Dachshund gebraucht, doch taugt sie dazu weniger, auch sind sie nicht als Haushunde zu empfehlen, denn sie sind Näscher.

211. 212. Der große Jagdhund: acceptorius, acceptoricius Leg. Fries.

Latein. im zehnten Säculo: Canis sequax, segusius, segutius seuces saecis, sucis seusis, sussis, seusius. — Alt.: Triphund, Hapihuhund (im zehnten Säculo) — Franz.: Chien de Chasse, de chasse par-force. — Parforcehund. — Engl.: the hound, Setter, pointer, talbot. — Ital.: cane di caccia. — Russ.: Goutschaja. — Maloross. Chort.

Der Kopf ist rund, stark, mit breiter gewölbter Stirn, der Scheitel mit starkem Kamm, die Schnautze stark, weit geschlitzt und fast so dick als lang, Nase breit, Augen vorliegend, Lippen und Ohren breit und sehr lang herabhängend; Leib mäßig stark, mit kräftiger Brust und mäßiger Verschmächtigung nach hinten, Schenkel und Läufe muskulös ohne dick zu seyn, an den Afterzehen ausgebildete, gebogene Klauen, Ruthe allmählig verschmächtigt, mäßig gebogen.

Diese größte Race der eigentlichen Jagdhunde wird etwa 3 Fuß und 4 bis 5 Zoll lang, 1 Fuß 7 — 8 Zoll hoch, dabei kurz- und glatthaarig, variirt aber durch ursprüngliche Vermischung oder klimatischen Einfluß auch rauchhaarig und zottig; die Farbe erscheint allerdings am häufigsten weiß, nicht selten mit braunen oder schwarzem Behang oder braunem Kopf und Rücken, oder grau oder auch hellbraun oder kastanienbraun, dann gewöhnlich mit weißer Bläße. Die ursprüngliche Race scheint einfarbig hellbraun gewesen zu seyn, auch kommt die Urfarbe des Hundes, schwarz mit rostbrauner Dachszeichnung, vor. Hellbraun mit dunkelerem Rücken und Behang hat sich der

Digitized by Google

Stamm der Abtei St. Hubert und eine Stiftung des Kaisers Joseph II. an der Donau erhalten, welcher Stamm aus Nachkommen der Hunde des heilgen Hubertus bestehen soll. Man unterscheidet die Jagdhunde nach verschiedenen Ansichten, ursprünglich liegt dabei das Vaterland zu Grunde, von welchem die Verbreitung der Familie derselben ausging, dann verräth sich aber auch die Abstammung einigermaßen durch die Farbe, welche die eine Race beizubehalten pflegt.

213. Der Leithund, Spürhund: indagator,

Griech.: μετάγοντες Gratii Falisc. 209. — Im zehnten Säculo: Laitihunt, Leithihund ℓ Spurihunt. — Senees qui in ligamine vestigium tenet. — Franz.: Chien muet, le limier. — Ital.: cane cercatore. — Engl.: the limer, Lime-hound. — Fährtenhund.

Aus voriger Race, von mittelmäßiger Stärke, doch mehr groß als klein. Kopf dick, Schnautze lang, Nase dick und breit, Behang und Oberlefzen weit herabhängend, Rücken gestreckt, Brust breit, stark, Läufe dick, nur mäßig hoch, der untere Theil oft gelb, Ruthe lang, nur wenig aufwärts gekrümmt, von der Wurzel aus stark und gegen das Ende hin zugespitzt, Haare meist kurz und dicht, Urfarbe, sonst schwarz oder gelblich, braun, rothbraun, wolfsgrau.

Mehr bezeichnet durch seine Dressur. Er ist die Zierde der Jägerei, und verlangt deshalb sorgfältige Erziehung und Pflege. Man giebt ihm ein trocknes, reinliches Lager, niemals zu warmes Futter, wodurch sein Geruchsorgan — dessen Erhaltung und höchste Ausbildung das vorzüglichste Augenmerk des Erziehers seyn muß — geschwächt werden würde, und behandelt ihn unausgesetzt mit Liebe und Schonung um sein Vertrauen zu erhalten. Jung erhält er nur im Zwinger in Gesellschaft friedlicher Hunde die nöthige Leibesbewegung, zur Behängzeit (vom August bis zum harten Frost) wird er angelegt erhalten, um sich ein gesetztes, ruhiges Betragen anzueignen, welches für seinen Beruf unerläßlich ist. Der Leithund wird gebraucht, um am Hängeseile die frischen Fährten des Hochwildes, vorzüglich des Edel- und Schwarzwildes aufzusuchen und solche dem Waidmann zur Beurtheilung zu bezeichnen. Er heißt in dieser Beziehung auch Fährtenhund und ist bei Ausübung der hohen Jagd besonders nützlich und unentbehrlich, wo es darauf ankommt, den jedesmaligen Stand des Roth- oder Schwarzwildes genau zu erforschen. Seine Arbeit zeichnet sich dadurch aus, daß er die Nase tief an den Boden hält, d. h. eine tiefe Suche hat und dabei stumm ist (Chien muet) um das Wild nicht zu verscheuchen. Der hirschgerechte Jäger zeigt sich durch die eigne genaueste Kenntniß aller Fährten des Hochwildes, so wie durch das Talent, diesen Hund vollkommen zu dressiren und gut zu gebrauchen, denn die Eigenschaften des Jägers, welche zum Dressiren des Hühnerhundes als nöthig genannt werden sind, werden bei dieser Aufgabe in noch höherm Grade verlangt.

Das Abrichten (die Arbeit) geschieht auf Rothwild, wenn sich dasselbe gefärbt hat, d. h. vom Ende des Mai bis Ende Juli, wo die Feistzeit eintritt und der Leithund nun bei dem Hirschjagen nothwendig wird. Auf Schwarzwild arbeitet er vom August an bis zum harten Frost, also in der Behängzeit, bis zum Anfang des Saujagens.

Digitized by Google

226. Die altengliſche Dogge: Albionensis, Britannicus.

Engl.: the old-english dog.

Groß und kräftig, Kopf länglich, Schnaute etwas geſtreckt, von den Seiten zuſammengedrückt, Ohren außerordentlich groß, zuſammengerollt.

Scheint die höchſte und edelſte Ausbildung des Jagdhundes zu ſeyn, vielleicht die Dogge, welche Oſſian beſingt, oder der britanniſche Hund, deſſen die Alten gedenken. Sehr ſchön drückt dies v. d. Borch in ſeiner Ueberſetzung des Nemeſianus aus, wenn er ſagt: „doch nicht Sparta allein, und nicht die berühmte Moloſſis, auch Brittannien ſchickt, das ferne, treffliche Hunde.“*) Die Race iſt heut zu Tage in England ſelbſt ziemlich ſelten.

225. Die engliſche Dogge: mastivus Ray, anglicus Linn.

Franz.: le Dogne de forte race. — Engl.: the Mastiff.

Sehr groß, Kopf groß und dick, Schnaute kurz und zuſammengedrückt, Lippen dick und hängend, Ohren faſt dreieckig, meiſt eine fünfte Zehe an den Hinterfüßen.

Die Entſtehung der Race ſchreiben einige der Vermiſchung des Bullenbeißers und irländiſchen Wolfhundes zu, andere leiten ſie vom Bullenbeißer und großen Däniſchen, andere vom erſteren und Bauer- oder Fleiſcherhunde ab. Wer viele dieſer Hunde geſehen hat, wird ſich auch erinnern, daß dieſelben, genau betrachtet, in ſo vielen Einzelheiten von einander abweichen, daß man ſie als auf verſchiednem Wege entſtanden betrachten muß. Vom Bullenbeißer unterſcheidet ſich die Dogge durch mehr zuſammengedrückte Schnaute, nicht aufgeſtülpte, ſondern bis an den Lippenrand vortretende Naſe, breiteres Behänge, bedeutendere Größe bei geſtreckterem Wuchs. Die ächte Race ſoll einfarbig ſeyn, dies mag bei Abſtammung vom inländiſchen und däniſchen Hunde öfter vorfallen, bei Herleitung vom Fleiſcherhund erſcheint wohl der Zuſtand am gewöhnlichſten, das auf einer hellbraunen Grundfarbe ſchwarze Querſtreifen vorkommen und das Maul ſchwarz iſt.

Die Doggen ſind in Hinſicht auf ihr Naturell ebenſo verſchieden als in Beziehung auf ihre Abkunft. Die letztgenannte Form iſt wohl die am wenigſten edle, ſie ſteht auf der niedrigen Bildung der Bluthunde, hat einen verhältnißmäßig zur Leibesgröße kleinen Schädel, welchem das ziemlich kleine Gehirn entſpricht. Sie iſt nur als Fleiſcherhund oder Hofhund, oder als Zugthier anwendbar und keiner beſondern Erziehung fähig. Die edleren Doggen Britanniens ſcheinen diejenigen zu ſeyn, welche aus der Paarung vom Bullenbeißer und däniſchen oder irländiſchen Hunde entſtanden ſind. Dies ſind die ſogenannten Kammerhunde, welche die Schlafzimmer der Großen des Nachts zu bewachen würdig erſcheinen, eine Race von imponirenden Aeußern, beſſerer Haltung und gewaltiger Kraft, gewöhnlich ſchmutzig weiß mit dunkleren Flecken oder Streifen. Sie ſind treue und kräftige Wächter, welche den Feind leicht in Stücken zerreißen, da ſie im Wiederſtande ausdauern. Es iſt bekannt, daß die Römer, als ſie Herren von England waren, vorzüglich die Race der Doggen fortpflanzten und in Rom gehörte es zum

*) Sed non Spartanos tantum tantumve Molossos pascendum catulos: divisa Britannia mittit veloces, nostrique orbis venatibus aptos. Nemes. Cyneg. 124. 125.

Digitized by Google

Anstande der Vornehmen, einige dieser grimmigen Wächter im Hause zu halten, auch wurden viele verbraucht, um im Amphitheater zur Belustigung des Volkes mit wilden Thieren zu kämpfen. Als schwere Hetzhunde auf Bären, Wölfe und wilde Schweine braucht man sie noch jetzt, wo diese Thiere noch hausen. Die Doggen haben die Eigenheiten anderer großen Hunde, so daß sie bei ihrem großen Phlegma die Ruhe lieben, sich, so lange sie nicht in Affect gebracht sind, nur langsam bewegen und sich von den kleinen Hunden viel gefallen lassen, ohne diese eines Blicks zu würdigen, bis ihnen endlich die Geduld reißt. Griffith erzählt von einer Dogge, welche oft von einem Gassenhunde beunruhigt und durch dessen beständiges Bellen gequält wurde, diese faßte endlich mit dem Maule den Hund bei dem Rücken und trug ihn über den Wasserweg in das Wasser, ohne ihm sonst irgend etwas Leid zu thun. — Wichtig zu bemerken ist noch die Schwierigkeit, welche bei der Fortpflanzug dieser großen Hunde obwaltet; die Männchen werden von der Paarungszeit wenig ergriffen, und die Weibchen vermindern noch durch Fehlgeburten die Zahl ihrer Nachkommenschaft.

227. **Der dänisch-englische Blendling: Danico-mastivus.**

Franz.: Métis du dogue de forte race et du chien danois. — Engl.: the Danish-English Dog.

Dem dänischen Hunde in der Färbung und im Behange gleich, der Dogge in Größe und starkem Bau.

Dies ist der letzte, welcher sich von den ungeheueren Hunden August's II., Königs von Polen und Churfürsten von Sachsen im Museum zu Dresden erhalten hat. Er mißt von der Schnautzenspitze bis zu den Ohren einen pariser Fuß, von da bis zum Ansatze des Schwanzes fünf pariser Fuß! Major Hamilton Smith spricht seine Verwunderung über diesen Hund bei Griffith aus und erzählt sehr richtig, daß in demselben Museum zugleich ein Zwerg von großer Hühnerhundrace vorhanden ist, welcher im Besitz eines Münzaufwärters hier zwei Jahre alt geworden, dabei aber so klein geblieben ist, daß er nur so viel mißt als jener große Sauhetzer von der Nasenspitze bis zum Augenwinkel, nämlich 5½ Zoll. Die übrigen colossalen Hunde des genannten prachtliebenden Königs waren meist reine Doggen (weiß mit gelblicher Zeichnung) und wurden so wie jener abgebildete Hund bei den Hetzjagden gebraucht Auf den zahlreichen Oelgemälden im Jagdschlosse Moritzburg findet der Liebhaber noch diese Hundehelden verewigt.

228. 229. **Die Cubanische Dogge, der Cuba-Hund: mastivus Cubanus.**

Engl.: the Cuban Mastiff.

Offenbar ein Sprößling vom spanischen Bullenbeißer und der englischen Dogge, daher viel zu jenem sich hinneigend.

Kapitain Marryat brachte diese schönen Doggen von Cuba und übergab sie der zoologischen Societät im Regent Park. Sie sind größer als die gewöhnlichen Bullenbeißer und kleiner als die großen Doggen, schön gebaut in allen Verhältnissen, die Beine mäßig hoch, muskulös und kräftig. Die Schnautze ist kurz, breit, wie abgestutzt, gegen die Stirn hin aufwärts gewölbt, der Kopf übrigens breit und flach, die Oberlippen so tief herabhängend, daß sie die Unterlippen bedecken. Die Ohren sind mittelgroß, größtentheils hängend, aber nicht sehr lang und breit, so daß sie die Kopfseiten nicht bedecken. Die Ruthe ist etwas kurz, walzig und gegen das Ende nach

Digitized by Google

oben vorwärts gekrümmt. Das Haar ist kurz, dick endigend und glatt. Oberwärts ist die Farbe ein schönes Braun, welches nur nach der Unterseite zu blasser wird. Schnauze, Lippen, Ohren inwendig und auswendig, so wie ein rundlicher Fleck über jedem Auge sind düster schwarz. Sie sind, ungeachtet bei dieser ganzen Sippschaft der Doggen der Raum der Hirnschale nicht groß ist, doch außerordentlich treue und muthige Thiere, dabei höchst kraftvoll. Darum eignen sie sich vor anderen zu Hauswächtern und Wachthunden überhaupt, werden auch zu Kämpfen mit Ochsen und ähnlichen Spielen der Rohheit auserkohren. Die Exemplare im Garten der zoologischen Societät sind, besonders das Weibchen, ziemlich gutartig, nur darf man sie nicht reizen. Sie haben sich bereits daselbst fortgepflanzt.

230 — 236. **Der englische Kampfhund: mastivus gladiator.**

Engl.: the box-dog.

Größe eines mäßigen Bullenbeißers, von höchst robustem Baue, vorzüglich muskulös am quer gerunzelten, etwas länger behaarten Halse, an der Brust und den vorderen Beinen.

Eine mittelgroße, äußerst kräftige Zuchtvarietät, welche wahrscheinlich aus dem englischen Bullenbeißer und einer eigenthümlichen reinen Fleischerhundrace entsprungen sein mag. Die vorderen Leibestheile des Thieres sind so muskulös, daß sich dasselbe zu Kämpfen in aufrechter Stellung vorzüglich eignet, und in England dazu gebraucht wird. Von den drei erwachsenen Exemplaren, welche sich hier im Besitz zweier Engländer befanden, schien keines von besonderen Fähigkeiten, außer für jenen Zweck mit einander in aufrechter Stellung ringend zu kämpfen. Da das Pärchen sich hier fortpflanzte, so kamen die Jungen hier an verschiedene Besitzer und fanden eine verschiedene Behandlung, in deren Erfolg sich ergiebt, daß sie sogar der Dressur des Hühnerhundes entsprechen.

Rückblick auf die Racen. Wenn wir auf diese Weise die uns bis jetzt bekannt gewordenen Racen und Nebenracen der Hunde nebst einigen Doppelblendlingen in eine Uebersicht zu bringen versuchten, welche ihrer Abstammung zu Grunde gelegt wurde, so mögen wir dabei die seitlichen Beziehungen der einzelnen Glieder dieser Anordnung nicht aus dem Auge verlieren, auch bei einem Rückblicke auf diesen Versuch bemerken, wie durch dessen Entwicklung ein Verfolg der Veredelung dieser vielgestaltigen Thierart vor Augen zu legen, erstrebt wird. Die Race der Spitzhunde blieb diejenige, welche allein die wilden oder halbwilden Formen in sich einschloß, denn sie ist die niedrigste auf der Stufe der Entwicklung. Das mildere Clima Spaniens und Italiens mochte die rauchhaarigen Wolfsspitze von ihrem wilden Naturell entwöhnt, und ihre grobe Behaarung bei allmäliger Fortpflanzung verfeinert haben, denn die große Race der Pudel oder Seidenhunde hat lauter Vorbilder gehabt, welche aus diesen Ländern entsprangen. Die dritte Race, die der Bluthunde, zeigt im äußern schlanken Wuchs eine Veredelung der Formen, während der Schädel, an dieser Verschmächtigung theilnehmend, eine freiere Ausbildung der Gehirnmasse nach deren höheren Richtung hinunterdrückt, so daß nur die wildern Triebe des Raubthieres in ihnen frei sich entwickeln. Jene zärtliche Anhänglichkeit und jener Gehorsam, welcher die edlern Hunde characterisirt, bleibt ihnen deshalb im Allgemeinen fremd, nur hier und da in individueller Entwicklung als Resultat mühsamer Erziehung einigermaßen sich andeutend. Wenn sich

Digitized by Google

hier, wie immer in den Reihen, welche wir in der Natur als rein natürliche erkennen, ein Rückschritt nach dem Niedern, hier also nach dem wildern Zustande der ersten Race beurkundet, so schließt sich dennoch die der Bluthunde unzertrennlich an die höchste Entwicklungsreihe, in welcher die Race des mit Wahrscheinlichkeit aus dem despotischen Orient entsprossenen Jagdhundes unmittelbar nach ihr sich zu entfalten beginnt. Die gänzliche Ergebenheit in den Willen des Menschen, auch durch ein äußeres Zeichen, nämlich durch das nun vollkommen hängende Ohr sich aussprechend, dann der unbedingte Gehorsam, welcher jeden Wink des Herrn augenblicklich befolgt, endlich das selbstprüfende Urtheilen des Jagdhundes, welches nur durch die höchste Ausbildung des Instinctes vermittelt, uns fast zur Ahnung einer menschlichen Vernunft im Thiere auffordern möchte, alle diese Verhältnisse sind so ganz geeignet, auf dieser Stufe den Hund in diejenige innige Berührung mit dem Menschen zu setzen, welche überhaupt aus dem Ideale einer thierischen Bildung hervorgehen kann; denn der Hund wird durch sie das Höchste, was — bei seiner thierischen Organisation — aus ihm zu werden vermag, er wird Vertheidiger, Gehülfe, Wohlthäter des Menschen.

Fragen wir nach den Anordnungen der Hunderacen bei andern Schriftstellern, so finden wir, daß es einigen mehr um eine Aufzählung als um systematische Stellung derselben zu thun war, dahin gehören auch Linnée und Buffon, andere versuchten indessen eine bestimmtere Zusammenstellung, so Cuvier, welcher sie folgendermaßen ordnet:

I. Matins, Bauerhunde: Kopf mehr oder weniger länglich, Scheitelbeine unmerklich genähert, Gelenkfortsätze der untern Kinnlade stehen mit den obern Backenzähnen in einer horizontalen Linie.

A. Der Dingo. B. Der Fleischerhund. C. Der dänische Hund. D. Der Windhund.

II. Espagneul, Hühnerhunde: Kopf sehr mäßig verlängert. Scheitelbeine über den Schläfen nicht genähert, sondern abweichend, nach außen zu angeschwollen, so daß sie die Stirn und Hirnhöhle erweitern.

E. Wachtelhund.

a. kleiner Wachtelhund. b. Gredin. c. Pyrame. d. Bologneser. e. Löwenhündchen. f. calabrischer Hund.

F. Pudel.

a. Zwergpudel. b. Griffon (rauher Pintscher.)

G. Jagdhund.

H. Hühnerhund. — Dalmatischer Hühnerhund oder bengal. Bracke.

J. Dachshund. — K. Schäferhund. — L. Pommer und Wolfshund. — M. Sibirischer Hund. — N. Eskimohund. — O. Der Alko.

III. Doques, Doggen: Schnauze mehr oder weniger kurz, Schädel hoch, Stirnhöhlen beträchtlich, Gelenkfortsatz der untern Kinnlade über die Linie der Oberbackzähne ragend. Schädel kleiner als bei vorigen.

P. Bullenbeißer. — Q. Englische Dogge. — R. Mops. — S. Isländer. — T. Kleiner Däne. — U. Rocket. — V. Englischer Mops. (Can. f. britannicus Desmar. Var. zwischen kl. dän. Hund und Pyrame.) — X. Artois-Hund. — Y. Andalusier (Hd. von Alikante. — Z. Türkischer oder ägyptischer Hund.

Digitized by Google

Dieſes Syſtem iſt durch die Unterbringung ſehr unähnlicher Formen unter einfache anatomiſche Charaktere künſtlich geworden, ſo daß es mit der natürlichen Entfaltung nicht Schritt hält, auch fehlen zu viele Racen darin, um behaupten zu können, daß ſeine anatomiſchen Kennzeichen überhaupt eine Eintheilung zuließen und nicht vielmehr durch die ſanfteſten Uebergänge ſo verſchmelzen dürften, daß ſie zu Aufſtellung von Grenzen untauglich ſind. Jenem Syſtem ſind aber faſt alle neuern Schriftſteller gefolgt.

Walthers*) Syſtem iſt auf eine umfaßendere Kenntniß der Racen gegründet, hat folgende, meiſt rein natürliche Zuſammenſtellungen:

Canis familiaris.

A. ferus,	B. vagus,	C. subvagus,	D. domesticus,
der wilde Hund.	der verwilderte Hund.	der Wildfang.	der zahme Hund.

Von den drei erſten mehrere wenig ſichere Varietäten, von der letzten Abtheilung aber eine genauere Beſtimmung folgendermaßen:

I. var. villaticus, der Haushund.

a. germanicus, der teutſche Stammhund. aa. pecuarius, der Hirtenhund. — b. Calmuccorum. — c. pyrenaicus, der pyrenäiſche Hund. — d. novae Hollandiae, der Dingo. — e. meridionalis, der auſtraliſche Hund. — f. novae Seelandiae, Neuſeeländiſcher Hund. — g. novae Guineae, der Naf. — h. pomeranus, der Pommer. aa. weiß, bb. ſchwarz, cc. roth, dd. kleiner. aaa. Bassa, der Spitz, Fix. bbb. anglicus, der engliſche Spitz. ccc. alopecurus der Fuchsſpitz. ddd. pastoreus, der Schäferhund. eee. lupinus, der Wolfsſpitz. — i. lapponicus, lappländ. Hund.

II. var. Zingariorum, der Heiden- d. i. Zigeunerhund.

III. var. sibiricus, der ſibiriſche Hund.

a. Camtschatkensis, der Kamtſchatkaiſche Hund. aa. Magnate, der langhaarige. bb. vectarius, der Zughund. — b. groenlandicus, der grönländiſche Hund.

IV. var. islandicus, der isländiſche Hund.

a. Lubbar. — b. Dry Hundar. — c. Dwerg Hundar.

V. var. aquaticus, Budel, Pudel.

a. major, der große Pudel. — b. minor, der Zwergpudel.

VI. var. Danicus minor, der kleine däniſche Hund.

a. Roquet, der Roquet.

VII. var. Extrarius, der Seiden-Pudel, langhaarige Bologneſer.

a. der kleine. — b. die Bouffe. — c. der Burgos. — d. brevipilis, kurzhaariger Bologneſer. — e. flammeus, die Pyrame. — f. melitaeus. — g. leoninus, das Löwenhündchen.

VIII. var. Molossus, der Bullenbeißer.

a. palmatus, der Schwimmfüßler. — b. montis St. Bernhardi, die St. Bernhards-Dogge. — c. mastivus anglicus, die engliſche Dogge. — d. danicus, die däniſche Dogge.. — Can. Tibetius, tibetiſche Dogge. — e. laniarius, der Metzgerhund. — f. aprinus, der Saufinder. — g. suillus, die Saurüde. — h. Fri-

*) Walther, (Dr. Friedr. Ludw.) der Hund, ſeine verſchiedenen Zuchten und Varietäten, Geſchichte ſeiner Verbreitung und Schickſale, Erziehung, Benutzung, Krankheiten und Feinde. Gießen, b. Heyer. 1817.

Digitized by Google

cator, der Mops, le Doguin. aa. artesius, der Artois-Mops. bb. alicanticus, der alicantische Hund. — i. hybridus, der Bastard-Mops, le Roquet.

IX. var. Sagax, der Jagdhund.

a. brevipilis, der glatthaarige. — b. hirsutus, der rauchhaarige, zottige. — c. germanicus, der Deutsche. — d. polonicus, Polnischer. — e. punctatus, getiegerter. aa. gallicus, französischer, aaa. Normänner. bb. anglicus, Englischer. — f. venaticus, Leithund. — g. avicularius, der vorstehende Hund. aa. brauner. bb. weißer. cc. getiegerter. dd. gefleckter. ee. sanfthaariger. ff. zottiger. — h. Bracca, die Bracke. aa. die gemeine, major. bb. minor, die Steinbracke. cc. corsicanus, die Corsische Bracke.

X. var. subcaudatus, der eigentliche Hühnerhund.

XI. var. bengalensis, der bengalische Hühnerhund.

XII. var. leporarius Linn. Grajus Rai, das Windspiel.

A. Große. a. maximus, das große glatthaarige Windspiel. — b. hirsutus, das zottige. — c. hibernicus, das Irländische. — d. turcicus, das Tü kische. — e. curonicus, das Curländische.

B. Kleine. f. minor italicus, Can. leporarius minor, das kleine Windspiel. g. aegyptius, ägyptisches Windspiel.

XIII. var. vertagus, Dachshund.

a. glatthaariger. b. rauchhaariger. c. gerabbeiniger. d. krummbeiniger.

XIV. var. americanus, Amerikanischer Hund.

a. canadensis, kanadischer Hund. — b. novae terrae, der Neufundländische. — c. Rumalco.

Folgende giebt Walther in seiner Aufzählung als nicht besondere Zuchten im Anhang:

1. Scoticus, Schweifshund. — 2. Stöber, Spionhund. — 3. Biberhund. — 4. Parforcehund. — 5. Birschhund, cursorius. — 6. Auerhahnbeller. — 7. Hetzhund, Packhund. — 8. Trüffelhund.

Es ist hiernach zur Verständigung nothwendig, unsre in gegenwärtiger Naturgeschichte versuchte Aufzählung übersichtlich zu wiederholen, wir geben dabei die Nummern unsrer Abbildungen und die Seitenzahl auf welcher sich die Beschreibung findet.

I. Spitzhunde. Canis familiaris orthotus.

Erste Race: eigentliche Spitzhunde. — Nebenracen:

242. 243. Der Viehhund, pecuarius. Seite 136.
119. 557. Der Wolfshund, lyciscus. S. 136.
120. 121. Der Baffinsbaihund, borealis. S. 136.
117. 118. Der Pommer, pomeranus. S. 137.
122. 123. Der langhaarige Spitz, pomeranus villosus, u. 124. Bastard mit vorigem. S 38.
125—129. Der Hund vom Makenziefluße, lagopus. S. 138.

Zweite Race: Pudel-Spitzhunde. — Nebenracen:

132, 571 u. 572. Der Haushund, Hirtenhund, domesticus. S. 138.
Der Alko, Alco. S. 139.
96. Der Techichi, Techichi. S. 139.
174. Der Saubeller, aprinus S. 140.
133 u. 244. Der isländische Hund, islandicus. S. 140.

Digitized by Google

130. Der arctiſche Zughund, areticus vectarius. S. 141.
573—575. Der Otaheiter Hund, otahitensis. S. 141.

Dritte Race: Bluthund-Spitze. — Nebenracen:
112. 113. Der Zigeunerhund, Zingariorum. S. 145. *)
558, 559, 569, 570. Der Spartaner, spartanus. S. 145.
563. Der Dhole, aequinoctialis. S. 146.
Der Colſun, Colsun. S. 146.
564. Der canadiſche Hund, canadensis. S. 146.
(Der mexicaniſche Hund, mexicanus. S. 147 unten in der Anmerkung.)
565—568. Der antarctiſche oder Malouinen-Hund, antarcticus. S. 147.
Der Durango-Hund, durangensis. S. 147.
110, 111, 562. Der Dingo, Dingo. S. 147.
Der ſibir. Alpenhund, alpinus. S. 149.
Der Fuchsſpitz, alopecurus. S. 149.
114. 115. Der Heide-Spitz, campestris. S. 149. — 116. Baſtard mit Dachshund.
Der javaniſche Wolf, lupus? javanicus. S. 150.
Der graue Hund von Paraguay, Aguarachay. S. 150.
Der nackte mexicaniſche Hund, Xoloitzcuintli. S. 150.

Vierte Race: Jagdhund-Spitze. — Nebenracen:
576. 577. Der ſalzburgiſche Doggenſpitz, salisburgensis. S. 150.
555. Der Albaneſer, Albanus. S. 150.

II. Pudel- und Seidenhunde. Canis familiaris lasiotus. **)

Erſte Race: Spitz-Pudel. — Mit ihren Nebenracen:
134. Der Cartshund, brevipilis. S. 142.
135. Der Pyrame, flammeus. S. 142.
136. Der kleine ſpaniſche Seidenhund, hisp. (extrar.) minor. S. 142.
186. Der Trüffelhund, Tuberisequus. S. 145. 169.
145. 146. Der orientaliſche und deutſche Schäferhund, pastoreus. S. 142.

Zweite Race: eigentliche Pudel, Pudel-Pudel. — Mit Nebenracen:
139. Der Löwenhund, leoninus. S. 144.
Der Bouffe, buffo. S. 144.
137. 138. Der Bologneſer, melitaeus. S. 144.
141. 142. Der rauche Pinſcher, gryphus. S. 145.
140. Der Zwergpudel, aquat. minor. S. 144.
143. 144. Der Pudel, aquaticus genuinus et major. S. 143.
247. Der Schnürhund, aquat. funicularius. S. 143.
248. 249. Der Schafpudel, aquat. lanatus. S. 144.

Dritte Race: Bluthund-Pudel.
147. 148. Der Calabreſenhund, calabricus. S. 151.

Vierte Race: Jagdhund-Pudel.
246. Der Burgos, Burgensis. S. 152.
150. Der große ſpaniſche Seidenhund, extrarius maior. S. 152.
245. Der Pudel-Wachtelhund, extrarius crispus. S. 152.

III. Bluthunde. Canis familiaris laniarius.

Erſte Race: Spitz-Bluthunde.
163. 164. Der Jaroslaviſche, jaroslavensis. S. 152.

---

*) Durch Unachtſamkeit des Setzers iſt dieſe Race nach den beiden folgenden eingereiht worden, ſie ſollte S. 142 oben beginnen.

**) ſtehen alſo im Texte fälſchlich S. 142 und ſollten erſt nach dem Albaneſer folgen.

Digitized by Google

Zweite Race: Pudel-Bluthunde.

173. 174. Der Rüde, Rudo. S. 153.

Dritte Race: Eigentliche Blut- oder Windhunde.

151—153. Der afrikaniſche Bluthund, aegyptius. S. 153.
154. Derſelbe gemähnt, subjubatus. S. 154.
155. Derſelbe zottigohrig, lasiotus. S. 154.
582. Der Buckelhund, gibbosus. S. 154.
156—158. Das Windſpiel, leporarius. S. 154.
159—162. Der große Windhund, graius maximus. S. 156.
161, 584—588. Der türkiſche Windhund, graius turcicus. S. 156.

Vierte Race: Jagdhund-Bluthunde.

170—172. Der Fleiſcherhund, laniarius. S. 158.
166. 167. Der große däniſche Hund, danicus. S. 158.
169. Der irländiſche Hund, iricus. S. 158.
168. Der leichte Curshund, cursorius curonicus. S. 159.
583. Der Soloſänger, solicapus. S. 159.

IV. Jagdhunde. Canis familiaris sagax.

Erſte Race: Spitz-Jagdhunde.

149, 237. 238. Der Neufundländer, terrae novae. S. 159.

Zweite Race: Pudel-Jagdhunde.

239—241. Der St. Bernhardshund, Sancti Bernhardi. S. 160.

Dritte Race: Blutjagdhunde.

214—216. Der Mops, fricator. S. 161.
Der Artoishund, artesius. S. 162.
581. Der Alikante-Hund, alicantensis. S. 162.
217. Der Roquet, hybridus. S. 162.
165. Der kleine däniſche, variegatus. S. 162.
219. Die Doppelnaſe, Molossus Nasica s. palmatus. S. 163.
220. 221. Der Rundkopf, Molossus orbicularis. S. 864.
222—224. Der Thibetaniſche Bullenbeißer, Molossus thibetanus. S. 164.

Vierte Race: eigentliche Jagdhunde.

589—591. Der ächte Otterhund, platyurus. S. 166. u. 134.
176. Der eigentliche Dachshund, vertagus valgus. S. 167.
177. 178. Der Schweineſchwanz-Dachshund, vertagus syosurus. S. 168.
179. Der braune Dachshund, vertagus brunneus. S. 168.
180. Der geſtreifte Dachshund, vertagus striatus. S. 168.
181. Der bunte Dachshund, vertagus varius. S. 168.
182. Der langhaarige Dachshund, vertagus longipilis. S. 168.
183. Der zottige Dachshund, vertagus villosus. S. 169.
184. 185. Der gerabbeinige Dachshund, vertagus rectipes. S. 169.
(186. Der Trüffelhund, tuberisequus ſteht näher dem Schäferhunde.)
187. 188. Der glatte Pinſcher, fricatore-vertagus. S. 169.
189. 190. Der dünnſchwänzige Jagdhund, venatorius conirostris. S. 169.
191. Der Schweißhund, conirostris scoticus, sanguisequus. *) S. 170.
192. Der engliſche Fuchshund, conirostris vulpicapus. S. 170.
193. 194. Der Zahnen-Fuchshund, idem lasiurus. S. 171.
195. Der große Hühnerhund, crassirostris avicularius maior. S. 171.
696. Der Waſſerhühnerhund, aquatilis. S. 171.
196. 197. Die Bracke. Bracca. 196 die corſicaniſche. 197 die franzöſiſche.

*) Seite 170 iſt durch einen Druckfehler anguisequus anſtatt sanguisequus geſetzt worden.

Digitized by Google

594. 595. Die ragusanische Brakke, Bracca ragusanus. S. 172.
198. Der englische Jagdhund, acceptorius anglicus. S. 172.
199—202. Der französische Jagdhund, acceptorius gallicus. S. 172.
211. 212. Der deutsche große Jagdhund, acceptorius germanicus. S. 172., beschrieben S. 178.
213. Der Leithund, indagator. S. 179.
597—599. Der französische Parforcehund, cursorius gallicus. S. 173.
592. 593. Die Steinbracke, Bracca minor. S. 174.
204—208. Der eigentliche Hühnerhund, avicularius genuinus. S. 174.
225. Die englische Dogge, mastivus. S. 180.
226. Die altenglische Dogge, albionensis. S. 180.
227. Der dänisch-englische Blendling, danico-mastivus. S. 181.
228. 229. Der Cubahund, mastiv. cubanus S. 181.
230—236. Der englische Kampfhund, mastivus gladiator. S. 182.

Ueberdies:

618—625. Wolfs-Hundbastarde. S. 188 u. f.

Wenn wir gegenwärtig einen Ueberblick über die natürlichen Verwandtschaften der mannigfaltigen Verschmelzungen der Racen versucht haben, so bleibt noch die Verbastardirung der Hunde zu betrachten.

Die unsichern Vermuthungen der Alten über Verpaarung der Hunde mit wilden Raubthieren sind schon an mehreren Orten erwähnt, und wir haben bereits auf die Verähnlichung des Hundes mit solchen Thieren hingedeutet, mit denen eine Verbastardirung anzunehmen höchst unwahrscheinlich sein würde, wir sind vielmehr zu dem Resultate gekommen, daß die bei dem Hunde auf eine hohe Stufe gesteigerte Einbildungskraft, bei seiner Verähnlichung mit Vorbildern, welche ihm Jahrhunderte lang beigesellt gewesen sein mochten, wohl am kräftigsten eingewirkt haben mag, wodurch bei Mitwirkung von Clima und Nahrung die Verähnlichung mit nahe verwandten Thieren noch leichter hervorgehen konnte, als die Nachbildung gewisser Körpertheile von solchen Thieren, welche nach ihrer Organisation sehr fern von ihm stehen.

Wirkliche Verbastardirung mit sehr nahe verwandten Arten der Gattung ist indessen durch Beobachtung erwiesen, häufiger als mit andern Thieren die mit dem Wolf. Den am besten und längsten beobachteten Fall erzählt Buffon. M. Surirey de Boissy schrieb ihm vom März 1776, daß seine Wölfin nach Paarung mit einer Bracke am 6. Juni 1773 4 Junge geworfen, wovon zwei, ein Weibchen und das einzige Männchen leben blieben, und auf ein Landgut des Marquis de Spontin gebracht wurden. Die alte Wölfin biß einen Kutscher und wurde getödtet. Von den beiden jungen war das Weibchen sanfter, das Männchen mehr wolfsartig wild. Beide Thiere wurden im Winter auf ein anderes Schloß des Marquis Florennes gebracht, gut gepflegt und gezähmt, (unsere Abbildungen 619, 620,) am 30. Dezember 1775 begatteten sie sich und in der Nacht vom 2. zum 3. März wölfte das Weibchen wieder 4 Junge. Am 21. Apr. 1776 erhielt Büffon wieder Nachricht von Namur, daß unter diesen Jungen zwei Pärchen wären, die Weibchen mit weißen Vorderpfoten, auch die Kehle und die kurze Ruthe weiß. Ein Männchen war braun, fast schwarz, glich mehr einem Hunde als einem Wolfe, obwohl es der wildeste unter allen war. Das andere Männchen hatte nichts Ausgezeichnetes und glich den Aeltern, die beiden Männchen hatten auch die Ruthe wie der Vater. Alle verbreiteten einen Wolfsgeruch, weshalb die Hunde vor ihnen davon liefen. Buffon erhielt nun im Juni 1776 selbst von M. de Spontin die zwei Exemplare der ersten Generation und zwei von

Digitized by Google

der zweiten (unsere Abbild. 621 622.) Sie waren sanft, nie angebunden worden, bissen Niemand, und wurden auch in das Zimmer genommen. Die beiden älteren gab Buffon in die Menagerie des Königs, und behielt nur die jüngeren. Das Männchen der ersten Generation (Abbild. 619) glich noch am meisten einem Wolfe, und würde bei ganz unbeschränkter Freiheit dessen Naturell noch bestimmter erlangt haben. Augen und Blicke waren tückisch und das Betragen wild. Er bellte jedermann an, knurrte auch zum Zeitvertreib und war eigentlich selbst gegen die Personen, die er am besten kannte, nicht sanft, auch nicht gelehrig; nur wer ihm die Nahrung brachte, den sahe er gern, leckte ihm Hand und Gesicht, während er zu anderer Zeit nach derselben Hand biß. Er benahm sich bei Liebkosungen mit wenig Anstand, war aber sehr eifersüchtig, wenn seinem Weibchen oder den Jungen, für welche er keine Anhänglichkeit zeigte, dergleichen zu Theil wurde. Er fraß den andern ihre Nahrung weg und mußte deshalb angebunden werden, wenn diese Mahlzeit hielten. Gegen Fremde benahm er sich sehr zornig, besonders wenn sie schlecht gekleidet waren, er bellte, knurrte, kratzte in den Boden nnd rannte wohl endlich auf sie los. Er wurde zahmer, als man ihn nach den ersten 6 Wochen seines Gewahrsams wieder frei ließ. Am ersten Tage der Freiheit that er nichts als Bellen und Springen und erweckte seine Familie zur steten Theilnahme an diesen Uebungen. Auch gegen Fremde wurde er nun milder und knurrte sie nur an, indem er das Haar sträubte. Er war im Alter von 3 Jahren und 2 Monaten im August 1776, von der Statur eines starken Fleischerhundes, wohl noch dicker, doch nicht so groß als ein ausgewachsener Wolf. Er war nur 3 Fuß lang bis zur Schwanzwurzel und etwa 22 Zoll hoch, der Kopf selbst war doch mehr hundsähnlich, die Stirne wie bei dem Fleischerhunde hervorragend, die Schnauze ziemlich dick, die Nasenspitze ein wenig erhoben. Er hatte fast den Kopf des Vaters, die Ruthe aber von der Mutter. Die Ohren waren nur an der Spitze umgebogen und etwas wolfsartig. die Augenspalten waren fast horizontal, die innern Winkel sehr genähert. Augenliederränder, Schnurren, Lippenränder und Nasenspitze waren schwarz. Die Iris fahlgelb ins Graulichte ziehend. Ueber jedem innern Augenwinkel stand ein weißlicher Fleck. Er war weniger hochbeinig als sein Vater, (die Bracke, auf der folgenden Seite schreibt Buffon wieder: „le matin"), und schien mehr die Verhältnisse und das Kleid des Wolfs zu haben. Der Bauch war stärker, mehr wie bei der Wölfin, die Beine kräftig, die Klauen fast alle schwarz und länger als bei dem Hunde, er breitete sich im Gehen aus, wodurch die Fährde größer wurde als die des Hundes. An den Vorderpfoten waren die äußersten nnd die auf die innerste folgende Klaue weiß oder fleischfarbig, am linken Hinterfuße die zwei Klauen, welche auf die innersten folgen und am rechten Hinterfuße nur die äußersten Klauen fleischfarben. Den Wolfsschwanz trug er immer hängend, außer in sehr freudiger Aufregung, wo er ihn erhob; im Zorne zog er ihn ein, nachdem er ihn vorher horizontal ausgestreckt hatte. — Das Weibchen, Abbild. 620 war im Naturell ganz verschieden vom Männchen, sanft und liebkosend, selten übelgelaunt, hatte eine milde Physiognomie und die kurze Ruthe des Vaters. Die Länge des Thieres von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel betrug 2 Fuß 9 Zoll, die Schulterhöhe 21 Zoll 3 Linien.

Es würde uns hier viel zu weit führen, wenn wir die minutiöse Beschreibung des Weibchens und der merkwürdigerweise erfolgten ferneren Generation wieder geben wollten, unsere Abbildungen zeigen bereits wie diese schwächer, doch immer mehr wolfs-

Digitized by Google

artig geworden. Nur einige allgemeine Beobachtungen Buffons verdienen hier wiederholt zu werden. Er fand nämlich:

1) Daß der Großvater (die Bracke oder der Matin) den meisten Einfluß auf die Nachbildung des Kopfes am jungen Männchen und der Ruthe am jungen Weibchen gehabt, daß wieder die Wölfin mehr Einfluß auf den Kopf des Weibchens und die Ruthe des Männchens ausgeübt habe.

2) Das Männchen der ersten Generation scheint seine vom Hunde und Wölfin empfangenen Charaktere auf das Männchen der zweiten Generation, und ebenso das Weibchen die ihre auf das Weibchen der zweiten übertragen zu haben, außer den Ohren und dem Weiß der Pfoten und Klauen, welche bei ihr vom Vater herzuleiten waren, so daß dessen Einfluß nicht nur auf die Pfoten des Männchens, sondern auch auf die des Weibchens sich sichtbar zeigt.

Die zweite Generation brachte Buffon im Nov. d. J. 1776 auf sein Landgut in einen großen Hof, abgesondert von allen Hunden, auch hier beliefen sie sich am 30. und 31. Dez. 1778, im Alter von 2 Jahren und 10 Monaten, also dem Alter, in welchem der Wolf paarungsfähig wird, denn bei dem Hunde ist dies schon nach einem Jahre und etlichen Monaten der Fall. Ebenso war auch die Geburtszeit von einemmale in zwei Jahren, wie bei dem Wolfe. Am 4. März 1779, also nach einer Tragzeit von 63 Tagen (wie bei dem Hunde) wurden 7 Junge der dritten Generation geboren. Die Mutter behandelte sie mit der größten Zärtlichkeit und hielt die Annäherung des Vaters ab, als indessen nach einigen Stunden Jemand die Jungen in die Hand genommen und besehen hatte, wurde sie wüthend und fraß deren sechs auf, indem man nur ein einziges Weibchen (Abbild. 623) retten konnte. Dies erwuchs unter ziemlich strengem Gewahrsam, und blieb deshalb scheu und furchtsam, doch ohne wild und bös zu sein, es war im Gegentheil sanft und friedsam, spielte auch mit Hunden ohne ihnen Leid zu thun, obwohl diese nur mit Widerwillen herbeikamen. Trat man zu dem Thiere in das Gemach, so drückte sich dasselbe zur Erde und mochte sich verborgen glauben, es folgte dann unruhig mit den Augen allen Bewegungen, die man machte, und ließ, so lange man dablieb, die Nahrung unberührt. Kehrte man ihm den Rücken zu und ließ die Hände hängen, so leckte es diese, drehte man sich wieder herum, so zog es sich schnell zurück in die gedrückte Stellung, ließ sich bei den Ohren und Pfoten nehmen, auch den Rachen öffnen, ohne irgend eine Vertheidigung oder Abwehr. Dies Weibchen zeigte übrigens in allem eine große Analogie mit dem Wolfe, bellte auch niemals, sondern heulte nur, in den verschiedenen Weisen wie der Wolf. Dasselbe belief sich mit seinem Vater, dem Männchen der zweiten Generation und gebar im Frühling 1781 vier Junge, so viel Männchen als Weibchen. Ein Pärchen fraßen die Alten auf, das andere wurde erhalten. Diese Jungen waren sanft und liebkosend, doch etwas gefräßig und setzten dem Geflügel nach, mit dem sie in Berührung kamen. Das Männchen (Abbild. 624) behielt das Ansehen des Wolfs, die Ohren waren breit und aufrecht, der Leib während des Laufens lang, wie bei dem Wolfe, der Schwanz ein wenig gekrümmt und eingezogen hängend, die Haarfarbe war die des Wolfs. Ein Jahr alt maß das Thier in gerader Linie 2 Fuß 8 Zoll 6 Linien, und nach der Krümmung des Leibes 3 Fuß 4 Zoll 9 Linien; der Schwanz 9 Zoll 6 Linien. Das Weibchen dieser vierten Generation (Abbild. 625) maß in demselben Alter 2 Fuß 4 Zoll 1 Linie, in der Krümmung 2 Fuß 8 Zoll 9 Linien, war übet-

Digitized by Google

haupt leichter gebaut als das Männchen, und einer Wölfin sehr ähnlich, dabei noch sanfter und furchtsamer als das Männchen.

Mehrere andere Beispiele führt Buffon selbst an und ähnliche und später beobachtet, z. B. das auf der Pfaueninsel bei Potsdam, wo drei Junge von einer Wölfin geboren wurden, welche alle weiblich waren, nur eines welches starb, mehr wölfig, hatte sogar den schwarzen Streif am Fuße, das zweite glich schon mehr dem Hunde, und das dritte war ein wahrer Jagdhund, doch sanfter als jenes. Diese Bastarde sahe ich selbst *). In Rußland sind dergleichen nicht selten, auch Pallas erwähnt einer besonders merkwürdigen, sehr zahlreichen Generation von einem schwarzen Wolfe und einem Hunde, unter welcher außer einem weißen, alle von Wuchs, Farbe und Wildheit dem Vater glichen.

John Hunter versuchte die Identität zwischen Wolf, Schakal und Hund nachzuweisen. (Observations tending to shew that the Wolf, Jackal and Dog are all of the same Species. By John Hunter. Philos. Transact. LXXVII. p. 253 und supplementary letter — LXXIX. p. 160.) Für die Abstammung des Hundes vom Schakal erklärt sich auch Güldenstädt und Pallas, und allerdings kann die dem Schakal eigenthümliche Zuneigung zum Menschen, von welcher oben Seite 108 die Rede gewesen ist, eine solche Vermuthung wahrscheinlich machen, sobald man davon glauben will, daß die Stammarten des Hundes heut zu Tage noch wild vorhanden sein müssen, und mit den genannten Naturforschern und Tilesius auf die specifischen Charaktern, durch welche der Hund vom Schakal unterschieden werden kann, keinen Werth legen will. Bastarde mit diesen so nahe verwandten Thieren erzeugt der Hund wahrscheinlich öfterer als aufgezeichnet worden ist, wie Pallas, Gmelin und Oedmann dergleichen Beispiele anführen. Es wäre zu wünschen, daß man dergleichen Bastarde möglichst sorgfältig beobachtete. Ich habe auf dem Supplementblatte unter Nr. 616 noch den afrikanischen Simir oder Hyänenhund abgebildet, welcher in dieser Naturgeschichte ausführlicher beschrieben wird, und das einzige wilde Thier ist, welches mit dem Jagdhu... ...e solche Aehnlichkeit hat, daß man an eine Vermischung mit diesem und an ein Mitwirken bei der Erzeugung der Race desselben denken könnte, zugleich Nr. 617 den Dib oder Sib, einen ebenfalls afrikanischen Schakal. Man vergleiche die Beschreibung beider a. a. O.

Lebensweise und Eigenheiten. So verschieden auch die zahlreichen Hunderacen in ihrer äußern Erscheinung auftreten, so scheint dennoch ein gemeinsames Band einer innern Seelenthätigkeit, alle zu verknüpfen, und deren Uebereinstimmung die Abstammung aller von einem Urbilde wahrscheinlich zu machen. — Der Hund kommt blind zur Welt und bleibt in diesem Zustande 10 bis 12 Tage. Die Vorderzähne werden mit geboren, die Jungen nach der Geburt von der Mutter durch anhaltendes Lecken gereinigt, dann gesäugt, was 6 bis 8 Wochen fortgesetzt wird. Die Jungen kommen in der Zahl von 4 bis 6 am öftersten, doch auch 2 bis 10, ja in seltenern Fällen in noch viel höherer Anzahl zur Welt. Eine Jagdhündin in Ungarn gebar deren neunzehn **) und nach dem glaubwürdigen Zeugniß des Försters Venu-

*) Vergl. auch Isis XXI. p. 924: Ueber merkwürdige Bastarde von einem Hunde mit einer Wölfin, von A. F. Wiegmann jun.

**) Vergl. Weidmanns Feierabende. 2. S. 135.

Digitized by Google

leth zu Gernsheim, wölfte eine dem Hauptmann Stutzer zu Darmstadt gehörige treffliche schwarze Hühnerhündin, Namens Manille, 8½ Jahr alt, in öftern Würfen jedesmal 11 bis 19, und im Frühling 1817 sogar 21 gesunde Junge *). Die Jungen beginnen im vierten Monate die Zähne zu wechseln, wobei sie kränkeln und halten sich gegen 6 Monate lang zur Mutter, nach dieser Zeit verlassen sie dieselbe und sind oft nach 10 Monaten fortpflanzungsfähig, doch mit Erfolg für ihre Dauer, erst im zweiten Jahre. Bis zum Alter von ¾ Jahren pissen die Hunde auf allen 4 Beinen stehend, etwas zusammengekauert, nach diesem Alter stehen sie dabei auf 3 Beinen, indem sie eins in die Höhe halten und den Strahl des Harns gegen einen Stein, eine Mauer, einen Pfahl, Baum oder Busch und dergleichen richten. An Menschen richten sie dies Experiment vorzüglich, wenn dieselben eine läufische Hündin besitzen oder mit einer dergleichen in Berührung gekommen sind. Zusammentreffende Hunde beriechen einander, lassen dabei wohl auch etwas Urin und scharren mit den Hinterbeinen in die Erde. Zur Verrichtung der Nothdurft stellen sie sich mit gekrümmtem Rücken und setzen die Hinterbeine nahe an die vordern, die Darmausleerungen sind mit Anstrengung verbunden und der Koth, im gesunden Zustande des Thieres fest und trocken, wird vom Hunde gern auf Steine oder in Winkel abgesetzt. Im Laufen bewegt sich der Hund mit dem Hinterleibe quer, bei freudigem Anlaß wedelt er dabei mit dem Schwanze, bei unangenehmem zieht er den Schwanz ein, senkt den Kopf und erwartet mit demüthigen Blicken, sich krümmend und kriechend, die Strafe. Im Ruhen sitzt der Hund auf den Hinterbeinen mit dem Vorderleibe und den Vorderbeinen aufrecht oder er legt sich gerade ausgestreckt, weit öfterer gekrümmt, mit dem Kopfe zwischen die Vorderbeine. Große und schwere Hunde sitzen seltener aufrecht, liegen öfterer ausgestreckt, im Sommer im Schatten auch auf dem Rücken. Sonnen- und Ofenwärme lieben sie und strecken sich gern unter deren Einfluß, bei Kälte ziehen sie sich desto mehr zusammen und legen die Schnauze hinter die Hinterbeine. Eine weiche Unterlage suchen sie gern auf und sie ist ihnen nothwendig, da sie von hartem Lager Schwielen bekommen, eine Bedeckung ertragen in der Regel nur Schooßhunde. Der Hund geht erst einigemal um den Platz herum, auf welchen er sich legen will, und kratzt ihn dann auf, macht sich sein Bett. Der Hund hat einen leisen Schlaf, mit Träumen, welche Lukretius von den Jagdhunden trefflich besingt **). Der Hund schwitzt nicht, bei Erhitzung wird ihm nur die ungehemmte Ausdünstung der Zunge nothwendig, daher er dann keuchend mit geöffnetem Maul einhergeht und die Zunge heraushängen läßt. Seine Wittrung (odora canum vis, Virg. Aen. IV. 132.) ist überaus fein. Der Geruch ist bei ihm der am meisten ausgebildete Sinn und läßt ihm auch das Wetter bestimmt vorausempfinden. Vor Eintritt des Regens wird er mißmuthig und träge, frißt nicht und erbricht sich wohl gar, entwickelt auch einen unangenehmen Geruch aus sich, was man hundeln nennt. Seine Nahrung nimmt der Hund, wenn sie zubereitet ist, aus beiden organischen Reichen, frißt aber ursprünglich am liebsten Fleisch, Aas lieber als frisches, über den Fund eines faulen Fisches wird er entzückt und wälzt sich vor Freuden. Das Wasser, sein Gesöffe, verschluckt er leckend, indem er die lange Zunge löf-

*) ebend. 3. S. 168.

** Et levi somna canum fido cum pectore corda Lucret. v. 862 — et alibi: „Venantumque anes in molli saepe quiete" etc. V. 992 — 1001. —

Digitized by Google

felsörmig beugt und von der Seite mit ihr schöpft. Gras (weswegen das Hundsgras: Triticum oder Agropyrum caninum, vgl. meine Abbildung Nr. 1381 in meinem Werke, die Gräser der deutschen Flora. Leipzig 1834, vorzugsweise so genannt worden zu sein scheint) frißt der Hund, wie man gewöhnlich glaubt, bei Vorempfindung des Regens, indessen scheint öfter eine gewisse Unverdaulichkeit oder Würmer, überhaupt Vorempfindung der Nothwendigkeit sich zu erbrechen, ihn dazu zu veranlassen. Der Hund kann lange hungern. In der Hist. de l'acad. de Paris 1706 finden sich Beispiele von Hunden, welche 40 Tage lang nichts gefressen haben. Pallas hatte einen Hühnerhund, welcher blind wurde und in einen trocknen Brunnen fiel, aus dem er erst nach zwei Monaten ganz abgemagert wieder herausgezogen wurde. Die Stimme des Hundes ist außerordentlich modificirt nach seinen Affecten. Er warnt und verkündet den Angriff durch Bellen, er heult und winselt bei Furcht und Leiden, er knurrt endlich, wenn er grollt und über sein Verhalten zum Gegner sich selbst noch nicht klar ist. Nicht selten, besonders zur Winterzeit, hört man die Hunde auf dem Lande unaufhörlich heulen oder bellen, und findet bei Untersuchung als die Ursache davon den Vollmond. Ihre Nervenreizbarkeit bringt sie schnell in Affect, doch gilt dies am meisten von den kleinern und mittlern Racen. Auch Glockengeläute, Musik und besondre Blasinstrumente regen die meisten Hunde unangenehm auf. Oft versammeln sich dann mehrere und heulen gemeinschaftlich. Nach entgegengeworfenen Steinen beißen sie und vor einem vorgehaltenen leeren Weinglase ziehen sie sich zurück. Alles sich schnell Vorüberbewegende bellt der Hund gern an, so laufende Pferde, rollende Wagenräder und dergl. Oft scheint er auch weniger aus Muth, mehr aus Feigheit zu bellen, um nur zu schrecken oder sich selbst anzufeuern, überhaupt bellen die schwächsten Hunde am meisten, und die stärksten am wenigsten, zum Theil fast gar nicht*). Sie scheinen Menschenkenner zu sein, indem sie sich gegen Einzelne sehr verschieden benehmen und diejenigen leicht herauszufinden wissen, die ihnen wohlwollen. Insgemein bellen sie alle schlechtgekleideten Personen, besonders herumschleichende Bettler heftig und anhaltend an, bleibt dagegen ein wohlgekleideter Mann stehn und sieht dem Hunde unverwandten Blickes fest nnd ruhig ins Gesicht, so zieht sich dieser oft zurück. Wichtige Beispiele sind aufgezeichnet worden, wo durch Hunde Mörder entdeckt wurden. Die Erinnerung des Hundes wird durch ein gutes Gedächtniß unterstützt, er bleibt zeitlebens dankbar für gute Pflege und erzeigte Wohlthaten, während er üble, grausame Behandlung, überhaupt Neckereien und Unrecht nicht leicht vergißt. Zur Laufzeit (Catulitio s. pruritus canum) sind die Hunde, ganz vom Triebe zur Begattung besessen, meist unfähig zu ihren gewöhnlichen Leistungen. Der Trieb regt sich fast das ganze Jahr hindurch in allen Monaten, die weiblichen Individuen scheinen indessen nur zweimal im Jahre die Paarung auszuüben, zu Anfang des Winters und zu Anfang des Sommers. Die Hündin tritt mit etwas Blutverlust in die Laufzeit, welche 10 bis 14 Tage dauert, und ein Weibchen nimmt mehrere Männchen an, welche die läufische Hündin aus weiter Ferne wittern, sich bei ihr versammeln und um sie kämpfen, wobei dennoch zu bemerken ist, daß das häufigere Belaufen mit Individuen derselben Hauptrace geschieht, und die von Individuen entfernt stehender Racen erzeugten Jungen diesen niemals

*) Canem timidum vehementius latrare quam mordere, proverbium apud Bactrianos iactatum. Curt. VII. 4. notat. Ovid. Rem. am. V. 421.

Digitized by Google

ganz gleichen, sondern Mittelschläge geben, insgemein die jungen Männchen dem Vater, die jungen Weibchen der Mutter mehr ähneln. Diese trägt 63 Tage, bereitet sich dann ein bequemes Lager um zu gebären — zu wölfen (catulire). Interessant sind die Beobachtungen, wo Hündinnen ihre Blutsverwandten nicht annehmen, eine Jagdhündin, welche schon mehrere Male geboren und sich als zärtliche Mutter gezeigt hatte, sich hartnäckig weigerte, ein Männchen ihrer eigenen Nachkommenschaft zuzulassen, und nachdem dies mit Gewalt erreicht worden, ihre Jungen wahrscheinlich aufgefressen, da man sie nicht wieder auffinden konnte. (Vergl. Weidmann's Feierab. 3. S. 169.) Ferner hat man auch geschlossene Ehen zwischen Hunden beobachtet, welche gemeinschaftlich in einem Hause leben. — Das Alter bringen die Hunde auf 20 bis 30 Jahre, sind aber schon vom zwölften Jahre an alt, gewöhnlich unreinlich, von mehr oder weniger Schwäche der Sinne und Krankheiten befallen, besonders nimmt Geruch und Gehör ab, oft tritt Blindheit ein, der Hund verliert die leichte Beweglichkeit, deren er sich früher erfreute, wird steif und unfähig sich zu belecken und zu reinigen. Die Nase ist im gesunden Zustande kalt, ist sie von warmer Temperatur, so deutet dies immer auf Krankheit. Die Krankheiten der Hunde sind überhaupt wie bei allen mit der Cultur des Menschen in so naher Berührung stehenden Thieren ziemlich zahlreich, es kann hier nur die Erwähnung der hauptsächlichsten gesucht werden *).

Die Wasserscheu, Tollheit oder Wuth (hydrophobia, rabies canina) ist unter ihnen die bekannteste und durch ihre Einwirkung auf den Menschen die furchtbarste. Die Ursachen zu dieser Krankheit sind in mancherlei Veranlassungen gesucht worden, welche der Krankheit vielleicht gänzlich fremd sind. Da dieselbe allen orientalischen und übrigen Ländern fehlt, in welchen die Hunde sich selbst überlassen sind und nicht in Häusern eingesperrt oder angelegt gehalten werden, wo sie daher dem naturgemäßen Zustande der Nahrung und Paarung nachgehen, bei uns auch vorzüglich zur Laufzeit und bei Hindernissen der Paarung von der Krankheit befallen werden, so mag das Wesen derselben wahrscheinlich in einer antagonistischen Aufreizung des Gehirnnervensystems zu suchen sein, welche durch jene unbefriedigte Aufreizung des Eingeweidenervensystems durch Vermittelung der Speicheldrüsen hervorgerufen werden. Die Krankheit fehlt auch in Kamtschatka. Das von dem berühmten Reisenden Sieber mehreren europäischen Monarchen um einen hohen Preis angebotene Geheimmittel zur Vorbauung der Hundswuth scheint darin zu bestehen, diese Thiere von Zeit zu Zeit die ihrem Naturell angemessene Nahrung rohen Blutes zu geben, welche ihnen, wie Sieber im Orient beobachtet hatte, daselbst bei dem öffentlichen Schlachten auf den Straßen zu Theil wird. Seine mündliche Aeußerung deutet schon bestimmt darauf hin. — Die Krankheit äußert sich in zweierlei Formen, welche man mit dem Namen der eigentlichen Tollwuth und dem der stillen Wuth unterscheidet. Die erste Periode beider Krankheitsformen ist sehr ähnlich, der Hund wird bald unruhig und verliert den Appetit, nimmt aber begierig Wasser an, wovon er oft aber wenig auf einmal säuft.

*) Mehr hierüber ist in der jedem guten Jäger bekannten Jagdliteratur nachzulesen, auch außerdem in Walther's Buch über die Hunde aufgeführten besonderen Schriften; noch zu vergleichen: Hohnau, Anleitung zur Zucht und Dressur der Jagdhunde; Quedlinburg und Leipzig 1833. — Götz, Monographie des Hundes; Gotha 1834. — Dadler, Anweisung über die Wartung u. s. w. der Hunde; Nordhausen 1835 u. a.

Digitized by Google

Es tritt Verstopfung und sehr schwieriger Abgang schwarzer Exkremente ein, bald auch Erbrechen. Die Stimme wird ein eigenthümliches Heulen, bald folgt Heiserkeit, welche die bellende Stimme noch mehr verändert, der Blick wird matt, wie gebrochen, und schielend, die Augenlider und das Weiße im Auge entzündet sich und wird roth, der Hund beißt ohne vorher zu bellen oder zu knurren, überhaupt auch ohne Anlaß; die Empfänglichkeit für Liebkosungen, selbst wenn sie von Seiten des Herrn kommen, sowie für dessen Befehle verliert sich bald gänzlich, und letzteren wird nur von par force dressirten Hunden noch mit Beschwerde Folge geleistet. Entwickelt sich die rasende als eigentliche Tollwuth, so tritt ein hoher Grad von Trotz und Falschheit ein, die sich selbst gegen den Herrn wendet. Der Hund schnappt eigensinnig nach Fliegen und dergleichen, fängt zahme Hausvögel und zerreißt sie ohne etwas davon zu genießen, sucht andere Hunde durch Freundlichkeit zu berücken, fällt sie dann wüthend an, fletscht die Zähne, leckt mit der etwas entzündeten Zunge die Lippen und schnalzt dabei, verzerrt das Gesicht, schielt nach den Weichen (Dünnungen) und winselt oft laut. In dieser Zeit träuft ihm schon oft wässerige Flüssigkeit aus dem Maule. Eine zweite Periode, welche dem eigentlichen Ausbruche noch vorausgeht, zeigt die Unruhe und das scheue Wesen des Hundes noch gesteigert, das Auge erstarrt und der wilde Blick wird glühend, der nieder gesenkte Kopf schwillt an, besonders um die Augen herum und an den Backen, die Zunge wird blutroth und hängt aus dem Rachen, während zu beiden Seiten ein zäher Schleim herabgeifert. Der Hund knurrt wohl, bellt aber nicht mehr, kennt seinen Herrn und andere bekannte Personen nicht mehr, lechzt nach Saufen, bringt aber nichts Flüssiges mehr hinunter, und seine Scheu vor Wasser, Milch und Flüssigkeiten überhaupt spricht sich bestimmt aus, mit Gewalt eingefüllt bringt ihm eine solche schmerzhaftes Würgen, krampfhaftes Zusammenziehen der Schlundmuskeln hervor, die Abmagerung nimmt schnell zu, besonders um die Weichen, das Thier legt sich nicht mehr nieder, sondern schleicht scheu und schielend und mit niederhängender Ruthe umher. Nachdem beide Perioden, die nach den verschiedenen Constitutionen der Individuen verschiedene Zeit von ein paar oder mehreren Tagen durchlaufen haben, so tritt die dritte Periode ein, die der eigentlichen Wuth, welche nun erst die beiden Formen der Krankheit deutlich unterscheiden läßt. Bei der stillen Wuth tritt dem Hunde weißer Schaum aus dem Maulwinkel heraus, die Augen sind entzündet, aber trübe und starr, die Zunge blau und hängt aus dem Rachen, oft weit herab, das Maul selbst steht offen, denn der Unterkiefer hängt wegen Lähmung der Kaumuskeln schlaff herab, die Ruthe wird eingeklemmt getragen, und der Hund läuft taumelnd und unstät fort, oft meilenweit gerade Wege verfolgend, wobei er auch beißt, wenn ihm Menschen oder Thiere begegnen. Andere taumeln im Kreise herum, besonders wo kein bezeichneter Weg ist, und fallen dabei öfters nieder und schnappen nach Luft. Die Tollwuth dagegen entscheidet sich durch die größere Wildheit, das Auge ist glühender, die Pupille sehr weit, der Rachen geöffnet und von Geifer benetzt, die herabhängende Zunge bläulich, die Ruthe niedergeklemmt. Der Hund läuft im Freien trabend, mit hochgehobenen Beinen gerade aus, einige auch durch Pfützen hindurch, oder bekommen bei dem Anblicke des Wassers schon Verschlimmerung ihres Zustandes und wenden sich taumelnd von demselben ab. Nur durch unüberwindliche Hindernisse wird er zur Abweichung von der geraden Linie gezwungen. Begegnende Menschen oder Thiere beißt er, der angelegte beißt auch in die Kette, überhaupt beißen sie auch in leblose

Digitized by Google

Gegenstände aller Art. Die heftigsten Schmerzen scheinen den Zustand zu begleiten, und unter furchtbaren Konvulsionen stirbt das Thier am neunten Tage, wenn die Krankheit alle Stufen durchlaufen hat, gewöhnlicher aber schon zwischen dem sechsten und achten Tage nach dem Beginnen.

Ein mit dieser Krankheit einmal befallener Hund ist unfehlbar verloren, und es ist Pflicht der Menschlichkeit und der eigenen Sicherung, ihn in den ersten Tagen des Leidens zu erschießen, da die Wuth sich durch Bisse auf andere Hunde und selbst auf Menschen überträgt. Im allerersten Entstehen, so wie bei den gebissenen Hunden, wendet man wohl Arzneimittel an, deren Beibringung aber mit der größten Vorsicht geschehen muß, um sich vor dem Bisse des Thieres zu sichern. Man zieht dickleberne Handschuhe und rindsleberne Stiefeln an und bindet ein ringsum schützendes Schurzfell vor, der kranke Hund muß noch überdies mit einem festen Halsbande, wohl beaufsichtigt und von anderen Thieren gesondert, wenigstens neun Wochen lang an der Kette liegen. Man giebt einem starken Hunde in der ersten Zeit ein Brechmittel aus 8 Gran Ipecacuanha oder Brechwurzel und 8 Gran weißer Nießwurz, welches Pulver man mit Honig zu Pillen formiren oder mit Syrup einrühren kann. Auch in der zweiten Periode hat man noch Mittel versucht, doch wohl kaum mit Erfolg. Wirkt indessen jenes Brechmittel stark, so erleichtert man das Würgen durch frisches Leinöl, und nach der Besserung am folgenden Tage erhält er dicke saure oder Schlikkermilch. Wo es zu wenig wirkt, kann es wiederholt werden.

Wichtig ist die Cur der von tollen Hunden gebissenen Menschen. Es ist schon Pflicht, um dergleichen traurige Fälle zu vermeiden, alle von einem tollen Hunde berührte und besonders begeiferte Gegenstände zu vernichten, oder gründlich zu reinigen. Eine vom Bisse herrührende Wunde veranlaßt den Ausbruch der Wuth nicht sogleich, sondern gewöhnlich erst zwischen der dritten und neunten Woche, wo sie dann plötzlich auftritt, in manchen Fällen aber auch schon nach einigen Tagen, in anderen wieder nach Verlauf mehrerer Monate, selbst nach Jahren, wahrscheinlich immer nach der verschiedenen Constitution des Leidenden und dem individuellen Zustande des das Leiden veranlassenden Hundes. Ueberhaupt wird von 14 bis 15 gebissenen Menschen nur etwa einer von der Krankheit befallen. Die Wunde wird so schnell als möglich ausgedrückt und ausgewaschen, wo möglich durch trockene Schröpfköpfe ausgesogen, dann mit warmem Salzwasser ausgewaschen. Man bemüht sich, aus der Wunde alles auszuziehen, was etwa in sie gelangt ist. An dünnen Theilen, z. B. den Fingern, der Nase, wo sich keine Schröpfköpfe ansetzen lassen, wird die Stelle skarifizirt, d. h. mit mehreren kleinen Einschnitten zum Ausbluten veranlaßt. Alle angewendeten Instrumente müssen sorgfältig gereinigt und die Wunden 2 bis 3 Wochen mit Scharpie belegt werden, welche man vor dem Auflegen in eine gesättigte Kochsalzauflösung taucht und alle 2 Stunden damit anfeuchtet. Auf diese Weise behandelt heilt die Wunde, und man wendet in den meisten Fällen die Gefahr ab. Doch giebt es Fälle, wo oft nach Jahren an der gebissenen Stelle wieder rothe Flecke entstehen, die anfangs nur gelind jucken, dann aber brennend schmerzen, auch rothe Bläschen bekommen. Solche Stellen machen die Erneuerung der obigen Behandlung nothwendig; denn in dem Bläschen befindet sich das Gift abermals; wahrscheinlich von einer geringen Menge, welche sich vom Bisse erhalten hat, herrührend und vielleicht durch den organischen Lebensproceß vermehrt. Eine durch den Biß wirklich vergiftete Person soll nach Beobachtungen in Rußland vom

Digitized by Google

dritten bis zum neunten Tage, spätestens bis nach 6 Wochen unter der Zunge Bläschen bekommen, welche zerstört, d. h. geöffnet und mit Salzwasser ausgewaschen werden müssen. Auch Chlorwasser verdient zur Reinigung der Wunden gewiß eine vorzügliche Empfehlung. Cluſel und Brugnatelli wuſchen mit gutem Erfolg die Wunden mit Chlorwasser aus, und gaben innerlich Brotpillen mit Chlor getränkt und mit Oblate überzogen ein. Zwei Quentchen Chlorwasser täglich 4 bis 5mal. Diese Anwendung ist um so wichtiger und um so wahrscheinlicher hülfreich, als Lenz bekanntlich daſſelbe Mittel nach Otternbiß wirksam fand. (Vergl. Annales de Chimie, LXXVII. Gazette de Santé 1817. 21. Juin. Journ. de Phys. et Chim. IX. Lenz, Säugethiere S. 96 und früher Lenz Schlangenkunde.)

Nächst obiger äußeren Behandlung und dem höchst wichtigen Chlor innerlich finden sich noch eine Menge innerer Mittel, vorzüglich gewisser Pflanzen vorgeschlagen, welche von einzelnen Völkern und Personen mit Nutzen angewendet worden sein sollen. Bei den Alten stand die Hundsflechte: Peltidea canina, das Gauchheil: Anagallis arvensis, bei den Russen neuerlich das Wasserwegerich: Alisma Plantago, Kirschlorbeer, Tollkirsche oder Belladonna, Rosa canina Wurzel u. m. a. Pflanzen in dem Rufe, die Krankheit zu heilen oder ihr vorzubeugen. Besondere ärztliche Behandlung bedarf hier um so weniger einer Erläuterung, als in so wichtigem Falle diese gewiß immer durch den Arzt selbst geleitet werden wird, nur von einem Mittel mag noch Erwähnung geschehen, da sich daſſelbe dazu eignet, als Hausmittel vorräthig gehalten zu werden. Es ist dies der Maiwurm (Meloe proscarabaeus, variegatus, violaceus u. a. Der echte M. maialis, schwarz mit orangegelben Einschnitten des Hinterleibes kommt dagegen nur im südlichsten Europa vor), ein einen bis zwei Zoll langer, plump gebauter, schwarzblauer Käfer mit kurzen Flügeldecken und ohne Unterflügel, welcher sich in der zweiten Hälfte des April, im Mai und Anfangs Juni an grasreichen Orten in Waldungen vorfindet und von niedrigen weichblättrigen Kräutern nährt. Er hat die Eigenthümlichkeit, aus den Gelenken seiner Beine und Fühlhörner Tropfen einer ätzenden Flüssigkeit von der Farbe des Malagaweines herausdringen zu lassen. Dieser Käfer ist schon seit 1634 als Geheimmittel gegen die Hundswuth im Gebrauch und hat seinen Ruhm auch ungeachtet der Empfehlung einer Menge anderer Mittel bis in die neueste Zeit erhalten. Man führt bei Einsammlung der Thiere ein Glas oder eine Büchse mit ausgelaufenem Honig bei sich, nimmt die Käfer vom Boden behutsam auf und wirft sie ohne Verlust des gelben Saftes, den sie aus den Gelenken schwitzen, in den Honig. Einige schneiden ihnen dabei mit der Scheere den Kopf ab. Beträgt dieser auf der Oberfläche des Honigs sich ansammelnde Saft ein Zehntheil der Masse, so nimmt man die Käfer wieder heraus, trocknet und pulverisirt sie durch Zerstoßen und mischt dies Pulver der Masse wieder bei. Durch gehörige gleichförmige Mischung bildet sich die anzuwendende Latwerge, von welcher man 3 Messerspitzen voll in eine halbe Tasse Bier thun, dies lau erwärmen, wohl umrühren und trinken soll. Diese Dosis paßt für Erwachsene. Bis zwei Stunden vor dem Einnehmen darf der Kranke weder Milch noch Käse genossen haben, muß auch 16 Stunden nachher sich der Speise und des Getränkes enthalten, um die Arznei wirken zu lassen, worauf er sich für geheilt halten darf. Thieren giebt man die Latwerge in Milch. Man hat auch anstatt der Maiwürmer in Substanz deren Koth empfohlen und will Erfolg davon gesehen haben. Allgemeiner ist die obige Weise, welche auch wohl die sicherere sein dürfte. Doch ist

Digitized by Google

das stark wirkende Mittel nur dann zu nehmen, wenn der Hund wirklich toll war und die Wunde bestimmte Zeichen der Vergiftung vereffenbart. In Rußland, wo man gegen die häufiger vorkommende Krankheit auch zahlreichere Mittel kennt, empfiehlt man unter anderen das Blut einer Entenart, Gotka genannt, wahrscheinlich Anas Casarca (rutila Pall.), vergleiche unsere Schwimmvögel, Abbildung 172. 173. Die Petersburger Zeitung von 1813 Nr. 99. erklärt dies Blut für das sicherste Mittel. Man sticht die Ente todt, fängt das Blut in einem Glase auf und läßt es den Gebissenen auf einmal trinken. Dies soll ihn für immer vor allen gefährlichen Folgen bewahren, auch nach dem Bisse von tollen Wölfen denselben Erfolg haben.

Die Seuche, wie man diese Krankheit vorzugsweise nennt, auch Hundestaupe oder Rotz ist eine ebenfalls lebensgefährliche und in manchen Fällen gleichfalls vergiftende Krankheit. Sie beginnt unter katarrhalischen Zufällen. Man hört den Hund husten und niesen, er wird auch wohl heiser und verliert die Freßlust, es bildet sich ein zäher Schleimfluß aus der Nase. Charakteristisch ist eine rheumatische Affection oder Lähmung des Hintergerüstes, weshalb der Hund bei dem Laufen wankt. Die Krankheit herrscht bisweilen endemisch, befällt ganze Gegenden und wird von Unkundigen mit der Wuth verwechselt, indessen soll auch bei dieser Seuche der Speichel giftig sein und hat wenigstens die Fähigkeit, die Krankheit weiter zu verpflanzen. Sogleich im Beginnen der Krankheit ist dem Hunde nach Lenz's Erfahrung ein zerstückelter, am besten in Ziegenmilch gekochter Hasenbalg zu fressen zu geben, mehrmalige Wiederholung dieses Mittels heilt bisweilen die Krankheit, ist dies nicht der Fall, so bereitet man Pillen von der Größe einer Haselnuß aus folgendem Latwergen-Recepte: ℞. Rad. irid. flor. ℥j, Tart. tartaris. ʒjjj, Hepat. antimon. ʒj, Mell. rosar. q. s. M. f. Elect. D. Ein kleiner Hund erhält eine Pille, ein mittler 2 und ein starker 3 Stück aller 24 Stunden, bei eingetretener Besserung wird die Dosis halb wiederholt. Bei weiterem Vorschreiten der Krankheit tritt indessen auch Geschwulst des Halses ein, das Haar sträubt sich auf dem Kopfe, die Augen entzünden sich, triefen und eitern wie die Nase. Betäubung, Schwindel, Krämpfe nehmen zu, und das Thier stirbt oft unter diesen Zufällen. Die Section zeigt Entzündung der Brust- und Baucheingeweide zugleich, Magen und Gescheide braunfleckig und mit zähem Schleim gefüllt. Gewöhnlich giebt man dem Hunde nach Zwischenraum von einigen Tagen Abführmittel, dazwischen täglich dreimal einen gehäuften Theelöffel voll pulverisirte weiße Pimpinellenwurzel. Bei Krämpfen giebt man zwischen den Laxirmitteln außer der Pimpinellenwurzel noch von folgender Latwerge: ℞. Pulv. rad. gentianae, Valerianae min. ana ʒjj, Rhabarbari ʒj, Sulf. antim. aurat. gr. xxx, Mell. comm. q. s. M. f. Electuar. früh und Abends einen Theelöffel voll. Im schlimmsten Falle schreitet man dazu, dem Hunde im Genick ein Haarseil zur Ableitung der Eiterung zu legen. Eine seidene, dreifach zusammengeflochtene Schnur wird mit Oel bestrichen und mit dem Pulver der spanischen Fliegen bestreut, in eine Heftnadel gefädelt und mit derselben drei Finger breit unter der aufgehobenen Haut fortgeschoben und am andern Ende wieder herausgezogen, beide Enden müssen drei Zoll herausstehen und jedes an ein Querhölzchen geknüpft werden. Die Schnur wird täglich etwas hin und hergezogen und der Eiter sanft und oberflächlich abgewischt, in den ersten fünf Tagen auch spanisch Fliegenpulver aufgestreut. Die Krankheit soll vorzüglich auf den Genuß von Kartoffeln entstehen und grenzt in ihrer Höhe an die stille Wuth, in welche sie sogar übergeht. Einem bei dem Einnehmen sich

Digitized by Google

sträubenden Hunde streicht man die Latwergendosis an ein Bein oberhalb der Zehen bis an das Fersengelenk, von wo er sie ableckt. Während der Cur erhält das Thier dünne Mehlsuppe oder Schöpsenknochenbrühe mit leichtem Brode, bei fortschreitender Besserung täglich ein oder ein paarmal eine kleine Portion ungesalzene Butter, worin Majoran gebraten worden, zum Lecken. Sorgfältige Reinigung aller mit dem Eiter benetzten Gegenstände und wenigstens dreitägige Lüftung der Lokale, mit Räucherungen von Essig und Wachholderbeeren ist streng anzuempfehlen. Gesunde Hunde müssen bei dem Grassiren der Seuche von der Berührung mit kranken streng abgehalten werden und leichte Purgirmittel, auch die Pimpinellenwurzel erhalten.

Die Räude (Raude, Krätze, Schabe) folgt auf schlechte Haltung des Hundes, bei Vernachlässigung desselben in Beziehung auf Nahrung und Pflege. Hunde, welche bei fast zärtlicher Constitution kein passendes, schützendes Lager und fette oder grobe unverdauliche Kost zu ungeregelten Zeiträumen erhalten, nämlich zu häufig faulendes Fleisch, Hülsenfrüchte und Kartoffeln, sind dieser häßlichen, ansteckenden Krankheit unterworfen. Es entstehen zuerst auf der Rückenseite des Hundes haarlose, juckende, bald grindig werdende Stellen, welche der Hund wegen brennenden Schmerzes stets aufkratzt. Man bereitet ein Waschmittel, indem man 3 Loth weiße Nießwurz mit einem Maaß Nachbier (oder Kovent), in einen neuen Topf thut, diesen bedeckt und verklebt, die Masse zur Hälfte einkocht und eine starke Messerspitze Antimonium crudum dazu mischt. Hiermit wäscht man den Hund täglich mehrmals, wenigstens früh und Abends und läßt ihn dann sich seines warmen Lagers bedienen. Wenn er das Waschwasser ableckt, so folgt darauf ein günstiges Erbrechen, geschieht beides nicht, so giebt man wohl noch überdies nach Zwischenräumen von einer halben Stunde drei Pillen zu zwei Gran von weißer Nieswurz. Bei der gedeihlichen Cur vermehrt sich der Ausschlag anfangs, späterhin nach dem Abheilen wird eine öftere Reinigung mit Seifenwasser fortgesetzt und der Hund darauf jedesmal auf ein wärmendes Lager gebracht.

Bräune oder Halsentzündung entwickelt sich ziemlich schnell nach Erhitzung und schnell gefolgter Erkältung. Zunge, Schlund und Gaumen schwellen mit Röthe und Schmerzhaftigkeit an und die Freßlust geht verloren. Man streicht die geschwollenen Theile mit einer gleichtheiligen Mischung aus Syrup, verdünntem Honig oder Rosenhonig mit Tormentilleneſſenz, giebt ganz leichte, entzündungswidrige Nahrung, Wassersuppe oder Schlickermilch, in bedeutenden Fällen muß ein Aderlaß angewendet werden.

Fallsucht oder Epilepsie zeigt sich bei den Hunden oft als Symptom von Wurmleiden und wird durch die für diesen Zustand passenden Mittel geheilt. ℞. Rad. angelicae, Calami aromat. aua ℥jj, Asae foetidae ℥vj pulv. add. syrup junip. q. s. F. elect., wovon man täglich 4mal ein Quentchen eingiebt. Der Hund muß übrigens warm gehalten werden, täglich lauwarm gebadet und dann wieder auf dem Lager erwärmt werden. Ist aber die Epilepsie in Folge zu schnell vertriebener Räude entstanden, so giebt man noch Schwefel- und Spießglanzmittel, z. B. ℞. Bacc. junip, Rad. Gent. — angelicae, — inulae Helen. Antimon. crud., Flor. sulf. ana ℥j. Pulv. add. Roob Junip. M. f. Elect. S. von dieser Latwerge täglich viermal 2 Quentchen zu geben.

Verstopfungen treten am häufigsten bei jungen Hunden ein, wenn sie von der Muttermilch entwöhnt werden, oder Hülsenfrüchte und dergleichen blähende Dinge zur Nahrung erhalten. Junge Hunde erhalten dann einen Theelöffel voll Baumöl mit ein

Digitized by Google

wenig Zucker, ältere Hunde diese Dosis dreifach nach Zwischenräumen von zwei Stunden. Man bringt ihm auch Seifenzäpfchen in den Mastdarm und giebt ihm im Nothfalle Clystiere aus Kamillenthee mit Aufguß von 3 Quentchen Sennesblättern und etwas Anissaamen gemischt, wozu man noch nach Umständen einen halben Eßlöffel voll Kochsalz, ein oder ein paar Loth Leinöl oder etwas Seife hinzusetzen kann.

Durchfall wird im Anfange durch Gegenreiz von oben, mit einem Brechmittel aus 10 bis 12 Gran Ipekakuanhawurzel zu Pillen gemacht, geheilt, oder man wirkt später unmittelbar auf den Darmkanal, indem man täglich zweimal 10—12 Gran Rhabarber mit einem Skrupel Magnesia vermischt, mit Wasser eingerührt und in einen Bissen gebracht einzubringen sucht. Das Getränk dabei ist lauwarme Kuhmilch.

Nach Genuß von scharfen Giften bringe man dem Hunde so viel als möglich Baumöl und Milch bei, um die schädliche Einwirkung des Giftes auf den Darmkanal abzustumpfen. Krähenaugen tödten den Hund, und das Blut von Rindern, welche am Milzbrande leiden, wird ihm gleichfalls tödtlich. Otternbiß heilt man mit Chlorwasser auf Brotkügelchen.

Wunden heilt sich der Hund, dafern sie nicht bedeckt sind, durch bloßes Lecken. Bedeutendere mit klaffenden Lefzen verlangen chirurgische Behandlung, müssen geheftet und deren Geschwulst mit Aufschlägen von Essig und Salzwasser gedämpft werden, wobei möglichst magere Kost gereicht wird. Wo der Hund nicht lecken kann, ist das Reinhalten und Abwaschen nöthig, bei Eiterwunden die größte Vorsicht im Abwischen, um durch Aufdrücken nicht die Granulation oder neue Fleischbildung zu stören. Zerbrochene Knochen werden kunstmäßig eingerichtet mit Schienen und Verband behandelt, Brandschäden auf frischer That mit frischem Kuhmist belegt bis sich die Entzündung verloren hat. Auch frisch geriebene Kartoffeln mit Wasser und etwas Weinessig aufgeschlagen und oft erneuert, auch mit frischem Leinöl oder Brandsalbe bestrichen.

Feinde der Hunde sind nächst ihren Verwandten, den Wölfen und Füchsen, besonders die kleineren Thiere, welche nicht in offenem Widerstande, sondern als Ungeziefer ihnen lästig werden. Die Hundsflöhe sind die häufigsten und bekanntesten. Nur die öftere Wiederholung des Waschens mit in Wasser aufgelöster grüner Schmierseife ist praktisch nützlich. Nach Einreibung des Schaumes werden die Flöhe unbeweglich und müssen schnell abgekämmt werden, denn nach einer halben Stunde beleben sie sich wieder. Eine Menge andere Mittel sind empfohlen, doch müssen alle öfter wiederholt werden. Insectenfressende Singvögel, Roth- und Blaukehlchen oder Staare tragen oft zur Verminderung bei. Die Hundszecken (fälschlich sogenannte Holzböcke) Acarus Ricinus, saugen sich im Freien an die Hunde und schwellen von ihrem Blute bis zur Größe einer Erbse an, der Hund giebt den Schmerz zu erkennen, und man löst die Zecken durch Tödtung mit Kienöl oder läßt sie von selbst abfallen, wenn sie vollgesogen sind. Die Stechfliegen, Stomoxys calcitrans, plagt gleichfalls die Hunde. Eingeweidewürmer aus dem Hunde zählt Rudolphi folgende auf: Trichocephalus depressiusculus, Strongylus gigas et trigonocephalus, Ascaris marginata, Pentastoma taenioides, Taenia serrata, cucumerina, Cysticercus canis.

Bei Erziehung der Hunde sehe man zuerst auf eine für sie passende Wohnung. Haus- und Stubenhunde bedürfen eines an einem ganz trocknen Orte ihnen angewiesenen Lagers auf Stroh, Heu, oder zärtlichere wohl auf wollenen Decken oder mit Roßhaar ausgestopften Pfühlen. Hofhunde erhalten ihre schützende Hütte mit Stroh oder

Digitized by Google

Heu, und Meuten von Jagdhunden erzieht man in eigenen Zwingern, umgeben mit einer Mauer oder dichten, hohen Hecken, oder man benutzt dazu einen trocknen Schloßgraben. Die Ställe bestehen aus starken Planken mit Moos ausgestopft, Gegen Süden und Norden mit Schubfenstern, das Dach ist ein Strohdach. Tägliche Reinigung und Räucherung ist unerläßlich, der Mittelraum hat ein gemauertes, muschelförmiges Bassin mit frischem Wasser. An den Wänden befinden sich ringsum ein Fuß hoch vom Boden Pritschen von Erlenholz, welche man mit trocknem Roggenstroh belegt und dies wöchentlich erneuert. Alle Verunreinigung muß zu Vermeidung von Erzeugung des Ungeziefers, sowie zu Erhaltung der feinen Witterung des Hundes vermieden werden, die Thiere selbst müssen von Zeit zu Zeit geschwemmt, gekämmt und gestriegelt werden. Ein freier Schoppen muß ferner dazu bestimmt sein, die Thiere unter Schatten und vor nachtheiliger Witterung geschützt die Luft genießen zu lassen. Zur Paarung läßt man, um gute Hunde zu erziehen, nur reine Racen und kräftige, gut gebaute Individuen zusammen, die trächtige Hündin muß geschont und gut genährt werden, Brot und Schöpsknochen, sowie zum Getränk saure Milch sind ihr vorzüglich dienlich. Man bereitet ihnen an einem stillen Orte ein weiches Lager als Wochenbett und läßt von den Jungen nur bis vier, bei dem allerersten Wurfe nur eins oder zwei bei der Mutter, die übrigen werden getödtet, man ersäuft sie in einem durchlöcherten Sacke mit einem Steine beschwert. Um die stärksten auszuwählen, schlägt Nemesianus in seinem herrlichen Cynegeticon vor, man solle die Jungen, wie auch gewöhnlich geschieht, mit der Hand wiegen, oder man solle sie mit Feuerbränden umgeben und die Reihenfolge beobachten, in welcher die Mutter sie zu retten versuche, immer nimmt sie die besten zuerst, die schwächsten zuletzt *). Trägt man sie überhaupt an einen vom Lager etwas entfernten Ort, so kann man schon dasselbe beobachten. Die Milchnoth der säugenden Hündin soll, wie auch Lenz glaubt, durch ein Halsband aus Korkstöpseln sehr gelindert werden. Die Mutterliebe gegen die Kleinen ist so grenzenlos, wie wir sie bei den meisten Raubthieren antreffen. Der wunderbare Instinct treibt die Mutter bis zum Auffressen derselben, im Fall sie dieselben nicht mehr glaubt einer drohenden Gefahr entziehen zu können. Will man einzelne von der Mutter genommene Junge noch aufziehen, so kann dies mit Kuhmilch geschehen, und damit sie sich beruhigen und warm liegen, kann man sie in Gesellschaft von Kaninchen oder Meerschweinchen bringen. Bei der künstlichen Erziehung genießt der Hund alle Speisen des Menschen, Gewürze halte man indessen von ihm ab, vorzüglich von den Hunden, deren Witterung man bewahren will. Alle Fütterung wird kalt oder nur lau in reinlichem irdenen Geschirr gegeben und frisches Wasser in reinlichem Geschirr zum Getränke muß der Hund täglich erhalten. Schwarzbrot eingeschnitten, mit Knochenbrühe oder Milch übergossen ist ein gutes Hundefutter, auch Haferschrot mit siedendem Wasser übergossen, oder mit Salz und Knochenbrühe, oder Milch, süße und saure, zusammengerührt und abgekühlt ist sehr zu empfehlen, drittens Waizenkleie mit kalter Milch eingerührt bisweilen zur Abwechselung zu geben. Knochen sind ihm sehr nützlich, er zerbeißt die kleineren mit Leichtigkeit, und junge Hunde kräftigen dadurch ihre Kaumuskeln, jedoch nutzen sie am Kauen sehr grosser und fester Knochen die Zähne ab. Stubenhunde enthalte man von Fleisch- und

*) Vergleiche Bunsen's schöne Uebersetzung in seinem und Wildungen's Jahrbuche für Forst- und Jagdfreunde für d. J. 1807. S. 112. 113.

Digitized by Google

besonders von Fettnahrung. Die Züchtigung der Hunde sei vernünftig, d. h. so, daß der Hund weiß, was er ein andermal unterlassen soll, also muß sie unmittelbar nach dem Vergehen und auf der Stelle geschehen. Eine ernste Zusprache versteht ein guter Hund recht wohl, ein Ohrenzausein und ein nicht zu langes Einsperren müssen öfter angewendet werden als Schläge, die nur für den äußersten Fall aufzusparen sind. Daß der Hund den Charakter seines Herrn annimmt, ist schon bei Beschreibung der Dressur der Jagdhunde gesagt worden *).

Nutzen und Schaden. Der Schaden, welcher durch Hunde angerichtet werden kann, bezieht sich vorzüglich auf die glücklicherweise seltenen Fälle, wo Menschen in die fürchterlichste aller Krankheiten verfallen, oder durch schlecht gezogene Hunde einzelne Räubereien in Häusern und Höfen begangen werden, endlich auch die Consumtion von Nahrungsmitteln, welche zum Theil wenigstens für Menschen geeignet wären. Hierauf gründet sich das weit verbreitete Gesetz über den Hundeschlag, zufolge dessen die Knechte des Scharfrichters beauftragt sind, die herrenlos herumlaufenden Hunde einzufangen, diejenigen aber unangetastet zu lassen, welche an der Leine geführt werden und mit einem gegen Zahlung gelösten Blechzeichen versehen sind. Das Gesetz ist seinem Zwecke nach sehr löblich, die Ausführung entspricht indessen weniger der guten Absicht. Die trefflichsten und gesündesten Hunde werden gewöhnlich zuerst weggefangen, dagegen kranke an der Leine geführte Stubenhunde verschont. Die Steuer veranlaßt überdies die möglichste Verminderung der Weibchen, hindert so die Möglichkeit der Verpaarung und vermehrt, wie erwiesen ist, die Tollheit der männlichen Hunde. Würde die Steuer auf Erhaltung der Hundespitäler gewendet, in denen die kranken Hunde durch einen geschickten und approbirten Thierarzt unentgeldlich verpflegt würden, das Einfangen aber durchaus nur auf wirklich herrenlose und kranke Hunde beschränkt, so wäre diese Ausführung so nützlich wie das Gesetz beabsichtigt. In diesem Falle müßten die gefunden eingefangenen Hunde, sobald sich der Herr zu denselben legitimirt, ohne Wiederrede zurückgegeben werden, jeder Hundebesitzer dagegen verbunden sein, jeden kranken Hund alsbald zum Spitale zu liefern. Auf solche Weise würden unzählige unangenehme Auftritte, aber auch alle Gefahren, welche aus der Haltung der Hunde entstehen können, verhindert werden, denn Jedermann würde gern seinen kranken Hund dahin geben, wo er vertrauensvoll eine richtige Behandlung seines Leidens und eine humane Pflege des Thieres erwarten dürfte. Die unmittelbare Benutzung des Körpers der Hunde bezieht sich zuerst auf die Verspeisung des Fleisches, zu welchem Ende wir z. B. gehört haben, daß die Otaheiten diese Thiere mästen. In Carthago, in Griechenland und Rom pflegte man Hundefleisch zu essen, und noch jetzt mästet man sie an den Goldküsten in Afrika und ißt sie in China, wohin darum die Russen ehedem einen bedeutenden Tauschhandel mit diesen Thieren trieben, ferner in Südamerika und in Neuholland und Neuseeland. In Europa bringt man in den Städten Casalnuovo und Lecce Hundefleisch zu Markte, und in Paris soll viel dergleichen verspeist werden. Die Haut giebt einen guten Saffian zu Handschuhen und Strümpfen, letzte für Podagraisten

*) Um sich hierüber vollständig zu belehren, mag außer den mehrmals citirten Schriften noch verglichen werden: Thon, vollständiger Unterricht alle Arten zur Ausübung der hohen und niedern Jagd nöthigen Hunde abzurichten u. s. w. nebst Plan eines Hundehofes. 2. Ausg. Ilmenau 1832. 8.

Digitized by Google

auch der Pelz mehrerer Racen wird benutzt, besonders von den Pudeln und langhaarigen nordischen Hunden. Kleine Hunde ziehen rheumatische Stoffe von Menschen an sich, was schon den Alten bekannt war. Während man indessen in dem Arzneischatze heut zu Tage nur wegen der Nachfrage noch das Hundefett vorräthig hält, so schrieb man in der Vorzeit fast allen Theilen des Hundes heilende Kräfte zu, und trieb noch manche abergläubische Anwendung mit ihnen. In der „Naturgeschichte der Hunde," welche in Augsburg 1790 erschienen ist, finde ich diese veralteten Mittel am vollständigsten zusammengestellt, halte sie aber für zu unwichtig, um sie heut zu Tage wieder einzeln zu erwähnen, weshalb ich zu wichtigeren Weisen der Benutzung dieses Thieres übergehe. Die älteste Geschichte des Menschen ist mit Erzählungen von seinem Umgange mit dem Hunde verwebt. Der Hund wird durch seine Anhänglichkeit an die Person des Menschen, ebenso sehr durch die Kenntnißnahme von seinem Eigenthume und durch die Bewahrung und Beschützung desselben diesem unentbehrlich. Die hohe Entwickelung der Sinne und des Erinnerungs- und Fassungsvermögens bildet den Hund zu einem Geschöpfe, dessen Thätigkeit mit der des Menschen sich harmonisch vereinigt. So erscheint der Hund als Hüter der Heerden, als Wächter für Haus und Hof und als Auffinder verlornen Gutes, aber er zeigt sich auch durch Kraft und Muth als Beschützer, Vertheidiger und Retter des Menschen. Zu manchen kleinen Diensten läßt er sich noch abrichten, indem er verschiedene Dinge trägt, auch wohl mit einem Körbchen zum Bäcker geht und Gebäck holt, dem Herrn, welcher ausgehen will, Hut und Stock herbeiträgt, Thüren öffnet, auch wohl zur Belustigung aufwarten, tanzen und ähnliche dergleichen kleine Künste ausübt. Am auffallendsten unter allem ist das Zusammensetzen von Worten aus Täfelchen, welche mit den einzelnen Buchstaben bezeichnet sind, oder das Rechnen aufgegebener Exempel mit Hülfe von ähnlichen Täfelchen, welche die Ziffern enthalten. Ich sahe einen der in diesem Fach berühmtesten Hunde, den Fido Savant, und es schien mir, daß deren Ausübung sich auf dieselbe Theorie gründet, auf welche andere Thiere, z. B. Pferde dressirt werden, durch Scharren mit dem Fuße gewisse Zahlen zu bezeichnen. Die Täfelchen mit den Buchstaben, zu anderer Zeit wieder die mit den Ziffern lagen in Reihen, und der Hund wählte die nöthigen aus, indem er sie mit dem Maule wegnahm, legte dann alle gewählten in die geforderte Reihe zusammen. Wir dürfen uns hierbei wohl nicht überreden lassen, daß der Hund einen Begriff von dem zu bildenden Worte oder von den dasselbe zusammensetzenden Buchstaben gehabt habe, sondern sicherlich kam alles nur darauf an, ihn aus der vorgelegten Reihe das Rechte auswählen und das Ausgewählte richtig anreihen zu lassen. Mir schien bei dem Wählen der Hund, sobald er an das richtige Täfelchen gelangte, durch eine Veränderung im Blicke des Herrn oder durch eine Bewegung mit dessen Hand oder Reitgerte jedesmal angedeutet zu werden, daß er eben dieses Täfelchen nehmen solle, und so sah er sich in den Stand gesetzt, nach und nach die rechten aneinander zu reihen. Auf dieselbe Weise konnte er Zahlen schreiben und Exempel lösen. — Die Verwendung seiner Kraft und sein Gehorsam machen den Hund endlich zum treuen Diener und Zugthiere des Menschen oder zu seinem Gehülfen, wenn dieser darauf ausgeht, Beute zu machen oder seine Feinde zu bekämpfen. Von den Zughunden der Nordländer haben wir gehört, und für die Landleute Europa's ist diese Benutzung großer Hunde zum Ziehen nicht fremd. Der Dienst der Hunde bei der Jagd würde die Blüthe seiner Leistungen bilden, wäre nicht die menschenrettende Thätigkeit

Digitized by Google

der Bernhardshunde noch über den Jagddienst zu stellen. Die Benutzung großer Hunde im Kriege gegen Menschen, wie die Geschichte von Amerika's Unterjochung berichtet, möchten wir lieber aus dem Gedächtnisse vertilgen. Sehr Vieles, auf die Geschichte der Hunde bezüglich, gehört übrigens zur Geschichte der Jagd, die astronomische Berührung des Hundes in die Astronomie.

Für alle diese Fähigkeiten der Hunde giebt es eine Unzahl von Anekdoten, welche zum Theil recht interessant sind, aber doch hier in dem uns vergönnten Raume um so weniger gesucht werden dürfen, als eine Anzahl sehr bekannter Schriften denselben gewidmet sind, mit denen der Liebhaber dieser Thiere nicht unbekannt bleiben darf. In mehreren der schon angeführten Schriften finden sich dergleichen Anekdoten; aber vorzüglich dankbar in Aufbewahrung edler Züge aus dem Thierleben zeigen sich die Franzosen und Engländer, welche dergleichen mehrmals zusammengestellt haben. Dahin gehört unter andern:

Les chiens célébres. Cinquiéme édition, augmentée de traits nouvaux et curieux sur l'instinct, les services, le courage, la reconnoissance et la fidélité de ces animaux, par M. Fréville. 1. gros vol. in 12. orné de planches. 3 Fr.

Freville, berühmte Hunde, Leipzig 1797. Uebersetzung vom vorigen.

Les animaux celebres, anecdotes historiques sur les traits d'intelligence, d'addresse de courage, de bonté, d'attachement, de reconnoissance etc. des animaux de toute espèce, ornés de gravures. par M. Antoine. 2. vol. in 12.

The Menageries, Quadrupeds. vol. I. second. edit., London 1830.

Die Hausthiere. Aus dem Englischen übersetzt. Leipzig 1834, und eine Menge von Volks- und Jugendschriften, durch welche eine Anzahl dieser Anekdoten mit fortlebt, deren Bekräftigung man nicht eben nachspüren darf.

Unter allen Seeleneigenschaften des Hundes hat die Treue die meiste Bewunderung erregt, und diese rührende Zuneigung des edlen Thieres begleitet manchen unserer Brüder noch hinaus über die Grenze des Lebens, denn es fehlt nicht an Beispielen, wo der treue Hund bei der Leiche des Herrn die eigene Rettung vergaß, oder auf dessen Grabe in Trauer versunken, dem Hungertode sich preis gab. Je weniger der Mensch einer heiteren Berührung mit andern seines Gleichen sich erfreut, um desto höher steigert sich für ihn der Werth irgend eines ihm freundlich gesinnten Wesens anderer Natur, und während der Hypochondrist sich den Umgang mit heitern Menschen verscheucht und der der Freiheit Beraubte der tröstenden Worte des Freundes entbehrt, so erscheint beiden der genügsame, anhänglich theilnehmende Hund — als tröstender Freund!

Digitized by Google

250. 251. 616. Der Simir, bunte Hyänenhund. Lycaon pictus Brooks.

In Afrika: Simir. — Lycaon bei Solinus, Chama bei Plinius? — Hyaena venatica Burch. Hyaena picta Temm. Canis pictus Desmar. Canis tricolor Griffith. — Franz.: Chien hyénoide, loup peint Fr. Cuv. — Engl.: the Hyaena-Dog, painted Hyaena.

Kennzeichen der Art. Nur eine in Färbung und Zeichnung veränderliche Art, welche ein Mittelglied zwiſchen Hund und Hyäne aufſtellt, von jenen durch vier Zehen an allen Pfoten, von dieſer durch den Zahnbau des Hundes (ſo daß an den unächten Backenzähnen nur der vordere Höcker ſich andeutet) verſchieden. — Das Thier hält auch in ſeiner äußern Erſcheinung die Mitte zwiſchen Hund und Hyäne. Dr. Crezſchmar hatte die Gelegenheit, ſieben von Rüppel geſendete Exemplare zu vergleichen, man muß alſo ſeine Beſchreibung beſonders beachten. Die Länge von der Schnauze über den Rücken gemeſſen bis zur Schwanzſpitze betrug 4 Fuß 6 Zoll, Schwanz 1 Fuß 3 Zoll 9 Linien. Kopflänge 9 Zoll 3 Linien. Ohren ſtehen an der Baſis 3 Zoll 6 Linien von einander. Ohrenhöhe 4 Zoll 8 Linien. Größte Breite der Ohren 3 Zoll 9 Linien. Schulterhöhe 1 Fuß 10 Zoll. Kreuzhöhe 1 Fuß 11 Zoll. Die Vertheilung der Farben iſt durchaus unregelmäßig, außer am Kopfe und Halſe. Der Kopf iſt ſtark und dick, die Schnauze ſtumpf und breit, dieſe ſo wie das Geſicht bis zu den Augen ſchwarz. An der Ober- und Unterlippe zeigen ſich einige weiße Haare. Stirn, Scheitel, Nacken und obrer Hals, ſo wie die Schläfgegend ſind hell-ockerfarbig in das Röthliche ſpielend. Von der Naſe zieht ſich mitten über dieſe Theile bis zum Halſe herabſteigend ein ſchwarzer Streifen. Dieſe Abzeichnung iſt die einzige, welche ſich bei allen von C. unterſuchten Exemplaren gleich fand, weswegen ſolche zur Diagnoſe benutzbar ſind, wenn man nämlich das Thier unter eine mit mehrern Arten verſehene Gattung: Hund oder Hyäne verſetzt, denn eine einzelne Art für eine Gattung kann natürlich keine Diagnoſe haben. — Am Vorderhalſe und an den Seiten deſſelben befinden ſich einige Haarwirbel und Haarnäthe, bald weiß bald ockerfarbig, ſchwarz eingefaßt. Die Flecken, welche den übrigen Körper decken, ſind ſchwarze, weiße und ockerfarbige, welche an den ſieben unterſuchten und verglichenen Individuen niemals gleich vertheilt waren, oder auch nur an zweien übereinſtimmend befunden wurden; ſelbſt ihre Größe iſt an gleichen Theilen verſchieden. Die weißen und ockerfarbigen ſind immer mit ſchwarzen Rändern eingefaßt. — Die Sammlung des Senkenbergiſchen Muſeums in Frankfurt am Main beſitzt ein Exemplar vom Vorgebirge der guten Hoffnung, an welchem die ſchwarze Farbe vor den andern überwiegend vorkommt, welches bei denen aus dem nördlichen Afrika nicht der Fall iſt, an denen das Weiße und Ockerfarbige in größerer Ausdehnung erſcheint. Die Ohren ſind dadurch ausgezeichnet, daß ſie lappig ausſehen und wie ein nackter Fleck unter ihnen vermuthen läßt, abwärts gehängt werden können. Sie ſind an der hintern Fläche und am äußern Rande ſchwarz, die Ohrenbüſchel und der innere Rand ockerfarbig, ſo wie mit einem 9 Linien breiten Lappen nach hinten umgeſchlagen. Iris braun. Der Schwanz iſt an ſeiner Wurzel ockerfarbig, ſodann ſchwarz und die Endhälfte weiß. Die Haut iſt ſehr dünn und ſchwarz, die Haare vereinzelt und die Wollhaare fehlen ſonſt ganz, oder laſſen ſich nur an manchen Theilen, als am Halſe und am Schwanze auffinden. Am Unterleibe und den Extremitäten ſind ſie ſehr kurz. Ein Exemplar kam faſt haarlos an und nach den Berichten der Reiſenden ſollen dieſe Thiere zu gewiſſen Jahreszeiten (wahrſcheinlich zur Zeit des Haarwechſels) und im Alter ganz nackt ſein. Dagegen ſind die auf dem Cap lebenden mehr behaart. An den Vorder-

Digitized by Google

beinen ist äußerlich nicht die geringste Spur von einer Daumenzehe auszumitteln, aber an dem Skelet hat C. den Metacarpus für die Daumenzehe 9 Linien lang bemerkt. Dieser endigt stumpf ohne weitere Verbindung als mit der Handwurzel. Der Kopf ist in seiner ganzen Bildung nach mit denen der Hundearten übereinstimmend und die Zahl und Gestalt der Zähne dieselbe, wie bei allen Thieren dieser Gattung. Zu den beiden Seiten des Afters öffnet sich eine Drüse, welche eine sehr übelriechende Feuchtigkeit absondert.

Das Vaterland ist Afrika, und wurde zuerst vom Vorgebirge der guten Hoffnung bekannt, wo Mr. Burchell beobachtete, daß der Hyänenhund nicht sehr entfernt von der Capstadt in großen Truppen die Pächter der Grenzgegend beunruhigte. Sie jagen gemeinschaftlich, meist in der Nacht, indessen verfolgen sie auch ihre Beute bis zum Tage. Sie sind nicht allein außerordentlich kühn, sondern auch so listig und thätig, daß ihnen eine einmal aufgespürte Beute nicht leicht entgeht. Schaafe, Rinder und Pferde verfolgen sie am liebsten. Erstere werden ihnen sehr leicht zur Beute, diesen aber suchen sie meist von hinten beizukommen, so daß sie den Rindern oft nur die Schwänze abbeißen können, die Pferde auf ähnliche Weise oft jämmerlich verstümmeln, so daß diese dann an der Verwundung sterben. Ein Exemplar des Thieres, welches Mr. Burchell lebendig mitbrachte, mußte in seinem Stalle an der Kette gehalten werden und es ließ sich nicht vom Wärter mit der Hand berühren. Wahrscheinlich würde demnach ein jung aufgezogenes Exemplar bei guter Behandlung gezähmt werden können. Es sind davon noch einige lebende nach England gekommen, welche auch mit Hunden und jungen Löwen zusammengesperrt sich vertrugen. Rüppel hat das Thier in der Wüste von Korti und den Steppen des Kordofan aufgefunden, in welchen sein Vorkommen nicht selten ist. Ehrenberg sahe Truppen desselben in Dongola, ohne jedoch eins erlegen zu können. Sie lagern sich gewöhnlich in der Nähe der Steppenwässer im Hinterhalte und überfallen dann die zur Tränke gehenden Thiere. Sie greifen sogar Menschen an und werden von den Arabern sehr gefürchtet. Diese verabscheuen ihr Fleisch, während sie oft das aller anderen Thiere genießen.

Es ist aber in der Geschichte der Hunde erwähnt worden, daß wenn man die Abstammung der Jagdhundracen von irgend einem wilden Thiere herleiten wollte, dies nur in gegenwärtiger Form gesucht werden könnte.

252. **Die braune Hyäne:** Hyaena brunnea Thunberg.

Afrika. Colonist. Strand-wolf, Strand-jut. — Franz.: le loup de rivage. — Hyaena fusca Geoffr St. Hil. — H. villosa Smith.

Kennzeichen der Art: Langzottig, einfarbig braun, unterseits heller, Beine schwarz geringelt. — Wie folgende Arten: an allen Pfoten vier Zehen.

So groß als die gefleckte Hyäne, vom Vorderkopf bis zur Schwanzwurzel 3 Fuß lang, etwas über 4 Fuß von der Nasenspitze bis zum Schwanzende. Schulterhöhe 2 Fuß 4 Zoll. Vorderbeine länger als die Hinterbeine, Vorderrücken überhaupt kräftiger gebaut als der Hinterrücken, besonders Schultern, Kopf und Hals sehr stark. Vorderkopf etwas gewölbt, dessen Haare kurz und dick, theils schwarz theils weiß und röthlich, so daß die Mischung graulich erscheint, Untergesicht von den Augen an schmaler als Obergesicht, gewölbt, Stirn etwas abgeplattet, das Haar daselbst kurz schwarz und röthlichweißlich, ein bis zwei schwarze Flecken am äußern Augenwinkel. Nase und Mittelgesicht schwarz und

Digitized by Google

nackt. Augen groß; Iris gesättigt schwarzbraun, Pupillen vertikal, bald linealisch bald oval. Ohren etwa 4 Zoll lang, zugespitzt, aufrecht, außen und innen mit röthlichem Flaumenhaar bedeckt. Kinn und Lippenseiten schwarz, Kehlbasis schwarz, beiderseits durch eine mehr oder weniger deutliche weiße Querbinde gesondert. Schnurren lang, stark, schwarz, in 3 bis 4 Reihen. Haar am Halse und Leibe sehr lang, besonders auf den Seiten bis zu 6 Zoll. Halsseiten von den Schläfen aus bis zum Vorderrand der Schultern schmuzig röthlichweiß, fast lehmfarbig, so auch, doch mit etwas mehr weiß, die Brust, der Unterleib und die Gliedmaßen. Hals, oben vom Hinterkopfe an mit längeren, röthlichweißlichen und schwarzbraun schattirten Haaren bedeckt. Rücken und Seiten schmuzig röthlichweißlich oder graulich, mit unregelmäßigen schwarzen Flecken, Streifen und Binden gemischt. Schwanz 8 Zoll lang, an der Wurzel schmuzig röthlich, an der Spitze oder über den größten Theil der Länge schwarz, mit weißlichen Haaren gemischt und buschig. Gliedmaßen weißlich mit schmalen, ringartigen Querbinden, Pfoten weißlich, ungefleckt, Klauen kurz und stark.

Am Vorgebirge der guten Hoffnung lebt diese erst neuerlich bekannt gewordene Hyäne in den Strandgegenden, wo sie sich fast ebenso benimmt wie die gefleckte Hyäne doch ist sie furchtsamer als diese.

253. 254. Die gefleckte Hyäne: Hyaena crocuta Zimmerm.

Griech.: κροκότας, κροκούτας, κρόκαλος. — Lat.: Crocuta Plin. — Franz.: L'Hyène, tachetée, loup-tigre. — Engl.: the spotted hyaena. — Synon. Canis Crocuta Gmel. Hyaena capensis Desmar. — Tigerwolf.

Kennzeichen der Art: Pelz graulich oder rothbräunlich, schwarz gefleckt; von den untern Backenzähnen der vorletzte zweihöckrig, Hinterhöcker einfach. Mähne undeutlich, Aftersack fehlt. — Wird 3½ Fuß und darüber, bei 2½ Fuß Schulterhöhe. Das Haar ist etwas zottig graulich mit braunen unregelmäßigen und zahlreichen Flecken über den ganzen Leib. Die Unterseite desselben und die Innenseite der Gliedmaßen ist gelblichweißlich, der Unterfuß dunkler. Am Halse befinden sich weniger Flecken, über den Halsrücken länglich als Streifen in die Länge gezogen. Die Ohren sind fast unbehaart, groß und abgerundet, der Schwanz an der Wurzel gefleckt, übrigens schwarz. Die Haare am Rücken sind etwas länger als die des übrigen Leibes, sie bilden eine Art Mähne. — Eine zweite Race hat weniger zahlreiche Flecken, schwarze Beine, schwärzlichen Bauch, längeres und weicheres Haar von mehr röthlicher, dunklerer Farbe. Cuvier nennt diese, unsre Abb. 254. Hyaena rufa, Hyène rousse. Sie ist indessen die gemeinere und wahrscheinlich länger bekannte, so daß, wenn eine der beiden Racen eine neue Benennung erhalten dürfte, diese wohl die graue treffen würde.

Sie wurde erst durch Pennant bekannt, Kolb scheint sie unter dem Namen Tigerwolf gemeint zu haben, doch giebt er dann fälschlich zurückziehbare Krallen an. — Sie ist das häufigste Raubthier am Vorgebirge der guten Hoffnung, sie findet sich bis an die Schluchten des Tafelberges und beunruhigt von da aus die Pächter in der Nähe der Stadt, bis zu deren Hospital sie sich bisweilen gewagt hat. Während des Sommers bewohnen sie die Sümpfe und ausgetrocknete Stellen großer Ebenen, wo sie im hohen Schilf auf Viverren, Hasen, Springhasen und dergl. kleine Thiere lauern, im Winter ziehen sie sich in die Berge zurück. Man jagt sie durch Umstellung des Röhrichts, welches man anbrennt, die Hyänen fliehen dann aus dem Versteck und die auf dem Anstande befindlichen Hunde fallen sie an. Die Jagd giebt ein Festspiel, denn die

Digitized by Google

Thiere sind eigentlich weniger schädlich als nützlich. Sie reinigen die Gegend von Aas und vermindern die schlimmern Raubthiere: die Paviane und die Genetten. Sie sind überhaupt scheu und fliehen vor Menschen. Nur selten entwenden sie ein Schaaf, mit dem sie davon laufen. Man vertilgt sie indessen auch mit Selbstschüssen, indem man das Gewehr in eine tiefgegrabene Rinne legt und an dessen Drücker eine Lockspeise vermittelst einer Leine befestigt. Sie liegt am Ende der Rinne, die in einen breiteren Graben ausläuft, so daß das Thier den Drücker nur in der Schußlinie berühren kann. Am Elephantenflusse tödtet man sie auch mit vergiftetem Fleische. Außerdem sieht man in der Nähe der Pachthöfe auch Hyänenfallen (so wie bei uns hier und da noch Wolfsgruben gehalten werden müssen). Sie sind aus Steinen in einem Raume von 6 bis 8 Quadratfuß aufgeführt, vorn mit einer schweren Fallthür versehen, welche durch die bekannten Stellhölzer, mit denen der Drücker in Verbindnng gesetzt ist, offen gehalten wird. Ihr Naturell ist minder tückisch als das der folgenden Art, weshalb man sie jung aufgezogen auch zähmen kann. Sie soll nach Barrow's Versicherung in der Gegend der Schneeberge zur Jagd abgerichtet, so brauchbar und treu werden wie ein Hund. Auch in unsern wandernden Menagerien sieht man Exemplare, zu denen die Wärter in den Käfig gehn und mit ihnen ihre Künste produciren. Eine vom Capitän Baudin nach Paris gebrachte entkam, als sie in Lorient angelangt war, aus ihrem Käfig, lief eine Zeit lang in den Feldern umher, that aber Niemand etwas zu Leid und lief endlich in eine Bauerhütte, wo sie sich ohne Widerstand wieder fangen ließ. Sie lebte dann in der Menagerie in Paris sechzehn Jahre lang, und blieb immer sanft, bis sie in der letzten Zeit vor Alter und Schwäche wieder mißtrauisch und bös wurde. Man findet auch hier wie bei andern ähnlichen Thieren, daß theils die Individualitäten verschieden sind, theils auch ihre Ab- oder Zuneigung gegen gewisse Personen sich deutlich ausspricht. Höchst auffallend ist die Stimme dieser Art, ganz verschieden von der der folgenden. Man hört sie oft in unsern Menagerien, wenn das Thier während des Fressens erzürnet wird, sie klingt wie das kurze stoßweiße Hohngelächter böser Menschen und wiederholt sich, ohne Pausen wieder beginnend und accordartig sich steigernd. Eigenthümlich ist's, daß das Thier, wie Lichtenstein erzählt, zur Nachtzeit größer und weißlich aussieht

255—257. Die gestreifte Hyäne: Hyaena striata Zimmerm.

Griech.: ἡ ὕαινα, ης, ὁ und ἡ γλανὸς, οὐ. — Latein.: Hyaena, Gannus, Belbus, lupus marinus Belon. animal necrophagum. — Portug.: Hyaena. — Span.: Hiena. — Franz.: L'Hyène rayée. — Engl.: the striped Hyaena. — Schwed.: Hiánon. — Dän.: Hiaenen. — Holl.: De Hyaena, Zeewolf. — Ital.: Iena. — Arab.: Dabbá, Dsabbá. — Barbar.: Dubbah. — Perf.: Kaftaar. — Ruff.: Byrs. — Georg.: Aptari. — Ind.: Bahggherah. — Mongol. u. Calmukk.: Dom. — Synon. Canis Hyaena Linn. — Hyaena vulgaris Geoffr. St. Hilaire. — Grabthier, Abendwolf, Wolfshyäne, Meerwolf, Indianischer Wolf.

Kennzeichen der Art: Haar lang, über den ganzen Rücken noch weit länger, mähnenartig aufrichtbar, Farbe wolfsgrau, schwärzliche Querbinden, Schnauze und Außenfläche der Ohren und Kehle schwarz; ein Afterbeutel.

Länge 3½ Fuß und darüber, Schulterhöhe 2 Fuß 5 Zoll und darüber. Hinterrücken steht niedriger, Beine dürr, wenn das Thier steht oder läuft, so sehen sie aus, als ob sie an den Ferfen eingeknickt wären, ebenso trägt sie die Hinterbeine nach Art eines hinkenden Thieres; der Schwanz ist buschig, die Schnauze stumpflich und der Kopf ist gleichsam der Kopf einer Fledermaus, welchen Vergleich auch die kleinen blinzelnden Augen

Digitized by Google

bestätigen. Die Zunge ist der der Katzen ähnlich, wenigstens in der Mitte und Spitze mit rauhen Spitzen besetzt. Die Iris ist dunkel röthlich gelb.

Diese Art ist die Hyäne der Alten, das von Alters her als furchtbar und grausam verschriene Thier, welches zwei Löwen in die Flucht treiben, den Hunden erst die Schenkel brechen, oder durch ihren Schatten sie stumm machen, und dann sie würgen sollte. Die darauf bezughabenden Erzählungen gehören indessen einer Zeit an, wo die Charlatanerie auch in der Naturgeschichte Glauben und Bewunderung fand, oder wo die Reisenden selbst zu leichtgläubig waren, um eine richtige Auswahl aus dem, was ihnen erzählt wurde, zu treffen.

Sie lebt im mittlern und nördlichen Afrika, in Arabien und Indien, am häufigsten ist sie am Senegal; von Persien aus verbreitet sie sich auch zum südlichen Vorgebirge der Krimm, welches sich dem Flusse Cymus gegenüber herabzieht, besonders der Mündung des Flusses Liachwi gegenüber in der Gegend von Ateni, von woher Güldenstädt Felle mitbrachte. Sie ist auch nicht selten im Districte von Ghilan und Masanderan und in ganz Taurien und den altaischen Gebirgen.

Das mit niederhängendem Kopfe tückisch umherschleichende Thier jagt besonders zur Nachtzeit um die Bauerhöfe herum, dringt aber auch in die Häuser der Städte und Dörfer, meist nur um Aas aufzusuchen, welches seine Hauptnahrung ausmacht. Daß das Thier hierbei auch an schlecht verscharrte Leichen geräth oder Leichname der Wüste verzehrt, ist der Umstand, welcher dasselbe vorzüglich verhaßt gemacht hat. In Ermangelung von Aas sucht sie sich gern vorzüglich Hunde, aber auch Schaafe, Ziegen, Esel und kleinere Säugthiere und Hausvögel zu verschaffen, aber weit entfernt den Menschen anzufallen, ist sie vielmehr so furchtsam, daß sie sich von ihm überrascht, fassen und bei den Ohren fortschleppen läßt, wie Bruce in Abyssinien gesehen zu haben erzählt. In Indien kriechen Menschen in ihre Höhle, werfen ihr ein Tuch über den Kopf und ziehen sie heraus, nachdem sie vorher gebunden worden ist. Auf gleiche Weise wußte der verstorbene v. Aken einem von den jetzt hier im Museum befindlichen Exemplaren beizukommen, dem man nach dem Einfangen in seinem Vaterlande ein eisernes Halsband umgelegt hatte, welches späterhin von wildem Fleisch umwachsen, das Thier drückte und quälte. H. v. Aken behandelte es auf die angegebene Weise, und feilte das eiserne Halsband durch und befreiete das Thier von seiner Qual. Wo diese Art häufig ist, geht sie auch in Truppen von zahlreichen Individuen nach Aas aus, und wird dadurch höchst wohlthätig, daß sie von dergleichen die Gegenden reinigt. Man sieht sie dann oft in Gesellschaft von Schakals und Aasgeiern auf einem und demselben Aase gierig fressend. Die verschiedenen Gäste vertragen sich, bis der Fraß sich seinem Ende nähert, wo einer den andern abzuwehren sucht, um für sich das letzte Stück zu behalten. Sie ist übrigens allerdings ein trotziges, tückisches Thier, wenigstens läßt sie, was sie einmal mit den Zähnen gefaßt hat, nicht los. Darum sollen die Mauren sie auch bisweilen in einen Sack beißen lassen und sie dann an demselben hangend fortziehen. Sie haben diesen Trotz zum Sprichwort gemacht und sagen vom Menschen ähnlichen Charakters: „er habe den Kopf einer Hyäne." Hierher gehört auch die Ansicht der Alten: das Thier habe einen steifen Hals. Hierin liegt nur soviel Wahrheit, daß die Halsmuskeln sehr kräftig sind und bei ihrer Anspannung den Hals eisenfest machen. Ja es geschieht sogar, wie Cuvier berichtet *), daß bei diesem öftern Anspannen der Halsmuskeln, wo-

*) Recherches sur les ossem. Fossiles. Discours préliminaire p. XXXIX.

Digitized by Google

durch die Halswirbel fest an einander gedrückt werden, diese bisweilen mit einander verwachsen, dann wird allerdings der Hals steif. Wenn sie bös wird, sträubt sie die lange Mähne hoch auf und giebt ihre heisere, heulende Stimme von sich. In den Menagerien wird das Thier gewöhnlich durch die schlechte Behandlung während der Fütterung so bös gemacht. Die Hyäne ist einer Zähmung ebensowohl fähig als alle wilde Thiere, wenn man diese unter guter Behandlung versucht. Sie frißt dann auch Brod.

Gesner nannte den Mandril: Hyäne, und Belonius die Cibette. Die alten Aerzte rühmten die Galle als Heilmittel und hielten das Gehirn für giftig, der Genuß desselben sollte rasend machen, und zu Vergiftungstränken gebraucht werden, deshalb erzählt Skioeldebrandt, daß man den Kopf einer getödteten Hyäne öffentlich vergraben müsse. — Pallas vermuthet mit einiger Wahrscheinlichkeit, daß die gestreiften Doggen von einer ursprünglichen Verpaarung von Doggen mit Hyänen abstammen könnten.

258. 259. **Die Zibethyäne: Proteles Lalandii Is. Geoffr. St. H.**

Holländ.: am Cap.: Aardwolf. — Franz.: Protèle, Civette hyénoide Fr. Cuv. Genette hyénoide Cuv. — Geocyon Wagl.

Kennzeichen der Gattung und einzigen Art: vorne 5, hinten 4 Zehen, 6 breitliche Vorderzähne in beiden Kinnladen, obere mit einer undeutlichen Längsfurche, unten fast zweihöckrig. Eckzähne überall 1. kegelförmig, ein wenig länger als die Vorderzähne. Backenzähne oben 4, unten 5, Zibetspalte am After. Schädel verlängert wie der der Genetten und Füchse. Ein kleineres Thier von Wuchs der Hyänen, mit derselben eigenthümlichen Stellung welche den Vorderrücken über den Hinterrücken mit seinen wie gelähmt gebogenen Hinterbeinen empor hebt. Auch hier ist wie bei den Hyänen die Mittelhand von der Länge des Mittelfußes. Das vor mir stehende Thier ist 2 Fuß 5 Zoll lang, der Schwanz hält 7½ Zoll, der Kopf 8½ Zoll, die Haare am Rücken und Schwanze 3½ bis 4 Zoll. Die Größe ist also die eines gewöhnlichen Haushundes, die Ohren sind gestreckt und spitzig, wenig behaart, die Schnurren lang. Wie bei der gestreiften Hyäne läuft ein längeres, grobes Haar als Mähne über Hals und Rücken hinweg, graulich, eigentlich schwärzlich und weißlich geringelt, über die etwas feiner behaarten Seiten und Außenfläche der Gliedmaßen laufen schwarze Querbinden. Die Pfoten sind schwarz, die Sohlen behaart, der Schwanz buschig. Ein noch wenig beobachtetes, in den Museen seltenes Thier aus dem Caffernlande, wo es De Lalande entdeckte. Es lebt in Höhlen mit vielen Ausgängen und geht nur zur Nachtzeit auf seinen Fraß aus.

260—262. **Die Civette, afrikanische Zibetkatze: Viverra Civetta Schreb.**

Guineanisch: Kankan, Kastor. — Madagask. Falanouc. — Arab.: Zebad. Abyssin. Sebatha. — Portug.: Gatos de Algalia. — Franz.: la Civette. — Felis zibethi Aldrov. Animal zibethicum Hernand. Ray. Meles zibethi Brisa. Zibethicus canis J. S. Haller. Hyaena odorifera arabica Castelli. — In Congo auch Nsime, Nsusi.

Kennzeichen der Art: Aufrechte Mähne über Hals und Rücken. Die Länge des vor mir stehenden Exemplars beträgt 3 Fuß 3 Zoll, der Schwanz hält 13 Zoll. Das Thier wird auch noch etwas größer bis 3 Fuß 9 Zoll 6 Linien, dann der Schwanz 1 Fuß 8 Linien. Kopf 6 Zoll. Ohren 2 Zoll. Vorderfuß vom Ellbogen bis Handwurzel 4 Zoll 10 Linien, von da bis zur Krallenspitze 2 Zoll 3 Linien. Hinter-

Digitized by Google

fuß vom Knie bis zur Ferse 4 Zoll 6 Linien, von der Ferse zur Krallenspitze 3 Zoll 7 Linien, Vorderrücken 11 Zoll 5 Linien, Hinterrücken 10 Zoll 6 Linien. Der Kopf ist dicker, mehr hundeähnlich als bei folgenden Arten, die Schnautze stumpfer, gewölbter, Nasenlöcher seitlich, weit. Die Lippen sind schmaler als die Länge der Eckzähne, Schnurren lang und weiß, In jedem Kiefer befinden sich 6 Schneidezähne, jederseits ein Eckzahn und 6 Backenzähne. Die untern Schneidezähne stehen in einer Linie, die 3 vordern, obern unächten Backenzähne sind fast kegelförmig, seitlich zusammengedrückt, der vierte ist ein fast dreispitziger Reißzahn, der fünfte und sechste mit höckriger Krone. Im Unterkiefer finden sich erst 4 unächte Backenzähne, ein starker zweispitziger Reiß- und ein breiter Höckerzahn. Die Zunge ist dünn, abgerundet, mit kleinen rauhen Wärzchen und scharfen nach hinten gerichteten hornigen Spitzen. Die Augenspalten stehen schief, sind bei Tage halb geschlossen, haben eine bräunliche Iris, senkrechte Pupille und leuchten im Dunkeln. Die Ohren sind aufrecht und dicht behaart. Der Hals ist kräftig, ebenso Brust und Rücken, Leib ziemlich gedrungen. Vier Bauchzizen. Die Daumen stehen näher an den Zehen als bei folgenden. Die Krallen sind halbmondförmig, scharf und bräunlich, halbzurückziehbar. Das Unterhaar ist weißlich, weich, wollig, aschgrau, das Oberhaar ziemlich lang und stark, nicht dicht anliegend sondern mehr locker abstehend. Die Nase ist schwarz, hinter ihr zieht sich eine weiße Binde um die Schnautze herum, vor den Augen steht ein großer schwarzbrauner Fleck, welcher unter der Kinnlade herumzieht, die Kehle hat eine undeutliche halbmondförmige Querbinde, der Unterhals ist schwarz, jederseits läuft eine weiße Grenzbinde herab, welche mit einer Querbinde dies schwarze Feld fast dreieckig begrenzt. Der Leib erscheint aschgrau von der weißlichen und bräunlichen Mischung der Haare mit schwärzlichen Spitzen. Die Zeichnung ist schwärzlichbraun, vom Rücken aus und über die Schenkel laufen Querbinden dieser Farbe, die Seiten sind entweder in mehrern Reihen ziemlich regelmäßig kleinfleckig wie dies bei den jüngern Thieren (260. 262.) und vielleicht dem Weibchen der Fall ist, bei dem ausgewachsenen Männchen fließen die Flecken in unregelmäßige Binden zusammen, der Unterfuß ist schwarzbraun, der Schwanz verdünnt sich nach der Spitze und hat 6 bis 7 schwärzliche Ringe. Der Knochenbau ist bei den Charakteren der Gattung nachzusehen.

Die Zibetdrüse liegt bei beiden Geschlechtern unter dem After, sie öffnet sich durch eine Spalte von 1 Zoll Länge, 1 Linie Breite und ½ Zoll Tiefe. Sie ist der Eingang zu einer Tasche von ¾ Zoll Länge, welche oben ½ Zoll, in der Mitte 3 bis 4 Linien und unten ½ Zoll breit ist. Sie wird durch eine Faltung der äußern Haut gebildet, ist oben und unten halbmondförmig, in der Mitte dreieckig. Diese Haut ist von außen behaart und die Haare sind dicht zusammengeneigt, um den Ausfluß des Zibets zu verhindern, die in das Innere fortgesetzte Haut ist ganz fein und haarlos, der mittlere und untere Theil der Tasche hat einen dreieckigen Vorsprung, nach oben seitlich ist eine rundliche Oeffnung von der Größe einer Haselnuß, welche in einen Drüsensack von der Größe eines Taubeneies übergeht. Er ist eine Fortsetzung der Tasche, oval, hohl und mit vielen kleinen Oeffnungen siebartig durchlöchert, auch fein behaart. Dieser Sack ist äußerlich von einer zottigen, weißen, ziemlich festen Haut bedeckt und von einer fast sehnigen umschlossen nnd zwar so gebildet, daß eine gelblichbräunliche Drüsenmasse etwa 1 Linie dick und mit innern Wülsten wie die Gewinde des Gehirnes versehen, jene Haut umgiebt, welche sich zur Bil-

Digitized by Google

dung des Sackes nach innen umschlägt. Zwischen diesen Wülsten befinden sich viele solche Säckchen so groß oder kleiner als ein Pfefferkorn, rundlich oder birnförmig, sie liegen in der Drüsenmasse versteckt oder ragen auch über sie hinaus, münden mit einer kleinen Oeffnung in den großen Sack. Den größern Säckchen hängen noch kleinere an, diese öffenen sich in einer kleinen Mündung, die sich in einer Vertiefung befindet. Die Drüsenmasse ist ein gefäßreiches Zellgewebe, die Zellen sind oval oder rundlich dreieckig und scheinen von doppelten Wänden umschlossen. Der Zibeth darin ist eine gelbliche Masse, welche auch diese Zellen gelb färbt. Ein starker, halbmondförmiger Muskel bedeckt den Zibethsack von beiden Seiten und hat den Zweck den Zibeth auszudrücken, worauf er in die zuerst beschriebene Höhle gelangt, oder auch aus dieser herausgetrieben wird. An jeder Seite des Mastdarmes liegt noch ein anderer sehniger Drüsensack, beide sondern eine ätzende, wie ranziges Fett riechende Feuchtigkeit ab.

Das Vaterland ist das trockne Afrika vom 31° N. B. bis 25° S. B. Die Lebensweise ist ganz die der Marder und Katzen. Sie ersteigt gern Bäume und entleert die Nester von Eiern, Jungen oder brütenden Vögeln. Sie säuft wenig und soll auch im Nothfalle Wurzeln und Früchte genießen. Ihre Stimme ist heiser, bös gemacht hebt sie sich empor und zeigt einen katzenartigen Grimm. Sie nagt in der Gefangenschaft gern an Holz, wahrscheinlich um sich zu befreien und streicht den überflüssigen Zibet am Käfig ab, so wie im Freien an Steinen und Bäumen. Der Fang geschieht in Schlingen und Fallen, die Eingefangenen hält man in Ställen und füttert sie mit Fleisch, besonders Geflügel. Dies geschieht in Aegypten, Nubien, Abyssinien, Darfur und im Innern von Afrika, wo diese Thiere hier und da einen bedeutenden Reichthum der Großen ausmachen. Vormals hielt man auch Zibetkatzen in Mailand, Neapel, Rom, Venedig, Mantua, Lissabon, in Deutschland in Dresden u. a. O. Man nimmt nach Zwischenraum von zwei bis drei Tagen den Zibet von den Thieren, indem man sie an einem umgelegten Stricke vorwärts, am Schwanze rückwärts zieht, die Wülste des Zibetsackes umstülpt, etwas drückt und den nun ausquellenden Zibet nachdem er in die Tasche eingeflossen, mit einem Löffelchen oder Bambusstäbchen herausnimmt. Die dadurch erhitzt und schmerzhaft gewordenen Theile wäscht man mit Kokosmilch aus. Der Zibet wird auch da wo das Thier ihn selbst abgestrichen hat durch Aufweichung mit warmen Wasser wieder gewonnen. Man reinigt ihn von den beigemischten Häärchen, spült ihn mit Seewasser ab, später mit Limoniensaft und trocknet ihn an der Sonne, worauf er in bleiernen oder zinnernen Büchschen bewahrt wird. Zur Aufbewahrung des Zibets von dieser afrikanischen Zibetkatze bedient man sich auch der Rindshörner. Dieser Zibet, das Zapetium, Zebethium, Zibetha, Civetta oder Cambium zibethi (arabisch: Zebet, ghalia, galia oder algalia genannt,) ist eine fettige Substanz welche man jedoch zu den ätherisch-öligen Mitteln rechnet. Er ist weiß, später wird er gelb und wenn er alt ist, braun. Er hat die Flüssigkeit wie Honigseim, sein Geruch ist in der Ferne dem des Moschus nicht unähnlich, in der Nähe doch mehr ammoniakalisch, der Geschmack bitter. Er besteht aus freiem Ammoniak, einer festen Fettsubstanz: Stearine und einer flüssigen: Elaine, aus Schleim, Harz, flüchtigem Oel, einer gelben, färbenden Substanz und seine Asche enthält kohlensaures und schwefelsaures Kali, phosphorsauren Kalk und Eisenoxyd. Schon in den ältesten Zeiten hat man ihn verfälscht oder künstlich nachgeahmt, indem man Schweinfett mit Honig,

Digitized by Google

ausgepreßtem Muskatöl, Moschus und Benzoe mischte. Der von Guinea und der holländische soll am reinsten sein. In diesem soll man alle dicklichen Klümpchen vermissen. Auf Papier gestrichen soll er eine gleichartige Masse darstellen, am Licht gehalten einen Zibethgeruch geben, sich entzünden, prickeln und beim Verlöschen wie verbrannte Federn oder Haare riechen. Die Aerzte der Alten bedienten sich seiner als eines reizenden Mittels. In neuern Zeiten haben Moschus und Biebergeil den Vorzug erhalten und sein Gebrauch beschränkt sich mehr auf Parfümerien, besonders Pomaden, zu welchem Zwecke er deshalb vorzüglich noch nach Europa gebracht wird.

263. **Die Zibethe, asiatische Zibetkatze.** Viverra Zibetha Schreb.

Malabarisch: Sawádu punée. — Arab.: Quot Bair. — Franz.: le Zibet, la civette. — Engl.: the cive, civet Kat. — Holländ.: de Civet Kat. — Ital.: Zibetto. — Schwed.: Zibet. — Synon. Zibetha orientalis Ok. Vulpis indica Bontius. Animal zibethicum orientale et americanum Valent. Zibethicum animal americanum Hernand. Felis Zibethi Olear. Felis Zibethica Blas. Hyaena odorifera americana Castelli.

Kennz. d. Art: Fell bräunlichweiß und eichelbraun mit rußbraunen und pechschwarzen Flecken und Bändern. Kehle weißlich, jederseits mit pechschwarzen, winklichen Streifen. Mähne klein. Schwanz kurz-haarig, pechschwarz und weiß geringelt. Die Länge hält 2′ 5″, Schwanz 1′ 3″, Kopf 5″ 7‴, Schulterhöhe 1″ 9‴, Kreuzhöhe 1′ 1″ 3‴.

Der Kopf hält seiner Form nach die Mitte zwischen Hunds- und Marderkopf. Die Schnauze ist spitziger als bei voriger Art, oberseits vertieft, mit langen, weißen Barthaaren besetzt, am Männchen stumpfer. Nase stumpf mit großen seitlichen Oeffnungen. Das Gebiß ist hundsähnlich und wie bei voriger Art beschaffen. Zunge und Augen ebenfalls wie bei vorigen, Ohren ein wenig länger. Der Leib schlanker, Zitzen 6—8 Paar, zwei Paar davon auf der Brust, die andern auf dem Bauche. Die Krallen sind halb zurückziehbar. Der Pelz ist bräunlichweiß, fast aschgrau, am Bauche, After und Schwanze dunkler, an der Schnauze, unter dem Auge, vorzüglich am Halse heller, auf dem Schnauzenrücken, den Schultern, dem Rücken, Nacken und äußern Schenkelseiten mit Eichelbraun gemischt. Die Nase ist schwarz, die Füße schwärzlichbraun. Die Schultern, Seiten des Körpers und die Oberschenkel mit fast rußschwarzen Flecken, welche länglich oder rundlicher, auf der Brust und am Bauche unbestimmter sind. Diese Flecken bilden unterbrochene Querbänder, auf den Schultern und Oberschenkeln am deutlichsten. Zwei schwarze Querbänder gehen vom Nacken aus um den Hals herum und kommen an der Brust zusammen, vor ihnen sind auf jeder Seite noch kleinere abgesondert im hellen Grunde des Unterhalses deutlich hervortretend. Der Zibetapparat ähnelt sehr dem der vorigen Art. Sie kommt ihr auch in der Lebensweise nahe, wohnt zwischen 21° N. B. und 9° S. B. in Hindostan, Malabar, Ceylon, Bengalen, Pegu, Siam, Malacka, Sumatra, Java, auf den Philippinen und der Insel Buro. Nach Amerika brachte man sie von den Philippinen herüber, so daß sie auch in Guatimala, Merico, Nicaragua, Cuba und a. O. verwildert ist und deshalb auch amerikanische Zibetkatze genannt wird. Sie wird ebenso gefangen und benutzt wie die andere Art, man füttert sie außer mit Fleischnahrung auch mit aromatischen Früchten, welche die Zibetbereitung im Thiere sehr befördern; dahin gehören die Früchte von Annonen: Soorsacken, Brodbaumfrüchte: Tsjampedas, Bananenfrüchte: Pisangs, Früchte des Zibetbaumes, Durio Zibethinus, Doerians genannt. Man gewinnt den

Digitized by Google

Zibet wie bei der afrikanischen Art, streicht ihn auf Ziri-Blätter, die Blätter von Piper malabaricum und bewahrt ihn, nachdem er gereinigt worden, in bleiernen oder zinnernen Büchschen auf, um ihn auf gleiche Weise zu Parfümerien zu verwenden.

264—266 **Die Rasse, oder javanische Genette.** Viverra Rasse Horsfield.

Javan.: Rasse. — Franz.: La Genette des Indes. — Engl.: the javanese Civet, Indian Genet. Syn. V. indica Geoffr. Desmar. Desmoul. Genetta indica Lesson.

Kennz. d. Art: Grau- röthlichgelb, Ohren nahe beisammen; Rücken mit 8 parallelen schwarzen Fleckenstreifen, Hals dunkler bandirt, Beine schwarzbraun. Haare am Leibe und dem langen, verdünnten Schwanze steiflich.

Sie wird 1′ 11″ lang, der Kopf 5½″, der Schwanz 1′. Ihre Grundfarbe ist ein helles Grau mit der angegebenen Zeichnung. Der Kopf ist oben einfarbig graubräunlich, die Umgegend dunkelbraun, Kinn und Lippen weiß, der Schwanz dunkelbraun und weißlichgelb geringelt. Eine tiefschwarze Linie zeigt sich beiderseits vom Nacken ausgehend, und eine zweite mehr schief ablaufende unter ihr. Der Leib ist schlank und wird hinten höher getragen als vorn, der Rücken bogig gekrümmt. Die Gesichtslinie ist ganz grade, die Schnauze dünn und zugespitzt, die Ohren kurz und abgerundet. Der Schwanz ist so lang als der Mittelleib und nimmt nach der Spitze hin ab, er hat acht bis neun breite, schwarze Ringe, welche mit einer gleichen Anzahl grauer abwechseln. Das Thier ist sehr boshaft und wild. Die beiden Exemplare in der königl. Menagerie am Tower in London, nach denen unsre Abbildung gemacht worden, waren beide Männchen, und wurden in verschiedenen Gemächern gehalten. Sie fraßen Fleisch und vegetabilische Kost zugleich wie die verwandten, und strichen ihren Zibet reichlich ab, so daß die Umgebung von dessen Ausdünstung erfüllt wurde. In Java benutzt man denselben so sehr, daß die Zimmer und Mobilien der Reichen damit parfümirt werden, was dem Ausländer lästig auffält. Das junge Thier (Abb. 266) weicht von dem Erwachsenen noch durch die Unbestimmtheit der Fleckenzeichnung ab. Sie gehört bereits zu der Gruppe der Genetten, welche sich durch einen flachen Zibetbeutel unterscheiden.

267. 269. **Die Genette, Genetkatze.** Viverra Genetta Lin.

Franz.: La Genette, Genette de la Barbarie ou commune, Chat d'Espagne. — Engl.: the Genet Cat. — Syn. Genithkatze, Genetta. — Vergl. Viverra malaccensis L. und tigrina Schreb.

Kennz. d. Art: Aus dem Aschgrauen gelblichgrau, Spitze der Schnauze, Augengegend und zwischen den Augen weiß; Unterkinnlade, Seiten der Schnauze und einige unregelmäßige, etwas unterbrochene Streifen des Halses, die Rückenlinie und 5 Fleckenreihen über die Seiten sind schwarz, der Schwanz kürzer als der Leib und schwarz geringelt (mit 9 bis 15 Ringen).

Ein schlank gebautes Thier von 1½ Fuß Länge, Schwanz 10—14″. Der Leib ist fast nach Art dessen vom Iltis oder Marder gestreckt, die Zeichnung und der geringelte Schwanz läßt indessen die Genette noch mit einer Katze vergleichen, welcher sie auch in ihrer Lebensweise ähnelt, wie auch der Bau ihres Auges mit länglicher Pupille bezeugt. Das Oberhaar ist nur etwa einen halben Zoll lang, daher die Genette ein weit zierlicheres glätteres Ansehen hat, als vorige Arten. Das Weibchen hat vier Bauchzitzen. Die Zibetdrüsen unter dem After sind nur 10 Linien lang und 5 Linien dick. Die durch sie gebildeten Erhebungen verbinden sich mit einer Hautfalte am After nach Art einer Tasche. Die Höhlung ist mit einem gelblichen, wohlriechenden Oele erfüllt.

Digitized by Google

Die Genette bewohnt die Barbarei und den Süden der pyrenäischen Halbinsel, sie findet sich in Spanien und Frankreich an feuchten Orten am Rande der Bäche. Man erzählte Buffon, daß sie zu Rouergue sich im Winter in Höhlen zurückzöge. Auf ähnliche Weise scheint sie in der Barbarei und dem Vorgebirge der guten Hoffnung zu leben. Sie nährt sich vom Raube, ist aber sanft und leicht zähmbar. Sie hascht dann Ratten und Mäuse. Zwei Genetten, welche man von Tunis in die Menagerie nach Paris sandte, waren sehr traurig und träge, und lagen meistens durch einander verschlungen im Schlafe, sie paarten sich wie Katzen und brachten auch ein Junges zur Welt, welches den Alten ähnlich gezeichnet war. Wir sahen, daß die Exemplare, welche hier in Dresden lebendig waren und welche ich jetzt ausgestopft vor mir habe sich ebenso benahmen. Das junge Thier 269. hat einen verhältnißmäßig nach kurzen Schwanz, überhaupt scheint mir die Länge des Schwanzes und die Zahl seiner Ringe sehr zu ändern. Die Tiger-Genette, Viverra tigrina *L.*, über welche ich das Historische unter Nr. 277 beibringen werde, scheint in der That zur gewöhnlichen Genette zu gehören, wenigstens weichen Exemplare die ich kürzlich unter diesem Namen vom Vorgebirge der guten Hoffnung erhielt, nicht wesentlich von ihr ab. Auch die zweifelhafte Viverra mallaccensis Buffons und Schrebers (vergl. 275.) soll nach Cuvier hierher gehören.

270. Die dünnschwänzige Genette. Viverra leptura Rchb.

Franz.: Genette à queue grêle.

Kennz. d. Art: Graulich-gelblich, Schnauze, Unterkinnlade, Mittelstreif auf der Stirn und auf dem Rücken zerstreuete Flecken, eine bogige Binde auf den Schultern und die Ringe des sehr verdünnten Schwanzes schwärzbraun; Wangen, Oberlippe und Mittelstreif der Oberkinnlade weiß.

Das Thier ist noch schlanker gebaut als die Genette, 15½ Zoll lang, der Schwanz 16 Zoll lang, sehr dünn, die Haare desselben aber sehr lang, die nächst der Basis über zwei Zoll lang. Es war hier lebendig, sollte aus Südafrika herstammen und betrug sich so wie die ähnlichen Arten. Es befindet sich jetzt ausgestopft vor mir im Museum. Es dürfte sich von folgender Art durch die angegebene und gut dargestellte Zeichnung und weit längere Haare des dünneren Schwanzes unterscheiden.

271. Die Senegal-Genette. Viverra senegalensis. Fr. Cuv.

Franz.: Genette du Sénégal.

Kennz. d. Art: Aschgrau graulichgelblich: Schnauzenspitze, Augenkreis und Mittelfeld weiß, Unterkinnlade, Seite der Schnauze, regelmäßige fast gleiche Streifen am Halse, Rückenlinien, vier Fleckenreihen der Seiten und ein scharfbegrenzter Fleck auf den Beinen über dem Fersengelenke schwarz; der Schwanz länger als der Leib, 10—12-ringig, mit weißlicher Spitze.

Sie ist sehr schlank gebaut, wie die übrigen Genetten, nur 15″ lang, ihr Schwanz 18″, Kopf 3″, Schulterhöhe 7″. Auf dem gelblichgrauen Grunde zeigt sich eine sehr zarte schwarze Zeichnung. Eine schwarze Linie läuft vom Nacken aus über den Rücken bis zum Schwanze, jederseits entspringt eine andere vom Nacken und steigt über die Schultern fast bis zum Ellenbogen herab; eine andere Linie geht unter dem Halse von der ersten aus und verbreitet sich bis hinter das Schulterblatt. Wo sich diese endigt

Digitized by Google

steht ein Querfleck und noch zwei Reihen längs des Rückens hin und parallel zwei Reihen Längsflecken, deren jede aus vier besteht; unter ihnen noch eine Reihe von zehn kleinen, rundlichen Fleckchen in unordentlicher Stellung, die beiden letzten von ihnen sind lang. Nach dem Bauche hin finden sich noch fünf ovale Flecken. Der Schenkel trägt noch ein Dutzend runde unregelmäßig stehende Flecken, und über der Ferse befindet sich nach außen eine breite schwarze Ringbinde, welche nach innen mit ihrer Färbung die Ferse umgiebt. Am Halse zeigen sich noch unter der Seitenlinie einige größere und kleinere, unregelmäßige Flecken. Der Schwanz hat 10—12 Ringe und eine graue Spitze. Die Ohren sind hinten grauröthlich. Unter ihnen und unter den Augen sind zwei weiße Flecken, ein ähnlicher an der Spitze der Schnauze; unter dieser Stelle und dem Weiß unter dem Auge nimmt das Grau des Kopfes eine so dunkle Färbung, daß dieselbe fast schwarz wird. In dieser Stelle sind auch die Schnurren schwarz. Die Haare des Leibes, ohne ganz glatt zu sein, sind doch nicht lang, die des Schwanzes sind länger und schlaffer als die andern, so daß der Schwanz größer erscheint, als er ist.

272. 273. **Die Panthergenette.** Viverra pardina Isid. Geoffr.

Franz.: La Genette pantherine.

Kennzeichen der Art: Grauröthlichgelb, Flecken schwarz, die der Seiten ringförmig.

Sie wird 1½′ lang, der Schwanz 1 Fuß bis 15 Zoll. Sie hat ganz den Wuchs der Genette, ihre mittlere Höhe ist 6 Zoll. Sie zeichnet sich vorzüglich durch ihre ringförmigen Flecken aus. Sie lebt am Senegal, von woher sie auch lebend nach Paris gebracht wurde. Sie benahm sich sehr sanft und konnte sogar frei gehalten werden, sie schmeichelte denen, welche sie pflegten. Im Käfig gehalten drohte sie allen, die sich ihr näherten, machte nicht einmal eine Ausnahme mit den Wärtern. Das vor mir stehende Exemplar 272. ist mehr grau und hat schmalere Schwanzringe als das von Isidor Geoffroy Nr. 273.

274. **Die Soffane.** Viverra Fossa Gm. Schreb.

Franz.: La Fossane Buff. — Engl.: the Fossan-Weasel Penn.

Kennzeichen der Art: Grauröthlich, Flecken schwarzbraun, über dem Rücken in vier Reihen, die übrigen zerstreut, Schwanz geringelt.

Die Fossane ähnelt im Wuchs und Größe sehr der Genette und lebt auf Madagaskar. Buffon erhielt seine Notizen über dies Thier durch Poivre, und Daubenton sahe das ausgestopfte Exemplar wonach die Abbildung gemacht worden ist. Man weiß deshalb noch nicht, wie bei ihr der Beutel beschaffen sei, den der Entdecker bei dem Thiere nicht gefunden haben will. Der Schwanz soll nur Halbringe haben, was der Abbildung nicht ganz entspricht. Die jung aufgezogenen Thiere sollen lieber vegetabilische Nahrung als Fleisch gefressen haben, doch aber wild gewesen sein.

275. **Die Genette von Malacka.** Viverra malaccensis L. Gm.

Franz.: La Genette de Malacca.

Kennzeichen der Art: Grau, oben schwarz gefleckt, vier runde Flecken über den Augen, drei schwarze Streifen am Halse und Rücken, Schwanz lang, schwarz geringelt.

Diese Art ist zweifelhaft, die Abbildung von Buffon und Schreber, welche wir widergeben, um auf dieselbe aufmerksam zu machen, ist von Cuvier für die ei-

Digitized by Google

ner gewöhnlichen Genette gehalten worden, mir ist es weit wahrscheinlicher, daß sie zur Rasse (264—266.) gehören mag, womit auch das Vaterland übereinstimmen würde.

276. **Die schwarzgeschwänzte Genette.** Viverra melanura Rchb.

Franz.: La Genette à queue noire Demoul. Dict. class. IV. p. 176. — Syn. Viverra hermaphrodita Pall. Buff. — Platyschista Pallasii Otto N. Act Leop. Carol. XVII. II. p. 1092.

Kennz. d. Art: Aschgrau, über den Rücken schwärzlich, unten und auf der Stirn blasser, Streifen über den Rücken, zerstreute Flecken und der größte Theil des Schwanzes schwarz. Das vor mir stehende Thier ist 1 Fuß 8 Zoll lang, der Schwanz 13½ Zoll. Otto verglich ein zweites Exemplar und gab das Maaß an zu 1′ 8″, den Schwanz 1′ 9″, indem er denselben verstümmelt fand. Schulterhöhe 8″ 9‴, Kreuzhöhe 9″. Kopf 4″, größte Breite desselben 2″ 7‴. Diese Art ist gedrungener gebaut als vorige und scheint mir in jeder Hinsicht der Gattung Paradoxurus nahe zu kommen. Wie die Abbildung zeigt, ist auch der Kopf dicker und die Schnauze weniger spitz als bei den Genetten. Die Nase schwarz, feinkörnig, durch eine Mittelfurche getheilt. Die Iris dunkelbraun, die Pupille nicht perpendikular, sondern horizontal länglich. Die Ohren sind 1½ Zoll lang, aufrecht, unten am Hinterrande mit einem Einschnitt und Nebenläppchen. Die Beine sind verhältnißmäßig länger als an den Genetten, alle haben 5 Zehen, auf welche das Thier auftritt, die Nägel halb einziehbar, scharf, sehr bogig und seitlich zusammengedrückt. Die Fußsohlen schwarz, nackt. Eine sehr detaillirte Beschreibung nebst vollständiger Anatomie dieses Thieres, an welchem eine eigenthümliche flache Spalte zwischen dem After und den Organen des Geschlechts den Anlaß zur Unterscheidung einer neuen Gattung mit gegeben hat, findet man von Otto a. a. O. mitgetheilt. Die Art wurde, wie es scheint, zuerst von Pallas bei Schreber beschrieben, aber von andern Schriftstellern bis auf Otto nicht wieder erkannt. Ich publicirte sie im Regnum animale No. 276. als Viverra melanura, da sie im Dictionn. classique bereits Viv. à queue noire genannt worden war. Sie soll aus der Barbarei herstammen. Unser Thier war eben so lebhaft wie das, von welchem Desmoulin schreibt, es sei in steter Bewegung gewesen; während der kälteren Jahreszeit hält es sich indessen fast den ganzen Tag zusammengerollt in die Ecke des Käfigs hineingedrückt.

270. **Die getiegerte Genette.** Viverra tigrina Schreb.

Franz.: Chat Bizaam Vosmaer. Viverre tigrée.

Kennzeichen der Art. Blaß grau und gelblich gemischt, Rückenstreif und unregelmäßig zackigverlängerte Seitenflecken schwarzbraun; Schnauzenspitze und Flecken unter den Augen weiß (Schwanz schwarz und weiß geringelt?).

Dieses Thier ist als Art zweifelhaft, ich habe die Originalabbildung von Vosmaer, welche Büffon und Schreber auch aufgenommen, wieder gegeben und bemerke dabei, daß sie nach einem Thiere gemacht worden ist, welches der Gouverneur der Cap-Colonie Richard Tulbagh 1795 unter dem Namen einer Bisamkatze nach Holland sendete, wo es in der Menagerie des Prinzen Erbstatthalters drei Jahre lang lebte. Es war nicht bös und zeigte keinen Bisamgeruch. Man hat aber neuerlich am Vorgebirg der guten Hoffnung ein solches Thier nicht wieder aufgefunden, sondern nur Genetten, und was ich selbst von dort unter dem Namen Viverra tigrina erhielt, gehörte ebenfalls nur zu den Genetten. Die Abbildung weicht indessen so sehr von den

Digitized by Google

Genetten ab, daß es nicht unwahrscheinlich ist, das von Tulbagh gesendete Thier sei ein ostindisches gewesen und nur irrig oder vermuthungsweise als afrikanisches beschrieben worden, denn es zeigt weit mehr Aehnlichkeit mit folgender Art No. 628 als mit einer afrikanischen Genette.

628. **Der Linsang.** Viverra Linsang Hardw.

Javan.: Delundung. — Franz.: La civette grêle Lesson. — Syn. Felis (prionodontes) Linsang Horsfield. — Viverra prehensilis Blainville. — Paradoxurus Linsang Fischer.

Kennzeichen der Art. Leib blaß gelblich, Zeichnung schwarzbraun, über den Rücken laufen vier breite Binden, über den After zwei schmale, an Schultern und Hüften sind mehrere Flecken, am langen Schwanze 7 schmale Ringe.

Der Leib ist 15 Zoll lang, der Schwanz 13 Zoll, der Kopf 3½ Zoll. Hardwicke beschreibt das Thier folgendermaßen: Der Kopf ist klein, oval, sehr spitz, leicht kegelförmig, der Oberkiefer länger als die Kinnlade, die Schnurren borstenförmig, länger als der Kopf, schief nach vorn gerichtet; Augen klein, rundlich; Ohren oval, mittelgroß; Schwanz fast so lang als Leib, walzig; Beine katzenartig d. h. auf die Zehen auftretend, 5zehig, Krallen kurz, zurückziehbar und im Haar verborgen; Pelz weißlichgelb mit schwarzen Längsbinden und zusammenfließenden und langen Flecken von derselben Farbe; die Flecken auf den Schultern und Hüften sind schärfer begrenzt, der Schwanz hat sechs gelblichweiße und sechs schwarze Ringe*); die Unterseite des Leibes und Halses ist gelblichweiß, die Verse schwarz; ein schwarzer Streif läuft vom äußern Augenwinkel zur Seite des Halses. Das Vaterland ist Java. — Das Thier scheint allerdings mit der Civette préhensile von de Blainville, welche Desmarest in seine Mammalogie p. 315 nach einer in Bengalen gefertigten Abbildung beschreibt, wahrscheinlich dieselbe, welche General Hardwicke stechen ließ. Major Farquhar hatte sie mitgetheilt und zuerst in der asiatischen Societät zu Calcutta eine Abhandlung über das Thier vorgelesen. Wegen des Rollschwanzes könnte man dasselbe in die Gattung Paradoxurus versetzen, wie Fischer gethan hat. Unsre Abbildung findet sich unter den Nachträgen Tab. 78.

278. **Die gestreifte Genette.** Viverra fasciata Gmelin.

Franz.: Chat sauvage á bandes noires des Indes Sonnerat. Putois rayé de l'Inde Buffon. Genette rayée de l'Inde Fr. Cuv. — Syn. Viverra striata Desmarest. nicht das gleichnamige Thier von Shaw.

Kennzeichen der Art. Gelblichgrau unten blasser, mit 6 schwarzen Längsstreifen, Schwanz röthlich. Größe und Wuchs des Iltis.

Das Thier, wie es Sonnerat in Coromandel beobachtete und wie es Büffon und nach ihm Schreber abbildeten, scheint nicht genau so wieder beobachtet worden zu sein, wenigstens beschreibt Geoffroy seine Viv. fasciata nicht mit zusammenhängenden Streifen, sondern mit Fleckenreihen und Desmoulin sagt, daß Schrebers Abbildung nach der Einbildung (imaginaire) gemacht sei. Wir haben deshalb eine bessere Büffonsche gewählt. Das Thier im Pariser Museum hat übrigens eine blaßgelbe Grundfarbe, die Schnauzenspitze, Kinnlade und Stirn weißlichgelb, ganze Unterseite gleichartig graulichgelb, Schwanzspitze und Pfoten dunkelbraun. Man vergleicht sie mit der schwarzgeschwänzten, auch mit den javanischen Genetten.

*) Hier wird also der siebente an der Basis, welcher aus Flecken besteht, wahrscheinlich nicht mitgezählt.

Digitized by Google

279. 280. **Das listige Katzenfrett.** Bassaris astuta Lichtst.

Mexic.: Cacamiztli, Tepe Maxtlaton, Tepemaxtla Hernandez. Cacomixle Koerl. Franz.: Bassare russée.

Nur eine Art dieser Gattung, welche 6 Vorderzähne, 1 Eckzahn, 6 Backenzähne jederseits hat, wie Viverra, aber die hintern Backenzähne sind breit, auch wie Nasua, aber die Eckzähne sind kegelförmig abgerundet, die Beine blos zehenlaufend, die Krallen zurückziehbar. Das Gebiß betrachten wir unter den Characteren der Gattung.

Das Katzenfrett schließt sich in Wuchs nahe an die Genetten, mit denen es auch durch den geringelten Schwanz übereinkommt. Das vor mir stehende Thier ist 13 Zoll lang, der Schwanz 12 Zoll, worüber die Haare noch hinausragen. Der Kopf ist $3\frac{3}{4}$", die Ohren 1"2"' lang. Die Färbung und Zeichnung nähert sich der der Coatis. Die Nase nackt, Nasenspitze abgestumpft, Ohren mittelmäßig, schmaler und mehr oval als bei der Genette. Die Augen stehen zwischen Nase und Ohren fast in der Mitte und sind mittelgroß, der Leib schlank und der Schwanz lang und lang behaart. Die Beine sind Gangfüße, mit den Zehen auftretend, die 5 Zehen frei, die Sohlen kurz und feinbehaart, die Zehenballen aber nackt wie bei den Katzen, die Krallen sichelförmig, zusammengedrückt, sehr scharf und zurückziehbar wie bei den Katzen. Die Hauptfärbung ist ein dunkles braungrau über den Rücken hin mit längern, schwärzlichen Haaren untermischt, Wangen und Unterbauch gelblichweiß, auch neben den Augen ein weißer, hinten schwarz gerandeter Fleck, die Ohren wenig behaart, hinten weiß, der Schwanz schwarz mit 7—9 weißen Ringen, welche nach unten in ein V zusammenlaufen. Nase und Unterseite der Zehen ist schwärzlich, die Ballen hoch, von den Seiten zusammengedrückt und von zur Seite stehenden, weißem Borstenhaar ganz überwachsen. Die Wollhaare sind fein und dicht, zwischen ihnen liegen lange, etwas steifliche Haare, besonders auf dem Rücken, wodurch dieser sich bei dem Rückwärtsstreichen etwas rauher anfühlt, als bei den Genetten. Das Katzenfrett wurde bereits von Hernandez in Meriko beobachtet, kam aber erst neuerlich in europäische Museen, wo Lichtenstein dasselbe als neue Gattung aufstellte. Das Gebiß stimmt der Zahl nach mit den Viverren, sowie mit den Nasenthieren überein, ist aber von beiden, wie oben angegeben, verschieden.

281. 282. **Der Zorill vom Cap.** Mephitis Zorilla Illig.

Cap Colonisten: Muishond. — Franz.: le Zorille Buff. Putois du Cap Cuv. — Span.: Viverra Zorilla Schreb. — Mustela Zorilla Desmar.

Kennzeichen der Art. Schwarz, Flecken auf dem Kopfe und 4 vom Nacken auslaufende Streifen weiß, von diesen sind die beiden mittlern auf dem Hinterrücken am Innenrande ausgebogen, der Schwanz weiß.

Der Zorill ist von der Größe des Iltis, etwa 1' lang, der Schwanz 9" 6"', die Haare aber 3" über die Spitze hinausragend, Kopf zwischen den Ohren 2" 5"', der Nasenknorpel ragt 2"' über, die Krallen der Vorderpfoten 7"', die der Hinterpfoten 3"'. Der Bau ist gedrungener als der des Iltis,, daher sieht das Thier kürzer und dicker aus. Das lange Haar ist glänzendschwarz, ein kleiner Fleck auf der Stirn, ein größerer zwischen Auge und Ohr und die vier Längsstreifen, die von einem gradlinigen Querabschnitt auf dem Nacken beginnen, sind weiß, der obere Streif 8"', der untere 1 Zoll breit, der schwarze Mittelstreif, welcher sich über das Rückgrath hinzieht, ist auf dem Kreuz 2" 3"' breit. Die oberen weißen Streifen gehen

Digitized by Google

in die Seiten des Schwanzes über, dessen Rücken nur von der Basis aus schwarz ist, während alles übrige sich in weiß verläuft, die beiden untermischten Seitenstreifen verschwinden auf den Hüften. — Der Zorill lebt im Süden von Afrika, hat aber durch Verwechselung einen Namen erhalten, welcher in Mexico mehrern kleinen Raubthieren von ähnlichem Wuchs und ähnlicher Färbung und Zeichnung beigelegt wird. Zorilla als Diminutiv von Zoro (Fuchs) bedeutet Füchschen und so findet sich auch bei Schreber fälschlich Südamerika als Vaterland angegeben.

Der Zorill unterscheidet sich von den Marder- und Iltisartigen Thieren, Mustela, zu denen man ihn sonst auch gesetzt hat: durch seine stumpfere Schnauze, dadurch, daß er oben 2 und unten 3 falsche Backenzähne, übrigens dicke, stumpfe Grabeklauen hat. Auch in seiner Lebensweise hat er durchaus nicht die jenen Thieren eigenthümliche Behendigkeit, an welcher schon sein plumper Bau ihn verhindert, sondern lebt träger in seinen Erdlöchern unter Gesträuch und Bäumen oder in den Klüften der Felsen, von wo aus er sich Insecten, junge Vögel und kleine Nagthiere zur Nahrung verschafft, aber durchaus nicht mit jener Virtuosität zu erhaschen weiß, welche den genannten Thieren eigen ist. Die Colonisten am Vorgebirge der guten Hoffnung halten ihn hie und da unter obigem Namen in ihren Höfen und Häusern zu Vertilgung oder wenigstens Vertreibung der Ratten und Mäuse. Die Männchen verbreiten vorzüglich zur Paarungszeit den höchst unangenehmen Geruch, der ihre innige Verwandtschaft mit den Stinkthieren, der Gattung Mephitis, noch mehr rechtfertigt. Eine kleinere, noch nicht hinlänglich bekannte Art entdeckte Ehrenberg und nannte sie M. lybica.

283. 284. Der Zorill von Senegal. Mephitis Zorilla senegalensis.

Franz.: Le Zorille du Sénégal.

Kennzeichen der Art. Schwarz, Flecken am Kopf und vier sehr breit auslaufende, bogenrandige Streifen, nebst Schwanz weiß.

Das Thier wird wenigstens als Abänderung des vorigen betrachtet, mag sich aber vielleicht nach genauerer Beobachtung als Art unterscheiden lassen, da wir wissen, daß auch die verwandten amerikanischen Thiere einander so sehr ähnlich sind, daß ihre Unterscheidung lange zweifelhaft blieb. Der Zorill vom Senegal ist größer als der vom Cap, ich messe 16″, der Schwanz hält noch 9½″. Die ganze Behaarung ist weit länger, die Abweichung im Verlauf und Rundung der viel breiteren Streifen machen die Abbildungen deutlich, auch sieht man daraus, wie der ganze Wuchs des Thieres sich mehr zu dem des Iltis hinneigt, indem es mehr gestreckt ist und den Rücken mehr gebogen trägt.

285. Der Conepatl. Mephitis Conepatl (Viverra) Gm.

Mexic.: Conepatl Hernand. — Franz.: La Mouffette Conepatl.

Kennzeichen der Art. Schwärzlich, zwei weiße Streifen verlaufen über den Rücken und von da über die Seiten des Schwanzes, eine weiße Linie längs über die Mitte des Kopfs.

Das wenig bekannte Thier soll in der Größe mit folgendem übereinkommen, Hernandez lernte es in Mexico kennen, man vermuthete aber, daß Azara's Thier, welches er Yaguaré nennt, zu derselben Species gehöre und nur eine Varietät mit we-

Digitized by Google

nigen deutlichen weißen Streifen sei, sowie derselbe auch wohl noch eine schwärzliche Varietät erwähnte. Von solchen Vermuthungen von Varietäten ist bei so schwer zu beobachtenden Thieren wenig Förderung der eigentlichen Kenntniß zu erwarten und es scheint besser zu sein, wie Lichtenstein gethan hat, die Formen die man hat, genau zu sondern. Aus dessen Bearbeitung lernen wir unsere Abb. 608 als Azara's Thier kennen.

Mit diesem Thiere beginnen übrigens die eigentlichen Stinkthiere, welche sich von den afrikanischen Zorillen noch unterscheiden. Sie haben unten 6 Schneidezähne, 2 Eckzähne und 10 Backenzähne, von denen 6 falsche Backzähne, 2 Reißzähne und 2 Höckerzähne sind, die Reißzähne sind durch eine Aushöhlung in zwei fast gleiche Hälften getheilt, die vordern haben drei in einem Dreieck stehende Spitzhöcker, die hintern deren zwei spitzige und dünne Höcker. In dem Oberkiefer sind vier falsche Backenzähne. Alle sind nächtliche, sehr verborgen lebende Thiere, leben von kleinen Thieren verschiedener Classen, von Honig und von Eiern. Den Namen Stinkthiere, Teufelskinder u. a. haben sie von dem wirklich abscheulichen Geruche erhalten, den sie zur Paarungszeit oder wenn sie aufgereizt werden, verbreiten. Er entspringt von einer ölig-schmierigen Substanz, welche sich aus Drüsen unter dem After absondert und durch den After ergossen wird. Unser Iltis hat dieselben Drüsen, aber doch weit weniger entwickelt. Der Gestank von den Stinkthieren ist so heftig, daß Kalm versichert, er versetze den Athem und ein Tropfen in das Auge gekommen, könne wohl Erblindung verursachen; aus den Kleidern ei der Geruch fast nicht zu vertreiben. Im J. 1749 kam in einer Winternacht ein solches Thier an den Pachthof, wo der Reisende wohnte, die Hunde lärmten und verfolgten es, sogleich verbreitete sich aber ein solcher Gestank, daß K. im Bett liegend, fürchtete ersticken zu müssen, die Kühe blökten aus allen Kräften. Gegen Ende des Jahres schlich sich ein anderes in den Keller. Eine Frau bemerkte nur die funkelnden Augen und erschlug das Thier, aber sogleich erfüllte dasselbe den Keller mit einem solchen Gestank, daß nicht nur diese Frau für mehrere Tage krank wurde, sondern auch Brod, Fleisch und alle übrige Victualien des Kellers dermaßen von demselben durchdrungen worden waren, daß man alles wegwerfen mußte. Daher kommt es, daß jedermann sich scheut diesen Thieren nahe zu kommen oder gar sie zu berühren. Diesem Umstande ist es auch zuzuschreiben, daß sie noch so wenig bekannt sind, und diejenigen Naturforscher, welche sich die Kenntniß der Arten durch Annahme vieler Varietäten zu erleichtern glauben, lieber nur eine einzige Art von Stinkthier annehmen, die verschiedenen von den Schriftstellern beschriebenen, als Abänderung betrachten möchten. So nennt Desmarest alle zusammen Mephitis americana und zählt nun die bekannten einzeln als Varietäten auf. Wir geben hier zuerst die von früheren Schriftstellern schon bekannt gemachten Arten und fügen dann auf Tab. 75. die neuerlich durch Lichtenstein unterschiedenen hinzu.

286. 287. Der Chinche. Mephitis Chinche Tiedemann.

Amerik.: Chinga Molina's? — Franz.: Chinche Feuillée. Buff. — Engl.: Mephitis weesel Shaw. — Syn. Viverra Mephitis Erxleben. Lin. Viv. mephitica Shaw.

Kennzeichen der Art: Schwarz, Rücken breit weiß, durch schwarze Längslinie getheilt.

Ist 16″ lang, kurz und dick gebaut, der Schwanz hat einigen bläulichen Schiller, zwischen den Ohren beginnt das Weiß, zieht hinter den Ohren quer über den

Digitized by Google

Hinterkopf, von wo aus diese Farbe über den Rücken bis zu den Seiten in den Schwanz verläuft, der dann gleichfalls ganz weiß ist, oder mit schwarzen Haaren gemischt. Auch auf Schulter und Hüften zeigt sich ein weißer Fleck. Abb. 267. kann eine Abänderung seyn, an welcher die weißen Binden schmaler, auf den Hüften sogar unterbrochen sind, und nicht in den Schwanz übergehen, der deshalb schwärzlich bleibt. Lebt in Chili, Louisiana u. a. — Vergl. Nr. 602. —

288. **Das chilesische Stinkthier.** Mephitis chilensis Geoffr.

Franz.: Moufette du Chili Buffon.

Kennzeichen der Art: Braunschwarz, von einem fast dreieckigen weißen Querflecken des Hinterhauptes gehen zwei gleichfarbige Binden aus, welche nach der Mitte des Rückens spitzig zulaufend verschwinden, der Schwanz sehr langhaarig weiß, mit schwarzbraunen Haaren gemischt.

Wurde von Dombey aus Chili an das Pariser Museum gesendet. Die Länge beträgt 17 Zoll, Kopf 3 Zoll, Schwanz 7 Zoll.

289. **Der Mapurito.** Mephitis Mapurito Lesson.

Franz.: Le Mapourito.

Kennzeichen der Art: Schwarz, ein weißer Streif beginnt oberhalb der Stirn, läuft über die Seiten gerade aus, das Ohr ist sehr verkürzt und die Spitze des keulenförmigen Schwanzes weiß.

Dr. Mutis, Leibarzt bei dem Vicekönig zu Sante Fé in Mexico gab die erste Notiz über dies Stinkthier. Er beschreibt es folgendermaßen: Die Länge ist 20 Zoll, der Schwanz 9 Zoll. Die Farbe des ganzen Körpers ist reinschwarz (nigerrimus color), oben mit zwei weißen Streifen gezeichnet, welche auf der Stirn breiter sind und daselbst vereint beginnen, dann sich verschmälern und bis zur Mitte des Rückens auslaufen. Der Schwanz ist schwarz mit weißen Spitzen. Der Kopf ist klein, die Schnauze lang, platt und stumpf, mit kleinen, runden, dicht an einander stehenden Nasenlöchern nnd einer dreifachen Reihe kurzer Bartborsten. Maulöffnung ist klein, die Zunge glatt, die Augen in der Mitte zwischen Ohren und Nase, klein, schief gespalten, dunkelbraun, Ohrenmuschel fehlt fast, bildet nur einen etwas erhabenen Rand um den Gehörgang. Der Mapourito ist um die Bergwerke in Mexico häufig und gräbt tiefe Höhlen in die Erde. In der Nacht soll er schnell herumlaufen und schnüffelnd seine Nahrung suchen, die in Regenwürmern, Käfern u. a. Insekten besteht. Man sieht aus der Beschreibung, daß das Thier, welches Mutis beschreibt, einen kürzern Seitenstreif gehabt hat als das von uns abgebildete, welches sich im Pariser Museum befindet.

290. **Der Skunk.** Mephitis Putorius Tiedem.

Franz.: Le Polcat. — Engl.: the Polecat. — Syn- Putorius striatus Briss. Viverra striata Shaw Viverra Putorius Erxl.

Kennzeichen der Art: Schwärzlich mit 5 weißen Längsstreifen.

Größe eines Marders, der Kopf ist um die Backen breit, die Schnautze lang und dünn, Augen klein, Ohren klein und rundlich, Schwanz kürzer als Leib, Haare mäßig lang. Soll im nördlichen Amerika ziemlich häufig sein, lebt daselbst an öden und bewohnten Orten und kömmt in die Häuser, um seine Nahrung zu suchen, die in

Digitized by Google

Fleischwerk besteht, wo er vorzüglich junge Vögel tödtet und Eier aussäuft. Von Hunden angefallen zieht er sich zusammen, sträubt die Haare und verbreitet den diesen Thieren eigenthümlichen Gestank. Er gräbt und soll auch klettern, wirft seine Jungen in hohlen Bäumen und Erdhöhlen. Die Wilden sollen sein Fleisch genießen und aus dem Balge Tabaksbeutel machen.

Wir schließen hier die neuen Arten von der Supplementtafel 75 hier an.

600. **Das weißrückige Stinkthier.** Mephitis leuconota Lichtst.

Franz.: La Mouffette à dos blanc.

Kennzeichen der Art: Größe eines Fuchses, von langstreckigem Bau; rüsselartig vortretende, oben unbehaarte Schnauze; Haar wenig lang, glänzend schwarz, von der Stirn fängt mit spitzem Winkel ein weißer Streif an, der sich über den ganzen Rücken fortsetzt und auch die Oberseite und Spitze des Schwanzes einnimmt.

Die Länge beträgt 2', Schwanzruthe 1', Kopf bis zwischen die Ohren 4" 6"', der unbehaarte Nasenknorpel 1", Ohrrand 6"', Vorderbeine vom Ellenbogen bis zur Zehenspitze 4", Hinterbeine von der Ferse 2" 9"'. Vorderkrallen 1", Hinterkrallen 6"'. Breite des weißen Rückenstreifs in der Mitte 3". Es ist die größte bis jetzt bekannte Art, sie zeigt auch im Gebiß die meiste Annäherung an die Vielfraße. Hr. F. Deppe entdeckte sie in Brasilien im Jahre 1825 am obern Lauf des Rio Alvarado. Lichtst.

901. **Das halbweiße Stinkthier.** Mephitis mesoleuca Lichtst.

Franz.: La Mouffette demi-blanche.

Kennzeichen der Art: Größe einer Katze, von mehr gedrungenem Bau; Schnauze rüsselartig, oben nackt; Haar lang, glänzend schwarz; vom Hinterkopf fängt mit stumpfem Winkel ein auf dem Rücken gleichbreiter weißer Streif an, der sich über der Schwanzwurzel auf die Hälfte einengt, dann aber über den ganzen Schwanz ausbreitet.

Länge 1' 7", Schwanzruthe 11", Haare der Schwanzspitze 2", Kopf bis zwischen die Ohren 3", der unbehaarte Nasenknorpel 8"', Ohrrand 3"', Vorderbeine vom Ellenbogen bis zur Zehenspitze 4", Hinterbeine von der Ferse 2". Vorderkrallen 1", Hinterkrallen 5"'. Der weiße Rückenstreif ist 4" breit. Die Abbildung ist nach einem jüngern, im Ganzen nur 22 Zoll langen Thiere gemacht. Die gegebenen Maaße beziehen sich aber auf ein völlig ausgewachsenes, das nur um 5 Zoll kleiner ist als M. leuconota. Dieser Umstand verbietet ungeachtet aller Aehnlichkeit, beide Thiere für einer und derselben Art gehörig zu betrachten. Auch streitet manches Abweichende in den Verhältnissen dagegen. Beide Exemplare stammen aus der Gegend von Chico in Mexico. Lichtst.

602. **Der Chinga.** Mephitis Chinga Tiedem.

Franz.: La Mouffette Chinga.

Kennzeichen der Art: Größe eines Marders, von schmächtigem Bau; Schnauze wenig hervorragend, Haar lang, am Kopf, auf der Unterseite des Leibes, der Mitte des Hinterrückens und dem ganzen Schwanze glänzend schwarz; ein schmaler Streif auf dem Nasenrücken, der ganze Oberkopf, Oberrücken und die Seiten des Hintertheils bis über die Schwanzwurzel hinaus rein weiß.

Länge 1' 3"', Schwanzruthe 5", Haar an der Schwanzspitze 1" 9"', Kopf bis zwischen die Ohren 2" 8"', überragender Schnauzentheil im trocknen Zustand 3""

Digitized by Google

Ohrrand 3‴, Vorderbeine vom Ellenbogen bis Zehenspitze 2″ 6‴, Hinterbeine von der Ferse 2″, Vorderkrallen 6‴, Hinterkrallen 4‴. Breite des schwarzen Hinterrückenstreifes 1″ 8‴. — Dies ist die am frühesten bekannt gewordene, den Küstengegenden des gemäßigten Nordamerika am nächsten benachbarte Art, auf welche sich die meisten volksthümlichen, oft für andre gemißbrauchten Namen beziehen. Diese Art ist es auch wahrscheinlich, von welcher die Angaben über das Gebiß der Gattung Mephitis entlehnt sind, weshalb wir dasselbe bei den Kennzeichen derselben mit abbilden werden. Nur die beiden folgenden Arten gleichen dieser im Gebiß vollkommen. Lichtst. Also wohl dieselbe Art mit 286 und 287 doch aber mit einigen Unterschieden.

603. Das halbschwarze Stinkthier. Mephitis mesomelas Licht.

Franz.: La Mouffette demi-noire.

Kennzeichen der Art: Größe einer Katze, von schmächtigem Bau; Schnauze wenig vorragend, Haar lang, glänzend schwarz; ein schmaler Streif über Nasenrücken und Stirn, ein breiter, der gradlinig abgeschnitten im Nacken anfängt und sich bald in zwei schmälere theilt, die den schwarzen Mittelrücken nahe begleiten, sich auch auf den Seiten des Schwanzes in größerer Breite fortsetzen, sind rein weiß.

Länge 1′ 7″, Schwanzruthe 9″, Haare an der Schwanzspitze 2″ 8‴, Kopf bis zwischen die Ohren 3″, überragender Schnauzentheil 4‴, Ohrrand 4‴, Vorderbeine vom Ellenbogen bis Zehenspitze 3″ 4‴, Hinterbeine von der Ferse 2″, Vorderkrallen 5‴, Hinterkrallen 4‴, der schwarze Rückenstreif in der Mitte 3″ breit, der weiße Seitenstreif 1″ 2‴. Ein Exemplar im Berliner Museum, mit der Angabe, es stamme aus Louisiana. Lichtst.

604. Das langgeschwänzte Stinkthier. Mephitis macroura Lichtst.

Franz.: La Mouffette à queue longue.

Kennzeichen der Art: Größe eines Marders, von gestrecktem Bau, mit sehr langem Schwanz; Schnauze wenig hervorragend; Haar lang, glänzend schwarz; ein schmaler Streif über Nasenrücken und Stirn, ein breiterer, der geradlinig abgeschnitten im Nacken anfängt und sich in gleicher Breite, (doch nach hinten mit schwarzem Haar untermischt), über den Rücken und die Oberseite des Schwanzes fortsetzt, desgleichen ein schmaler Streif von der Schulter bis zum Kinn, und ein anderer vom Unterhalse hinab, rein weiß.

Länge 1′ 2″, Schwanzruthe 1′, Haare der Schwanzspitze 4″ 6‴, Kopf bis zwischen die Ohren 2″ 6‴, überragender Nasenknorpel (getrocknet) 2″, Ohrrand 5‴, Vorderbeine vom Ellenbogen bis Zehenspitze 2″ 8‴, Hinterbeine von der Ferse 1″ 9‴. Vorderkrallen 8‴, Hinterkrallen 4‴, der weiße Rückenstreif ist 1″ 4‴ breit, der weiße Seitenstreif 9‴ breit. Von dieser Art übersandte H. Deppe mehrere Exemplare aus den Gebirgsgegenden nordwestlich von der Stadt Mexico. Das Junge 605. in ganzer Länge kaum 1′ messend, zeigt die ganze Färbung des Alten und beweist, daß die Zeichnung zu den Artenkennzeichen dieser Gattung nothwendig mit zu Hülfe genommen werden muß. Lichtst.

606. 607. Das schleierstreifige Stinkthier. Mephitis vittata Lichtst.

Franz.: La Mouffette à bandes.

Kennzeichen der Art: Größe der vorigen, gestreckt, mit langem Schwanz; Schnauze wenig vorragend; Haar glänzend schwarz, ein schmaler Streif über Nasen-

Digitized by Google

rücken und Stirn, drei ähnliche in gleicher Höhe vom Nacken ausgehend, zwiſchen den Schultern aber wieder verſchwindend, ein breiter Seitenſtreif, der vom Halſe anfängt und ſich bis in die Mitte des Schwanzes immer ſchmäler fortſetzt, ſo wie endlich die Schwanzſpitze ſelbſt rein weiß.

Länge 1′ 4″, Schwanzruthe 1′, Haar der Schwanzſpitze 4″, Kopf bis zwiſchen die Ohren 2″ 6‴, überragender Naſenknorpel (getrocknet) 2″, Ohrrand 6‴, Vorderbeine vom Ellenbogen bis zur Zehenſpitze 3″, Hinterbeine von der Ferſe 1″ 10‴, Vorderkrallen 6‴, Hinterkrallen 4‴, der ſchwarze Raum zwiſchen den Seitenſtreifen 3″ 6‴, die weißen Seitenſtreifen 1″ breit. — Der Unterſchied dieſer Art von der vorigen liegt, außer den hier angegebenen Verhältniſſen, hauptſächlich darin, daß der weiße Seitenſtreif bei vittata ſich gerade da befindet, wo bei macroura der ſchwarze Streif liegt, alſo iſt die Zeichnung des Schwanzes bei beiden Arten die gerade entgegengeſetzte. — Auch hier zeigt das Junge 607 die Feſtigkeit dieſer Farbenvertheilung. Der Fundort dieſer Art ſind die ſüdweſtlichen Küſtenſtrecken Mexicos in der Gegend von San Matteo al Mar, an der Südſee. Lichtſt.

608. **Der Yagouarée.** Mephitis suffocans Illig.

Franz.: Le Yagouaré Azara.

Kennzeichen der Art: Größe eines Marders, von gedrungenerem Bau; Schnauze weit überragend, oben nackt; Haar röthlichſchwarz (fuchſig) ohne ſonderlichen Glanz, eine Binde über den Scheitel, und zu beiden Seiten ein ſehr ſchmaler Streif, der ſich neben dem Rücken hinzieht, rein weiß.

Länge 1′ 6″, Schwanzruthe 6″, Haar an der Schwanzſpitze 2″, Kopf bis zwiſchen die Ohren 3″, überragender Naſenknorpel 8‴, Ohrrand 1‴, Vorderbeine vom Ellenbogen bis Zehenſpitze 3″, Hinterbeine von der Ferſe 2″, Vorderkrallen 9‴, Hinterkrallen 4‴, Breite des weißen Seitenſtreifes 4‴. — Don Felix de Azara hat dieſe Art unter dem Namen Yaguaré vollſtändig genug beſchrieben; geringern Werth hat Büffons Beſchreibung ſeines Coase, in welchem man doch leicht dieſe Art wieder erkennt und aus der mancherlei Verwirrendes unter den Artikeln Viverra Quasje und Viv. Vulpecula in die Namen-Verzeichniſſe übertragen iſt. Es iſt bis jetzt die einzige Art von Stinkthieren, die wir aus Braſilien kennen, wo ſie in den waldigen Höhen nicht ſelten zu ſein ſcheint. An alten Exemplaren verſchwindet der weiße Streifen zuweilen theilweiſe oder ganz, und zwar in der hintern Hälfte zuerſt, was dem mürberen brüchigen Haar und dem Abreiben deſſelben beim Röhrenbau zuzuſchreiben ſein mag. Jüngere Individuen mit vollem Haarwuchs zeigen dagegen auch eine ſchmale Zeile weißen Haars, zu beiden Seiten des buſchigen Schwanzes. Offenbar hat dieſe Art nähere Verwandſchaft zu M. leuconota und mesoleuca als zu dem zuletzt beſchriebenen. Lichtſt.

291. **Der graue Ichneumon.** Herpestes griseus Desmar.

Franz.: Ichneumon gris Geoffr. Mangouste Nems Buff. Mang. du cap. Cuv — Engl.: Caffrarian weesel Shaw. the Caffrarian Ichneumon Griff. — Syn. Viverra grisea Thunb.? Viv. caffra Lin. Viv. Ichneumon β. Schreb. Ichneumon griseus Geoffr. Mangusta grisea Fisch. — Capiſcher Ichneumon Pall. Schreb.

Kennzeichen der Art: Blaß aſchgraulich, ſchwarz gemiſcht, unten weißlich; Kopf und Gliedmaßen dunkler, Schwanz zugeſpitzt.

Digitized by Google

Wird 13 bis 14 Zoll lang, der Schwanz, etwa einen Fuß. Die schmutzig weißen Haare haben gegen ihr Ende hin schmale, braune Ringe. Die Ichneumons hatte man früher mit unter die Gattung der Zibetthiere aufgenommen, sie ähneln ihnen wohl im Gebiß und in der Rauhheit ihrer Zunge, auch darin, daß ihre Krallen halbzurückziehbar sind, sie zeichnen sich aber durch ihre dünne Schnauze, Kürze ihrer Unterlippe und besonders durch den Mangel des jenen eigenthümlichen Zibetapparates aus, anstatt dessen bei ihnen nur eine einfache weite Tasche, ohne Absonderungsdrüsen vorhanden ist. Ihr Haar ist lang, etwas kraus, härtlich und zerbrechlich, bei allen mehr oder weniger bunt durch Abwechselung von hellen und dunklen Ringen. Ihre Zehen sind halbverwachsen. Die Lebensweise ist etwa die der Iltisse, Frettchen und Wiesel. Sie leben in Asien und Afrika, gern in der Nähe des Wassers und werden den menschlichen Besitzungen eben so wie bei uns jene Thiere durch ihre Räubereien nachtheilig, indem sie zur Nachtzeit die Höfe besuchen. Sie ziehen aber auch gegen Ratten und Mäuse zu Felde und werden dadurch im gezähmten Zustande sehr nützlich. Ihre Thätigkeit und Behendigkeit in Verfolgung dieser Thiere ist außerordentlich. Das abgebildete Exemplar lebte in der Menagerie am Tower in London und vermochte in einem Raume von sechzehn Quadratfuß in anderthalb Minuten ein Dutzend Ratten zu tödten. Das Thier wird außerordentlich zahm, schmiegt sich dann an die, die es pflegen und läuft ihnen nach wie ein Hund. Es lebt in Südafrika.

292. **Der egyptische Ichneumon.** Herpestes Ichneumon Illig.

Arab.: Nems, Aeksch. — Griech.: ὁ ἰχνευμων (Erdthier.) Herodot. Arist. Engl.: the Ichneumon. — Franz.: Mangouste d'Egypte Cuv. — Syn. Mustela aegyptiaca Klein. Viverra Ichneumon Lin. Ichn. Egyptiae Tiedem. Ichn. Pharaonis Geoffr. Herpestes Pharaonis Desmar. Mangusta Ichneumon Fisch. — Pharaonsmaus, Manguste

Kennzeichen der Art: Die Haare sind dunkel kastanienbraun und weißlich geringelt, Beine und Schnauze schwärzlichbraun, ein pinselförmiger Haarbüschel am Schwanze schwarz.

Das Exemplar vor mir ist 23 Zoll lang, der Schwanz 20 Zoll, die Haare auf dem Rücken sind 3″ lang und wechseln die genannten Farben sechsmal, so daß die Basis weißlich ist, dann das Braun mit Grau folgt und die Spitze braun ist. Die Ringe der weißlichen Farbe sind schmäler oder kürzer als die braunen. Das Weibchen hat nach Ehrenberg 6 Zitzen. — Das Thier ist ungeachtet seiner Größe sehr furchtsam, schleicht immer an Furchen und Vertiefungen umher, in welchen es sich leicht verbergen kann. Immer geht es schnüffelnd einher und hat eine treffliche Spur. Er ist übrigens ein sanftes Thier, hört gezähmt auf den Ruf seines Herrn und liebkost ihn. Seine Nahrung besteht aus Ratten, Schlangen, Vögeln und Eiern. Er lebt in Aegypten und zieht sich nach der Nilüberschwemmung in die Dörfer, wo er die Hühnerhöfe besucht. Hier aber mit Füchsen und Schakals zusammentreffend, wird er oft diesen zur Beute. In Saïd soll er an der Tupinambis einen Feind haben, welcher eine gleiche Lebensweise führt und sich an denselben Orten aufhält. Wenigstens haben dies Geoffroy und Desmoulin wieder erwähnt, dagegen erklärt es Ehrenberg wohl mit mehr Wahrscheinlichkeit, für eine Fabel der Alten. Er säuft alle Eier aus, die er findet, so auch die der Krokodile. Seine Angriffe auf dies Thier sind indessen Fabel der Alten. Die Verminderung der Krokodileier war namentlich die Veranlassung weshalb die Egyptier das Thier im Tempel verehrten. Aristoteles und Strabo glaubten,

Digitized by Google

das Thier sei blos in Egypten zu Hause, es ist auch wahrscheinlich, daß bei der großen Anzahl von Arten die man jetzt kennt, manche früher mit demselben Namen bezeichnete von ihm verschieden sind. — Im Pariser Museum ist das Thier nur 21 Zoll, der Schwanz 18 Zoll, man hat daselbst noch einen Ichneumon major, welcher um ein Sechstheil größer ist, dessen Haare rothgelb und kastanienbraun geringelt sind, so daß jene Farbe vorwaltet, der Schwanz ist aber länger als der Leib, zugespitzt, nach der Spitze hin dunkler. Es ist die größte Art der Gattung, man weiß aber nicht woher sie gekommen und vermuthet, daß sie noch von Sonnerat herstammt. — Obigen Ichneumon traf Ehrenberg in der Ebene von Benisuef bei der alten Stadt Heracleopolis häufig an und sahe ihn auch in Häusern gezähmt.

629. (Taf. 78) **Der numidische Ichneumon.** Herpestes numidicus Fr. Cuv.

Barbaresk.: Texerdea. — Franz.: Manguste d'Alger Fr. Cuv.

Kennzeichen der Art: Haare schwarz und rothgelb geringelt, Schwanzspitze schwarz.

Von der Größe des ägyptischen Ichneumons, aber von ihm unterschieden 1) durch einen weniger verlängerten Kopf, mit mehr gebogenem Vorderkopf. 2) Durch die angegebene Farbe der Haare. 3) Dadurch, daß der nackte Kreis um die Augen schmaler ist. Ein Pärchen dieser ganz neuen Art kam erst vor ein paar Jahren in die Menagerie nach Paris, welches sehr zärtlich beisammen lebt, so daß man sogar öfter die Paarung beobachtete, wobei das Weibchen wie eine Katze schrie. Sie schlafen um einandergerollt und sobald man sie trennt, legen sie durch ihre Unruhe das Verlangen an den Tag wieder beisammen zu sein. So scheint es, daß sie wohl auch in der freien Natur paarweise beisammen leben mögen, sie klettern sehr geschickt auf Bäume, was ihnen wahrscheinlich im wilden Zustande zur Aufsuchung der Vogelnester sehr zu statten kommt. Fr. Cuvier erhielt später auch ein ganz ähnliches Exemplar vom Senegal.

293. **Der Ichneumon von Malakka.** Herpetes malaccensis Fr. Cuv.

Franz.: Manguste de malacca Desmar.

Kennzeichen der Art: Schmuzig aschgrau, unten schwarz und weißlichgelb geringelt; Augenkreis, Ohren und Schnautzenspitze nackt etwas violet, Schwanz an der Basis dick, dem Leibe gleichfarbig, an der Spitze gelblich.

Wird 11 bis 15 Zoll lang, der Schwanz 10″ bis 1′. Die Rückenhaare sehe ich an unserm Exemplare 15 bis 16‴ lang, sie haben 5 schwarzbraune und 5 weit kürzere weißliche Ringe. Die Pupille ist horizontal länglich, die Nickhaut fehlt. Das Thier war auch hier lebendig, pflegte sich lang auszudehnen oder kurz zusammen zu ziehen und dann die dürren Haare zu sträuben. Es hatte wie alle Verwandte viel Sanftmuth gegen Menschen, war aber behend, wenn es galt ein kleines lebendes Thier zu fangen und sich zur Beute zu machen. Es lebt auf Malakka, bei Pondicherp.

294. 295. **Der weißschwänzige Ichneumon.** Herpestes leucurus H. E.

Arab. Dongolanisch: Nims. — Barbaresk.: Abu esen, Abu asn, Afaunga.

Kennzeichen der Art: Aschgraulich, über den Rücken schwärzlich, Nase blaß aschgrau, Beine (auch die Hinterbeine über der Pfotenwurzel) schwarzbraun, Schwanz bei den Alten weißlich, bei jungen Thieren nach dem Ende hin schwarz.

Digitized by Google

Erwachsen 1′ 7″ 7‴, Schwanzruthe 1′ 3‴, Haare der Schwanzspitze 3″ 3‴, Ohrrand 6‴, Vorderbeine vom Ellenbogen bis Krallenspitze 5″ 5‴, Hinterbeine vom Knie 8″, Vorder- und Hinterkrallen 6‴. Dieser Nims hat den Wuchs des Marders, die Iris ist gelb-ziegelroth, die Nasenknochen nicht gewölbt sondern platt. Die Nase selbst schwarz, die Nasenlöcher halbmondförmig. An den fünfzehigen Pfoten ist der Daumen kurz, gesondert, die Kralle aber an demselben vollkommen, die Sohlen lang, die hintere Hälfte behaart. Das Leibeshaar ist weicher und wolliger als das bei dem ägyptischen Ichneumon. Die längeren Haare sind alle zusammengedrückt und wellenbogig aschgrau, an der Spitze breit schwarz, daselbst steifer, in ihrer Mitte 3 bis 4, selten 5 mal gefleckt. Das ganze Wollhaar ist gekräuselt, fast einfarbig aschgrau. Die längsten Haare auf der Mitte des Schwanzes messen 2″ 9‴. Die Haare auf dem Hintertheile an der Basis des Schwanzes, bei dem ägyptischen Ichneumon außerordentlich lang, sind hier weit kürzer. Die Schnauze ist mit vielen Schnurren und Borsten umstellt. Die ächten Schnurren stehen auf der Oberlippe beiderseits etwa in vier Reihen und sind nach hinten gerichtet. Außerdem sind noch vier kleine Borstenbüschel vorhanden, einer auf den Schläfen, einer an der Kehle, einer über den Augen und der vierte auf den Wangen, nächst dem Maulwinkel. Nirgends sind die Borsten länger als einen Zoll, alle schwarzbraun und wenig auffallend. Bei dem Ichneumon scheinen die Schläfenborsten zu fehlen, die übrigen sind vorhanden, aber kleiner. Der Afterbeutel ist auch einfach und schließt in seinem Grunde den After selbst ein. Der Geruch ist nicht sehr stark und nicht sehr wiedrig. Gereizt wird das Thier bös und beißt auch Menschen. In diesem Zustande richten sich die Schwanzhaare auf, so daß man den Schwanz dann mit einem Equisetum oder Schachtelhalm vergleichen kann. Auf den Zungenwarzen stehen halbcylindrische, abgestutzte, hornartige Plättchen, welche hart und $\frac{1}{3}$‴ lang sind. Das Weibchen gleicht dem Männchen in Färbung und Größe, Es hat 4 Bauchzitzen. Ein Junges von 10″ Länge unterschied sich nur durch die Farbe des Schwanzes, wie oben erwähnt. Die Ohren erschienen breiter, denn sie waren schon so groß wie bei den Alten. Hemprich und Ehrenberg, die Entdecker dieser Art, erlegten in Dongola bei Embukohl drei Exemplare. Zwölftausend Schritte vom Nil hatten sie sich Höhlen gegraben und man fand in ihrem Kothe die Ueberbleibsel von Käfern. Doch verschmähen sie sicherlich auch die Nahrung nicht, welche die andern Arten lieben. In der Wüste besteht ihre Speise außer den Käfern (Pimelien) auch aus Feldmäusen (Meriones) und aus Flughühnern (Pterocles), seltener mögen sie Straußeneier genießen. Ehrenberg zweifelt, daß der Nims aus so großer Entfernung zum Nil gehen und Krokodileier aufsuchen sollte. Gezähmt traf er diese Art nicht an.

296. Der javanische Ichneumon. Herpestes javanicus Desm.

Javan.: Gagarangan. — Franz.: Mangouste de Java. — Syn. Serpenticidas. Moncus Rumph. — Mustela glauca Linn. amoen.? Viv. Manguste Zimmerm. V. indica β. Lin. Ichneum. javanicus Geoffr. Mang. javanica Horsf.

Kennzeichen der Art: Braun-schwärzlich, die Haare mit röthlichbraun wechselsweis geringelt, Kopf, Rücken und Beine dunkler; Schwanz verdünnt.

Diese Art steht ausgestopft vor mir, sie ist nur 10 Zoll lang, der Schwanz 8 Zoll, die Haare an den dunkeln Stellen sind einfarbig schwarzbraun, nicht geringelt. Mr. Diard

Digitized by Google

brachte ſie von ſeiner Reiſe die er mit Duvaucel zur Unterſuchung von Sumatra anſtellte lebendig mit. Sie iſt ſo zahm wie eine Hauskatze und läßt ſich ſehr gern liebkoſen. Man findet ſie nicht nur auf Java ſondern auch in einem großen Theile von Oſtindien.

297. Der Mungo. Herpestes Mungo Desmar.

Malabar.: Chiri, Chiré, Kirpelé. — Bengal.: sunsa. — Cedloneſ.: Quil, Quilspele. — Perſ.: Kurma. — Portug. und Ind.: Mungo. — Franz.: Le Moungo, Mangouste l'Inde Buff. Mangouste à bandes Fr. Cuv. — Syn. Viv. Mungo Kämpf. Viv. Ichneumon Schreb. Herp. fasciatus Desmar. Mangusta Mungo Fisch.

Kennz. der Art. Dunkelbräunlich mit 12 bis 13 ſchwarzbraunen Querbinden über den Rücken, mit ebenſo vielen röthlichen wechſelnd.

Wuchs des Iltis. Nur 9 bis 10 Zoll lang, der Schwanz 7 Zoll, nicht buſchig, ſondern kurzhaariger als bei andern, faſt wie der des Känguruh, die Kehle röthlichgelb, Pfoten und Schwanz dunkelbraun, ſchwärzlich. Kämpfer nnd P. Vincent-Marie berichten, daß der Mangue die Schlangen unabläſſig verfolgt, er lebt in Indien und auf den Sundiſchen Inſeln. — Pallas beſchreibt ſeinen Mungo folgendermaßen. Größer und faſt ſchlanker als der Iltis. Um das Maul roſtgelb; übrigens iſt der ganze Körper eigentlich dunkel roſtgelb, aber wegen der längern, ſchwarz und weißen Haare zierlich grau melirt. Das Ende der Beine und des Schwanzes iſt ſchwarz, dieſer dick, nach dem Ende hin verdünnt. Die Vorderzähne ausgeſchweift, beiderſeits der äußerſte etwas größer, kegelförmig. An den Vorderpfoten die beiden Mittelzehen größer, der Daumen kurz. Hinter den Geburtstheilen findet ſich ein Beutel mit ſchmieriger Feuchtigkeit. Im ſüdlichen Perſien, leicht zähmbar, wird in den Provinzen am kaſpiſchen Meere und Georgien als Hausthier gehalten und über Aſtrachan, bis nach St. Petersburg gebracht. Man hält das Thier in den Zimmern, es iſt ſehr nett und reinlich und fängt nicht nur Mäuſe und tödtet mit Leichtigkeit Wanderratten, ſondern fürchtet ſich auch nicht vor Schlangen. Es bewegt ſich überaus behende, und zwängt ſich in die engſten Räume hinein. Es ſchlürft gern Eier aus, leckend, wie es ſäuft. Wenn man es böſe macht, ſo läßt es ein anhaltendes Knurren hören. Pallas entſcheidet nach dem Originale welches zur Zeichnung diente, daß Ichneumon s. vulpecula ceylanica Seba thes. I. t. 41. hierher gehört.

298. Der Vanſire. Herpestes Galera Desmar.

Madagaſk. Vohang Shira. — Franz.: Vansire, Mylace Fr. Cuv. — Engl.: Guinea weesel, Madagascar weesel Pennant. the Guinea fox Brown. the Galera Griff. — Syn. Viverra Galera Shaw. Ichneumon Galera Geoffr. Mustela Galera Erxleb. Mangusta Galera Fisch. Aulax Galera Fr. Cuv.

Kennz. der Art. Ohne Taſche, Zehen unverwachſen (eigne Gruppe: Atilax), geſättigt dunkelbraun, gelblich punktirt, Schwanz verdünnt, gleichförmig dicht behaart.

Das vor mir ſtehende Thier iſt 21 Zoll lang, der Schwanz 11 Zoll. Außerdem beſchreibt man es kleiner, nur 1 Fuß lang und den Schwanz 7 Zoll, Fr. Cuvier ſein Thier 18″, der Schwanz 12″, die mittlere Höhe 8″. Das Thier iſt ſelten und noch wenig bekannt. Buffon beſchrieb ein Fell Geoffroi ſpricht blos vergleichend von dieſem Thiere und den Ichneumons und Mardern, in der That iſt aber die Aehnlichkeit mit den übrigen Ichneumons ſo groß als die dieſer Arten unter ſich ſelbſt. Dauventon giebt an, daß der Vanſire weniger Backenzähne habe als die Ichneu-

Digitized by Google

mons und Geoffroi findet die Hirnschale im Verhältniß zu der jener Thiere mehr aufgetrieben und breiter. Das Wollhaar ist dick, braun, das Seidenhaar im Vergleich mit dem der vorigen weniger zahlreich und ganz schwarz, nur um die Schnauze und den Hals mit einem weißen oder braunen Endringe. Die Unternase, die Lippen und der Augenring ist fleischfarbig, das Auge hell kastanienbraun. Es ist bedeutungsvoll daß auch dieses Thier auf Madagaskar, in jenem Wunderlande lebt, welches die Uebergangsformen der afrikanischen Natur hervorbringt.

630. (Taf. 78.) Steadman's Hundsfrett. Cynictis Steadmanni Ogilby.

Franz.: Le Cynicte de Steadmann, Mangouste rouge. — Engl.: Cynictis W. Ogilby, on the zoological characters and description of a new genus of Carnivora called — Linnean or zoological Transact. 1833.

Kennz. der Art. Man kennt nur eine Art, diese ist Herpestes ruber Desmarest. Ichneumon ruber Geoffr.

Das kleine Thier stellt eine Gattung als Bindeglied zwischen die Civetten und Hunde von der einen hat es die Organe der Ernährung (of mastication) von der andern die der Bewegung und fällt mit Proteles als zweites Mittelgenus dazwischen. Cynictis steht zwischen Hund und Ichneumon, mit letzterem hat es große Aehnlichkeit in der äußern Gestaltung, der Name mag darauf hindeuten, die Beine sind hoch, vollkommen zehenläufig, die Zehen lang, vollkommen getrennt, die Klauen lang, krumm, mäßig scharf, wie bei Herpestes und Rhyzaena. Kopf und Leib ähneln ebenfalls, in Hinsicht auf die Zehen steht aber Cynictis in der Mitte zwischen beiden, denn sie hat 5zehige Vorder- und 4zehige Hinterpfoten, wie dies nur bei Proteles unter den ähnlichen Gattungen wieder vorkömmt. Der Daumen der Vorderpfoten steht weit höher als die andern Zehen, so daß er wie bei den Hunden den Boden nicht berührt. Die hintere Ferse steht sehr hoch und ist so wie die Mittelpfote (metatarsus) ganz behaart, und die Zehenballen sind nackt und schwarz. Dieser Theil des Fußes erscheint in kleine Höckerchen getheilt und eins findet sich innerseits am Vorderfuß, beträchtlich höher als die andern und bei dem gewöhnlichen Laufen den Boden nicht berührend, wahrscheinlich wie bei Hunden und Katzen u. a. im Springen und in heftigen Bewegungen durch seine Elasticität den Druck abwendend. Die Klauen sind an der Basis sehr zusammengedrückt, nach der Spitze hin breiter werdend und löffelartig ausgehöhlt. Im Gebiß ähnelt sie am meisten den Civetten.

38 Zähne
- 20 oben
  - 6 Schneidezähne
  - 2 Hundszähne
  - 12 Backzähne
    - 6 falsche
    - 2 Reißzähne
    - 4 Höckerzähne (tuberculoses).
- 18 unten
  - 6 Schneidezähne
  - 2 Hundszähne
  - 10 Backzähne
    - 6 falsche
    - 2 Reißzähne
    - 2 Höckerzähne.

Dies kommt am meisten überein mit den Viveren im Allgemeinen und mit Herpestes insbesondere, mit dem Unterschiede, daß bei Cynictis der unausgebildete falsche Backzahn der untern Kinnlade fehlt, und der in der Oberkinnlade den Hundszahn berührt. Herpestes hat unausgebildete falsche Backzähne in beiden Kinnladen und 5 Zehen an allen Pfoten.

Digitized by Google

Der Wuchs unterscheidet die Gattung von allen Verwandten. Der Kopf ist kurz, gegen die Augen hin verschmälert, zusammengezogene Stirn, kleine nackte Schnautze durch eine Furche getheilt. Die Ohren sind kurz, elliptisch, innerseits nackt, vorwärts gerichtet, der Leib lang, schlank, der Schwanz buschig, zwei Drittel der Körperlänge messend der ganze Habitus dem eines Ichneumon nicht unähnlich. Die Schläfengruben trennt ein deutlicher Knochenrand von den Augenhöhlen.

Leibeslänge 1′ 6″ — Schwanz 1′ — Kopf bis zum Ohr 2½ — Ohr ¾ — Dessen Breite 1¾ — Schulterhöhe 7 — Kreuzhöhe 7½ engl. Zoll.

Das Haar ist fein fast wie Hundshaar, glatt und dicht, nur am Schwanze buschig, überall fuchsfarbig, Kopf und Gliedmaßen so wie der Rücken dunkler, auf den Backen, im Nacken, an den Seiten und am Schwanze durch die grauen Haarspitzen silbergraulich melirt. Brust, Bauch und Beine einfarbig fuchsroth. Die Schwanzspitze ist zwei Zoll lang weiß, die Leibeshaare sind nicht geringelt wie bei Herpestes und Suricate, auch feiner, mehr pelzartig. Das Thier steht höher auf den Beinen als ein Ichneumon und ist weit bestimmter zehenläufig, der Kopf kürzer und weniger spitz.

Das Exemplar kam aus der Gegend von Uytenhagen an der Gränze des Caffernlandes.

Sparmann scheint vol. II. p. 184 (engl. edit.) das Thier zu erwähnen, er sahe es am Fish river ohne es zu bekommen. Auch in Barrows travels vol. I. p. 185. kommt es vor bei Comdebo an der Ostgränze der Cap-Colonie. Die Colonisten nannten es Meer-kat, ein Name den sie aber auf ziemlich viele Thiere anwenden.

299. **Der Mango, Mangue.** Crossarchus obscurus F. Cuv.

Franz.: le Mangue.

Kennz. der Art. Nur eine wirkliche Art dieser Mittelgattung zwischen Ichneumon und Surikate.

Länge 1′, Schwanz 7″, Kopf 3″ 6‴, mittlere Höhe 5″. Im Wuchs und Ansehn den Ichneumons sehr ähnlich, doch ziemlich untersetzten Baues, der Kopf mehr gerundet, die Schnautze länger, dadurch der Surikate ähnlicher, auch so wie diese auf die Sohle auftretend, und mit ähnlicher Aftertasche versehen, aber die Zehen, Nägel und Geburtstheile wie bei den Ichneumonen. Das Gebiß hat die Zahl der Zähne wie bei der Surikate: 6 Vorderzähne, 2 Eckzähne, 10 Backzähne in jeder Kinnlade, die Form derselben ist ganz die wie bei den Ichneumonen. Der Schwanz ist an der Seite zusammengedrückt, weniger lang als bei den Ichneumons, das Thier trägt ihn nie schleppend sondern nach unten gekrümmt. Die Augen haben eine runde Pupille und eine Nikhaut. Die Nase ist über einen halben Zoll rüsselartig über die Kinnladen verlängert und sehr beweglich, trägt an ihrem Ende die Nasenlöcher, welche einigermaßen denen der Hunde ähneln. Die Ohren sind klein, abgerundet und ausgezeichnet durch zwei Läppchen, wie Plättchen welche in der Mitte der Ohrmuschel hervortreten und daselbst übereinanderliegen. Die Zunge hat auf ihrer Mitte hornartige Wärzchen, an den Rändern ist sie glatt; sie ist frei ausstreckbar und einer bedeutenden Verlängerung fähig. Beide Haarkleider sind ziemlich grob, das Wollhaar häufig, das Seidenhaar weit länger, bedeckt jenes fast ganz, ist zum Theil 8‴ lang. Der Schwanz scheint nur oben und unten damit besetzt, von den Seiten aus sind die Haare abgewendet, vielleicht weil das Thier sich so legt, daß es ihn von der Seite drückt. Das Leibeshaar ist übrigens struppig, was man sonst nur bei kran-

Digitized by Google

ken Thieren bemerkt. Hier iſt es eine Eigenheit im geſunden Zuſtande. Der After liegt unten in der Taſche, welche dem Schwanze nahe iſt, ſie hat eine Art Schließmuskel ſo daß man gewöhnlich nur den After zu ſehen glaubt, öffnet man ſie, ſo zeigt ſie ſich faſt wie eine Erdbeere und entfaltet ſich dann zu einem bedeutenden Umfange. Sie ſondert eine ſtinkende Salbe ab, von welcher das Thier durch Reiben ſich entledigt. — Das zierliche Thier lebte in der Menagerie am Pflanzengarten in Paris, war zahm wie ein Hund und empfing die Liebkoſungen dankbar. Es hielt ſich ſehr reinlich, kämmte und ordnete oft ſein Haar und hielt ſich ein beſonders reinliches Schlafplätzchen. In einem beſondern Winkel ſetzte es immer ſeine Ausleerungen ab. Es fraß Fleiſch. Man hatte es aus Weſtafrika erhalten, wahrſcheinlich ſüdlich von Gambia aus. Man behielt den Namen bei den ihm die Matroſen gegeben hatten.

300. **Der Coaſe.** Crossarchus? Coase.

Franz.: Le Coase Ruff. — Syn. Ryzaena? Coase Fisch.

Eins von den zweifelhaften Thieren Buffons und Schrebers. Es wird beſchrieben 16 Zoll lang, der Kopf iſt lang, hinten breit, vorn in eine ſpitzige mit hervorragender Naſe verſehene Schnauze verdünnt, der Leib lang, ausſtreck- und zuſammenziehbar, Ohren kurz, rundlich an den Kopf angedrückt, Schwanz kurz, Beine niedrig, auf den Ferſen auftretend, Vorderpfoten mit 4, Hinterpfoten mit 5 Zehen. Die Farbe iſt ein ſehr glänzendes, dunkles Caſtanienbraun, welches auf dem Kopfe mit grau vermiſcht iſt. Die Bartborſten ſind ſchwarz. — Schreber ſetzte das Thier aus Virginien gewiß fälſchlich mit dem mexikaniſchen Yzquiepatl zuſammen. Die wahrſcheinlichſte Anſicht ſcheint mir die, daß jenes wohl zu Mustela vison 325. und dieſes zu Mephitis suffocans 608. gehöre.

301—303. **Der Zenik, Surikate.** Ryzaena Zenik (L. Gm.)

Afrik.: Zenik Sonnerat. — Franz.: Suricate Buff. — Engl.: the Surikate Griff. — Syn. Viverra tetradactyla Pall. Viv. Suricatta Erxleb. Viv. Zenic L. Gmel. Suricata capensis et S. viverrina Desmar. Ryzaena capensis Lesson. Ryz. Suricata Fisch. — Der vierzehige Rüſſelträger Schreb. — Ryzaena Illiger.

Kennz. der Art: Nur eine in der Gattung, welche ſich durch vierzehige Pfoten aller Beine vorzüglich auszeichnet.

Wird 1′ lang, der Schwanz 6″, nach Leſſon iſt das ganze Thier nebſt Schwanz 3′ 10″ lang. Man kannte das Thier bis auf die neueſte Zeit wenig, und nur erſt dann wurde es möglich ein Exemplar welches die Menagerie am Pflanzengarten in Paris durch Baron Des Ecotais erhielt, lebendig zu beobachten. Man mag den Zenik im Aeßern etwa mit Iltis und Frettchen vergleichen, dann ſteht er auch den Ichneumons nahe. Illiger ſtellte zuerſt in ſeinem Prodromus p. 134 die Gattung Ryzaena: Schnarrthier (von ρυζειν, hirrire, knurren, murren, wie ein Hund) auf. Das Gebiß hat 36 Zähne, in jeder Kinnlade 6 Schneidezähne, 2 Eckzähne und 10 Backenzähne, von denen die beiden erſten falſche, der erſte der kleinſte iſt. Die Zunge hat hornartige Wärzchen, der Rüſſel iſt ſpitzig, die Ohren klein und abgerundet, die Krallen ſind lang und gekrümmt. Eine Taſche findet ſich faſt wie die der Ichneumons in der Nähe des Afters, der Schwanz läuft ſpitz zu, das Haar iſt hell und dunkel geringelt, ſo erſcheint das Fell weiß, gelblich, bräunlich und ſchwarz gemiſcht. Die Untenſeite iſt nebſt den Beinen gelblich, der Schwanz an der Spitze ſchwärzlich, Naſe, Augenkreis und Ohren, ſo auch

Digitized by Google

der Vorderkopf bräunlich. Der Zenik lebt in Südafrika von kleinen Thieren und Eiern, sein Urin ist sehr übelriechend. Die Pfoten treten fast mit der ganzen Sohle auf, das Thier kann sich auch auf den Hinterbeinen aufrecht halten, und thut dies bisweilen um in die Ferne zu lauschen, oder wenn es Nahrung in den Vorderbeinen trägt. Sein Geruch ist wahrscheinlich der bei ihm am meisten ausgebildete Sinn, es schnüffelt in alle Spalten und Winkel, findet es etwas auffallendes so wird es mit der Vorderpfote gefaßt, immer wieder herumgedreht und berochen und dann nach Befinden verzehrt. Es nimmt Würmer, Insecten u. a. kleine Thiere an, auch süße Früchte, obwohl es diesen die animalische Nahrung vorzieht. Es säuft leckend, sehr gern Milch. Es leidet nicht vom Lichte, sieht aber auch in der Nacht. Das Gehör scheint nicht bedeutend, das Gehirn ist aber bedeutend entwickelt und die Zähmbarkeit des Thiers groß. Es findet sich sehr leicht in seine Verhältnisse und weiß in wie weit es diesen zu vertrauen hat. Es läuft wie eine Katze im Hause herum in dem es wohnt und verläuft sich nicht, es ist empfänglich für Zuneigung und Haß, kennt die Personen die es pflegen, zeigt Anhänglichkeit an sie und läßt sich gern von ihnen liebkosen. Wer ihm aber Leid zufügte den merkt es sich wohl und rächt sich so oft es kann. Abb. 301 stellt das junge Thier der Pariser Menagerie dar, welches nur 10″ 3‴ lang war, der Schwanz 7″ 1‴, der Kopf 3″, Schulterhöhe 6″ 1‴, Kreuzhöhe 6″ 4‴, 302 ist Büffon's Abbildung und 303 ist die von Sonnerat, wahrscheinlich nach einem ganz alten, vollkommen ausgefärbten Exemplar.

626. Der wilde Kleinbeutler. Cryptoprocta ferox Bennet.

Franz.: La Cryptoprocte feroce. — Engl.: Notice of a Mammiferous animal from Madagascar, constituting a New Form among the Viverridous Carnivora. By E. T. Bennet Esq. zool. transact. p. 137.

Kennz. der Art. Nur eine bekannt.

Mr. Telfair, Präsident der naturforschenden Gesellschaft auf Mauritius sendete das Thier nach Madagaskar. Die Cryptoprocta hat die rauhe Katzenzunge, die 2 höckrigen Backenzähne in der Oberkinnlade und die übrigen Kennzeichen, durch welche sich die Civetten einerseits von den Katzen, andernseits von den Hunden unterscheiden. Die Krallen sind an allen Pfoten zurückziehbar, an den Vorderbeinen scharf an der Spitze und den Schneiden. Sie kommt darin mit Paradoxurus überein, auch sind die Sohlen nackt und die Zehen meist bis gegen ihr Ende mit Verbindungshaut versehen. Von Paradoxurus unterscheidet sie sich aber durch ihr kurzes, glattes, angedrücktes Haar, wodurch sie ein ganz andres Ansehn erhält. Der dünne, walzige Schwanz ist rund herum gleichmäßig behaart, kann sich also wahrscheinlich nicht so rollen, wie der jener Gattung. Auch findet sich ein rundlicher Beutel am After, welcher dieser Gattung fehlt. Der Beutel mißt einen halben Zoll und hat einen mäßig starken Geruch. Mit seinem Hinterrande steht er weiter vom After ab als mit dem vordern, und die andere Kante verbindet sich mit dem After.

Der Leib ist schlank, die Beine robust und mittelmäßig lang, der Kopf etwas länglich, die drüsige Schnauze klein, die Augenbrauen mit dunklen Seitenbogen, die Schnurren zahlreich und steif, die längsten länger als der Kopf; Augen ziemlich klein, über dem Maulwinkel; Ohren sehr breit, abgerundet, am Hinterrande eine Falte, dabei eine oder ein paar Buchten, auch innerseits bis an den Gehörgang behaart; der Nacken schlank, Vor-

Digitized by Google

derbeine etwas länger als die Hintern; Schwanz so lang als Leib, scheint an der Spitze verletzt, reicht rückwärts gelegt bis zu den Ohren, ist vollkommen walzig und gleichartig behaart. Die Sohlen der Vorderpfoten sind nackt, bis zur Pfotenwurzel, an den Hinterpfoten nur bis zur Ferse. Jede Pfote trägt 5 zurückziehbare Krallen, die vordern sind spitzig und scharfkantig, zusammengedrückt, gekrümmt, kurz und denen der Katzen ähnlich, die hintern sind breiter, zusammengedrückt, wenig gebogen und stumpf. Die Zehen sind bis gegen die Spitzen verbunden, vorn ist die mittelste am längsten, die beiden seitlichen sind wieder ziemlich gleich und wenig kürzer, die äußersten noch kürzer, auch einander ziemlich gleich; hinten ist die dritte und vierte Zehe ziemlich gleich und etwas länger als die zweite und fünfte, der Daumen beträchtlich kürzer.

Die Färbung der ganzen Ober- und Unterseite ist lichtbräunlichroth, dies entsteht aus einer Mischung von braun und strohgelb, mit welcher Farbe die Haare schmaler oder breiter geringelt sind; Bauch und Zwischenfelder der Beine sind weniger dunkel, da die Haare hier mehr einfarbig sind. Die Haare sind kurz, glatt, leicht gekräuselt, und fühlen sich sanft an; am Leibe und Schwanze $\frac{3}{4}$ bis 1 Zoll lang, nach dem Kopfe und den Gliedmaßen hin kürzer. Die Schnurren sind schwarz an der Basis und werden heller nach der Spitze. An der Basis der Ohren ist außen das Haar länger und etwas dunkler, aber kürzer und dünner an der Spitze. Der Vordertheil der Innenfläche hat einen Büschel längerer Haare.

Körperlänge $13\frac{5}{10}$ Zoll engl. Maas. Schwanz (verstümmelt?) $11\frac{5}{10}$. Kopf $3\frac{3}{10}$. Größte Schnurren. $3\frac{5}{10}$. Ohr $1\frac{8}{10}$. Dessen Breite $1\frac{4}{10}$. Kopf zwischen der Ohrbasis $1\frac{7}{10}$. Nacken $2\frac{3}{10}$. Oberarm (arm) 2. Vorderarm (fore-arm) $2\frac{3}{10}$. Vorderpfote bis zur Mittelklaue $1\frac{7}{10}$. Schenkel $2\frac{6}{10}$. Bein (Lauf) $2\frac{7}{10}$. Hinterpfote bis zur Mittelklaue $2\frac{5}{10}$.

Im innern Bau kömmt er sehr mit den Katzen überein. Die Zähne waren bei den untersuchten Individuen nur ausfallende, folglich nicht geeignet zu bleibenden Kennzeichen. Oben: 6 Schneidezähne, die vier mittlern klein, ihre Kronen inwendig flach und etwas quer eingedrückt, die äußersten breiter und sehen außen den Spitzzähnen ähnlich, sie haben nach innen Fortsätze; die Spitzzähne stehen von ihnen ab und ragen über jene hinaus, sie sind nach hinten gekrümmt. Gleich neben ihnen folgen zwei falsche Backzähne, der erste ziemlich walzig, mit einem kleinen Fortsatze nach außen und hinten, der zweite hat eine schlanke längliche Krone und zwei Wurzeln. Ein Raum von der Länge des zweiten Backzahnes folgt nun vor dem dritten welcher breit ist und drei längs gestellte Spitzhöker hat; der vordere derselben hat hinten einen kleinen Fortsatz, der zweite doppelt so lang als der vorige, ist einfach und etwas nach hinten gerichtet, der dritte bildet einen Querhügel, sein Mittelhöker ist an der Basis etwas nach innen verlängert aber ohne Fortsatz. Der vierte Backzahn legt sich an den dritten und ist unregelmäßig dreieckig, sein äußerer und breitester Theil ist flach, der innerste kleiner und beträchtlich niedriger in der Krone. Hinter ihm ist eine Höhle im Kinnbacken, worin wahrscheinlich die Anlage zu einem fünften oder zweiten Hökerbackzahne. In der Unterkinnlade sind die 6 Schneidezähne ziemlich gleichlang, die äußern derselben spitzig. Die Spitzzähne schließen sich an, sie sind mehr als doppelt so lang, unten stark und breit, nach oben verschmälert und etwas rückwärts gekrümmt. Es folgen zwei falsche Backzähne dicht aneinander, denen des Oberkiefers ähnlich und nur durch kleine Lücken von den Spitzzähnen vorn und vom dritten Back-

Digitized by Google

zahne hinten getrennt. Dieser dritte ist vierspitzig. Die Spitzhöker stehen längs, der erste ist klein und kurz, wenig höher als der zweite falsche Backzahn, der zweite stärker und doppelt so lang als der erste, der dritte stimmt wieder mit dem ersten überein und ist durch eine Kerbe vom vierten getrennt, welcher klein und niedriger ist. Der vierte Backzahn hat auch 4 scharfe Höker, die beiden ersten sind stark und schneidend, der zweite ist der breiteste und hat hinter sich und etwas nach innen den dritten, welcher klein und spitz ist; der vierte gleicht dem vierten Höker des dritten Backzahnes. Eine Verdickung der Knochen hinter diesem Zahne läßt einen fünften eingeschlossenen vermuthen.

Telfair erhielt das Thier aus den innern südlichen Gegenden der Insel Madagaskar, auf Mauritius hatte es noch niemand gesehen. Er sagt es sey das wildeste Thier welches in dieser Größe existire, seine Bewegungen und Kraftäußerungen sind die eines Tigers, und es ist eben so blutdürstig und zerstörungssüchtig als dieser. Seine Muskelkraft war groß, die Muskeln der Beine vorzüglich voll und dick. Er hatte es einige Monate lebendig. Bennet glaubt noch es könne dies Thier mit Paradoxurus aureus *Cuv.* — vgl. unser Abb. 627. — einerlei seyn, dieser habe nur den Beutel übersehen. Mem. mus. IX. p. 46. t. 4. Fig. inf. Farbe, Gestalt und Verhältnisse scheinen dieselben. Cuviers Thier war jung, doch findet sich ein noch jüngeres im Museum der Zoological Societ.

304—306. **Das Rollschwanzthier.** Paradoxurus Typus Fr. Cuv.

Malabar.: Pounougou-Pouné. — Franz.: Pougouné, la martre des palmiers. — Engl.: the Paradoxurus. — Syn. Viverra Genetta, Musang. Sapulut Raffles. Genette du Cap de bonne espérance Buff. suppl. VII. pl. 58. Genette de France Buff. Viverra nigra Desmar. Viverra paradoxura Less. — Palmenmarder.

Kennz. der Art: Fell schwarz und graugemischt, über den Rücken undeutliche Streifen, so wie die Beine und der Schwanz schwarz, eine Binde von der Stirn über die Ohren schief zu den Halsseiten herabsteigend weißlich.

Länge 1′ 7″, Schwanz 1′ 5″. Diese Gattung tritt ein als Mittelglied zwischen die Viverren und die Sohlenläufer, sie ist schon eine sohlenlaufende Viverre, mit 5 verbundenen Zehen und zurückziehbaren Krallen, noch ausgezeichnet durch den sich rollenden Spiralschwanz. Die Kinnladen haben 6 Schneidezähne, 4 Eckzähne und zwölf Backenzähne. Oben allemal 4 und unten allemal 2 Hökerzähne. Die Pupille ist vertikal, das Auge hat eine Nickhaut. Die Nase ist durch eine Furche gespalten, das Ohr ist rundlich, am Hinterrande tief ausgeschweift und mit einem breiten, freien Läppchen. Eine Aftertasche ist hier nicht vorhanden. Die Zunge ist lang und schmal, hat hornartige Wärzchen die an ihrer Basis kuglig sind, an ihrer Spitze dünn und hakig. Dazwischen rundliche Höcker mit feiner Haut überzogen, hinten mit 5 kelchförmigen Drüsen. Das Ohr ist inwendig mit sehr complicirten Hökerchen besetzt und die Oeffnung des Gehörganges mit einer Art von Klappen verschlossen. Das Weibchen trägt jederseits 3 Zitzen, zusammen 2 an der Brust, 4 am Bauche. Das nächtliche Thier hat eine ähnliche Behaarung wie die Genetten, Woll- und Seidenhaar, nebst 2″, 7‴ langen Schnurren. Die Nasenlöcher sind sehr gebogen, die Nase schwarz, über den Augenliedern ein weißer Fleck. Ich habe ein hellgraues Exemplar vor mir, in der Farbe der Viverra Rasse ähnlich und ein paar weit dunklere, welche über den Rücken ganz schwarz sind. Das Vaterland gab Buffon falsch an, man weiß jetzt daß diese Thiergattung nur Indien angehört, die beschriebene Art erhalten wir aus Java, Malacca, von der Küste Coromandel und Malabar. Leschenault brachte sie aus Pondichery. Eine Art in Su-

Digitized by Google

matra: der Musang Bulan der Malayen, Viverra Musanga Raffles ist wahrscheinlich verschieden. Ogilby beschrieb einen Parad. leucopus der aber eine Bisamfalte hat, also vielleicht nicht in diese Gattung gehört. Das Rollschwanzthier zeigte sich in der Menagerie am Tower immer knurrig und leicht erzürnend, ohne Zuneigung zu dem Wärter, überhaupt ohne Empfänglichkeit für alle Aufmerksamkeiten die man ihm bewies. Das Thier in der Pariser Menagerie schlief den ganzen Tag über zusammengerollt. Nur mit großer Mühe ließ es sich aus diesem festen Schlafe wecken, außerdem erwachte es gegen Abend, trank und fraß und begab sich wieder zur Schlafstelle, welche es sehr reinlich hielt. Es ging langsam, nahm von nichts Notiz und ließ außer einem dumpfen Knurren keine andre Stimme hören. Bei seiner Faulheit wurde das Thier zu fett und starb daran. Nach Leschenault lebt es in seinem Vaterlande in Waldgebüsch, wo es wahrscheinlich sich so wie die Genetten von kleinen Thieren und Eiern ernährt.

627. (Taf. 78.) Das rothgelbliche Rollschwanzthier. Paradoxurus aureus Fr. Cuv.

Franz.: Le Pougouné doré. — Arctitis aurea Fischer.

Kennz. der Art. Haar lang, einfarbig, rothgelb.

Das Thier ist von Fr. Cuvier in den Mem. du Mus. IX. p. 47. weitschweifig aber doch so unzureichend beschrieben worden, daß nicht einmal eine genaue Größe angegeben worden, es soll die Größe einer mittelmäßigen Katze haben. Lesson glaubt es gehöre zur Gattung Arctitis, wohin es auch Fischer gebracht hat, wie uns scheint mit Zwang, da diese Thiere ganz anders aussehen vgl. 444 und 445. so daß es viel näher zu liegen scheint, wenn Bennet das Thier mit seiner Cryptoprocta, die wir oben beschrieben und unter 626. abbildeten, wenigstens in eine Gattung bringt, wenn es auch schon wegen der kleineren Ohren von seinem Thiere specifisch verschieden seyn dürfte. Cuvier konnte das Vaterland seines Thieres nicht ermitteln.

307—309. Der Steinmarder. Mustela Foina Briss.

Franz.: la Fouine Buff. — Engl.: Martin Penn. the Fouin or Beech Marten Griff. — Cambrisch.: Bela graig. — Ital. u. Span.: Foina, Fouina. — Russ.: Kuniza bjeloduschka (weißkehliger M.) — Krimmische Tartar. Sanssàr. — Pers. Dalà. — Heißt auch Hausmarder, Dachmarder. — M. Foyna Pall. M. fagorum Raf.

Kennz. der Art. Kastanienbraun (Wollhaar graulichweiß), Bauch, Beine und Schwanz (im Winter der ganze Pelz) dunkler; Kehle und Unterhals weiß. Länge 16″, Schwanzruthe 8″.

Er ist durch seine weiße Kehle besonders ausgezeichnet, welche doch bisweilen mit braunen Flecken versehen ist. Der Kopf ist hinten rund, oben mehr platt, die Schnautze läuft spitzig zu, die Schnurren sind schwarz und steif. Die Nase ist schwarz, immer feucht, die Ohren abgerundet. Die Augen funkeln zur Nachtzeit. Der Hals ist besonders kräftig, so stark als der Leib. Der Schwanz buschig, doch minder als der der folgenden Art. Die Krallen sind weißlich. Die Farbe variirt, so daß bisweilen, vorzüglich gelblichweiße und weiße vorkommen, dergl. fand Pallas mit gewöhnlich gefärbten in demselben Neste. Von einem nicht unwahrscheinlichen Bastard aus Steinmarder und Katze ist S. 56. 12. die Rede gewesen und das merkwürdige Thier auf unsrer Taf. 68. unter Nr. 545. abgebildet worden. — Das Vaterland des Steinmarders ist ganz Europa und das westliche Asien, doch mehr die gemäßigten Gegenden. Er hält

Digitized by Google

Köpfe ab und schleppt endlich ein Stück mit sich. Die Eier öffnet er mit einem sehr kleinen Loche und säuft sie gierig aus. Außerdem fängt er auch Ratten, Mäuse, Spitzmäuse und Maulwürfe, sehr gern Kaninchen und Meerschweinchen, geht dem Honig nach und liebt auch süße Früchte, wie Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Birnen, Stachelbeeren, Weinbeeren und Vogelbeeren. Im Nothfalle stellt er den Insecten und Würmern nach, frißt Hanf und auch Baumknospen. Er weiß auch durch Graben und durch Nagen zu seinen Ziele zu gelangen und bedarf wie die Thiere der ganzen Gattung nur wenig Raum um seinen dünnen Leib hindurchschlüpfen zu lassen. Die Stimme ähnelt dem Mauen der Katzen, bei der Paarung ist sie ein Murksen. Gesicht und Geruch sind sehr scharf, der Gang hüpfend, mit großer Sicherheit auch über die dünnsten Stangen und im Nothfalle Sprünge von bedeutender Höhe. Sie rauben nicht in der Nähe ihres Lagers, besonders wenn sie Junge haben, um nicht sich zu verrathen. Vor Gewittern werden sie unruhig, und stark elektrisirte Luft bringt diese Unruhe auf den höchsten Grad. Sie paaren sich im Februar, man sieht sie dann bisweilen sich auf den Dächern herumtreiben. Das Weibchen gebiert nach 9 Wochen im April oder Mai 3—5, selten mehr Junge. Diese sind blind, sehr kurzhaarig und weit blaßer als die Alten, besonders fällt der dünne Schwanz auf. Sie werden 3 Monate im Neste gesäugt, dann im Dunklen ausgeführt und im Raube eingeübt. Sie sind im zweiten Jahre ausgewachsen, im zehnten Monate wieder paarungsfähig. Werden überhaupt etwa 12 Jahre alt. Der Geruch ist dem des Iltis ähnlich, bisamartig, bei den Weibchen weniger bemerkbar. Denselben Geruch hat auch der Urin und der Koth den der Steinmarder, so wie alle Thiere dieser Verwandtschaft an einem bestimmten Orte absetzt. Man kann ihn jung aufziehen und mit Milch und Brot, auch mit Hanf und Honig nähren, wobei er sehr zahm wird. Alt wird er immer rückisch und hinterlistig, entweicht auch wohl zur Parungszeit, während er außerdem dem Rufe seines Herrn sogar im Freien gehorcht. Sein Nutzen geht daraus hervor, daß er auch viele schädliche Thiere vertilgt und sein Pelz im Herbste und Winter geschätzt wird. In der Provinz Iset hat er einen Pelz der fast dem des Baummarders vorgezogen wird. Sein Schaden wird indessen höher angeschlagen, da er nicht nur vieles Geflügel mordet sondern auch das noch lebende durch den starken Geruch seiner zurückgelassenen Losung (Koth) aus seinen Wohnungen vertreibt. Diese müssen dann wo es thunlich ist, gescheuert oder sonst gereinigt und ausgeräuchert werden. Jagd und Fang. Man sucht ihn da zu schießen, wo er sich des Nachts herumtreibt. Im Sommer bei schwüler Luft, vor Gewittern bemerkt man wie sie unruhig ihr Lager verlassen und einander schreiend auf den Scheundächern verfolgen. Man stellt sich dann bei einbrechender Nacht in eine Schußweite an den Wechsel und schießt sie mit Hasenschrot. Man sucht sie auch durch Lärm, mit Klappern und durch Hunde zu entfernen. Kennt man seinen Aufenthalt und Wechsel so setzt man auf den Absprung ein verdecktes Tellereisen ohne Köder, in welches er leicht hineinspringt. Bei Aufstellung eines Tellereisens oder einer Falle im Freien, muß beides in einem Einschnitt stehn, mit Laub bedeckt seyn, ringsherum der Platz gereinigt. Nach der Vorschrift von Lenz bestreiche man das Eisen ganz fein mit folgender Witterung: 3 Gran vom besten Moschus; 1½ Quent. Anisöl, ½ Quent. Bilsenöl, in einem Glase untereinander geschüttelt. Wirft man um das Eisen herum Stücken der Lockspeise, auf deren jedem ein Tröpfchen Bilsenöl ist, so wird er durch den Genuß betäubt und geht um so leichter in die Falle. Im Hause wo sich Katzen oder Hunde fangen könnten, nimmt man Lockspeisen denen diese nicht nachgehen, am liebsten ein Ei, Kirschen, frische oder gebackene

Digitized by Google

Pflaumen. Hat man das Lager der Jungen entdeckt, oft unter einem Haufen Reisholz, mit Heu, Stroh u. dgl. ausgefüttert, so ist auch Abends und Morgens eines der ab- und zugehenden Alten leicht zu überraschen. Sobald indessen die Thiere die Entdeckung bemerkt haben, tragen sie auch alsbald die Jungen an einen andern Ort. Kann man sich dieser selbst bemächtigen und sie in eine Deckelfalle bringen, so hat man auch das Mittel die Mutter daselbst zu fangen, welche dann auch in der Gefangenschaft die Jungen fortsäugt. Der Ort wo der Steinmarder seine Losung absetzt, die man an ihrem starken Geruche erkennt und welche im Sommer oft Kirschkerne und Käferstücken enthält, kann auch zum Anstande benutzt werden. Man muß dabei berücksichtigen, daß das Thier in den meisten Fällen nicht früher auf den Raub ausgeht bis gänzliche Stille im Hofe eingetreten ist, oft erst um Mitternacht, wo beim Mondenschein der Anstand angenehm ist und am ersten mit Erfolg gekrönt wird.

310—315. Der Baummarder. Mustela Martes Linn.

Franz.: La Marte commune, Le martre. — Engl.: the Pine Marten, Pine Martin, Jellow breasted Martin, Martin, Matflet. — Cambrisch.: Bela goed. — Ital.: Span.: Portug.: Marta. — Holländ.: Marter. — Dänisch.: Maar. — Schwed.: Maord. — Lappländ.: Naette. — Pohlnisch.: Kuna. — Ungarisch.: Njeszcht. — Russ.: Kunitza. — Werchotur.: Kidon. — Kasansch. Tatar.: Ssusar. — Krimm. Tatar, u. Türk.: Serdawa. — Tschuwasch.: Syssar, Smosar. — Kalmuk. Ssussar. — Lett: Zauna. — Esth.: Nuggis. — Permiens.: Tulan. — Morduan.: Schinkma, Schinda. — Tscheremiss.: Lul. — Wotjak.: Sslor. — Wogul.: Kohnza, Loisa. — Pers. u. Armen.: Sardawà. — Martes silvestris Gesner. Viverra Martes Shaw. Mustela I. Martes vulgaris Griff. M. Abietum Kal. — Birken- Buch- Busch- Edel- Espen- Feld- Fichten- Gold- Kiefern, Licht- Wald- Mardet. — Den sehr alten nennen die Jäger auch Wildmarder.

Kennz. der Art. Kastanienbraun (Wollhaar gelblich graulichweiß), Beine und der keulenförmig-starkbuschige Schwanz dunkler; Kehle und Unterhals dottergelblich, Ohren (im Alter) inwendig weiß. Länge 18½", Schwanzruthe 9½ Zoll.

Diese Art ist also noch größer und schöner als die vorige, das Haar noch länger, der Schwanz noch buschiger. Der Kopf ist etwas kürzer und dicker gebaut. Die Ohren kurz und sehr abgerundet. Die Augen ziemlich hervorstehend, im Dunkeln stark leuchtend. Die Zehen sind bis zur Mitte durch eine Haut verbunden. Das Weibchen ist etwas schlanker, sein Kopf weniger dick. Seltene Abänderungen zeigen von der gelben Kehle die Fortsetzung eines schmutziggelben, mit braunem Haaren gemischten Streifen bis zum After. Das Vaterland ist Europa, allerdings auch England, was Linnée bezweifelte und ein großer Theil von Asien, er findet sich noch im Uralischen und den Werchoturischen Gebirgen auch in der Provinz Isset, weiter scheint er jedoch nicht über Sibirien verbreitet zu seyn. Im Orenburgischen Gouvernement zieht das Gelb der Kehle ins Röthliche. Der Nordamerikanische Baummarder ist dagegen eine verschiedene Art vgl. 319—321. so wie auch die Beschreibung der ostindischen Baummarder sogleich folgen wird. — Der Baummarder bewohnt die Wälder nicht nur das Nadel- sondern auch das Laubholz. Er bereitet sein Lager in hohlen Bäumen oder in Felsschluchten oder nimmt auch Besitz von den Horsten größerer Vögel. Er wechselt oft seinen Aufenthalt und kömmt seltner und nur im Nothfalle in die Nähe der menschlichen Wohnungen. Er übertrifft noch den Steinmarder vor Raubsucht und Grausamkeit, fast dürfte man ihn auch noch flüchtiger nennen, wenigstens scheint ihm die stete Uebung im Klettern noch einen Vorzug in dieser Kunst vor seinen nächsten Verwandten einräumen zu lassen. Er geht gewöhnlich erst Abends auf seinen Raub aus, doch verfolgt er auch wohl, manchmal ein Eichhörchen am Tage, und springt dabei mit einer Behendigkeit von einem Zweige oder von einem Baume zum andern, welche dem gelenkigsten Thiere bald den Vorrang ab-

Digitized by Google

zugewinnen weiß. Die kleineren Thiere des Waldes überhaupt sind der Gegenstand seiner Jagden, junge Hasen, Kaninchen, Rebhühner, Haselhühner, und andre Waldvögel, auch wohl größere wie Birk- und Auerhühner oder ihre Jungen, sogar Raubvögel sind vor ihnen nicht sicher. In Ermangelung solcher Beute fängt er Mäuse und Ratten, frißt auch Schnecken, Käfer u. a. Insecten. Außerdem liebt er aber auch Eier und Honig und süße vegetabilische Kost, wie Kirschen und Vogelbeeren, denen er sehr nachgeht, sie sowohl von den Bäumen selbst hohlt, als von der Schneuß nimmt wenn er anstatt des Jägers nachsieht was sich gefangen hat und die gefangenen Vögel auslöst, um sie zu verzehren. Im Nothfalle frißt er Aas. Die Paarung geschieht meist noch früher als bei vorigem, im Januar und Februar. Das Weibchen trägt 9 Wochen und gebiert 3—4 Junge, welche 14 Tage blind sind, von denen das gilt, was von denen des Steinmarders gesagt worden ist. Der Baummarder wird 15 bis 20 Jahre alt. Man kann ihn zähmen, wenn man ihn jung aufzieht, anfangs Semmel und Milch giebt und später gekochtes Fleisch. Mit lebendigen Thieren kämpfen sie mit so großer Behendigkeit, daß man nicht im Stande ist, den Bewegungen einzeln mit dem Blicke zu folgen. Sie packen ihre Beute meist im Genick oder am Halse, einem kleinen Thiere zerbeißen sie den Kopf, überhaupt geben sie ihm, so schnell sie ankommen können, einen tödtlichen Biß, halten es so lange fest bis es todt ist und lassen nichts, was ihnen irgend zur Nahrung dienen kann, lebendig. Das Blut, welches ausläuft, lecken sie gern, ohne es eigentlich, wie man sonst sagte, aus dem Thiere zu saugen. Lenz berichtet von dem Marder, den er gezähmt hatte, daß er, als er erwachsen war, noch gern spielte, ihn aber dabei durch dickleberne Handschuhe biß. Sein Blick zeigte nie Theilnahme, immer nur Mordlust, und wenn ihm recht behaglich war, bei Fraß oder bei Ruhe, so ließ er oft ein anhaltendes, trommelndes Murren hören. Böse geworden, knurrte er heftig. Er war den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch in Bewegung, hüpfte über die Stange seines Käfigs und ruhte nur kurze Zeit, nachdem er sich satt gefressen. Nutzen stiftet auch der Baummarder durch Vertilgung mancher schädlichen Waldthiere, besonders der Waldmäuse. Sein Winterbalg ist ganz vorzüglich geschätzt. Die kostbarsten kommen aus den kaukasischen Gebirgen von den Gilaner Alpen auf der Krimmischen Halbinsel, man schätzt sie fast dem Zobel gleich, eine zweite Sorte ist die aus den Uralschen Gebirgen. Noch erlegt man sie in Menge in den südlicheren Gebirgsgegenden Asiens, außerhalb Sibirien, besonders um die Quellen des Jenisei, und die Crasnojarischen Tataren bringen sie unter dem Namen Tschoep-Koe. Die aus der Provinz Jset fand Pallas schlechter als die diesseits des Uralgebirges. Jagd und Fang. Kennt man sein Lager genau, so kann man wohl durch einen Hund auskundschaften ob er darin ist, die Zugänge, was doch seltner ohne Irrung möglich seyn dürfte, verstopfen und das Thier ausgraben. Leichter als dieses mühsame und unsichre Unternehmen ist der Anstand auf ihn. Zur Winterszeit sucht man des Morgens seine Fährte im frischen Schnee, geht ihr nach und tritt sie zu, um nicht irre zu werden. Man verfolgt sie leicht, wo er gebäumt hat an der zerstörten Schneelage auf Stamm und Zweigen. Hier ist er entweder auf einem Aste zu entdecken oder hat sich in das Nest eines Eichhörnchens oder Raubvogels begeben aus dem er hervorguckt. Man schießt nach ihm mit Hasenschrot und hat man gefehlt, so bleibt er dennoch ruhig liegen und behält den Jäger im Auge. Man ladet schnell wieder und kommt zum zweiten Schuß. Eben so unabläßig blickt er auf ein Tuch oder ein Kleidungsstück, welches man in seiner Nähe aufhängt, im Fall man ohne Flinte und Hund ist, so daß man beides, während man seine Blicke gebannt hat, herbeiholen kann.

Digitized by Google

Der Hund muß stark sein. Hat jener sich in einen hohlen Baum versteckt, so kann man diesen fällen oder von unten Wasserspritzen oder Rauch nach oben wirken lassen, um ihn auszutreiben. Tellereisen oder Schwanenhälse werden für ihn so gestellt, wie bei dem Steinmarder angegeben ward, mit einer klein geriebenen Mischung, aus Foenum graecum, Marum verum und Parthenium gemischt, verwittert. Den Anbiß empfiehlt Lenz so. Man brate in einem reinen Tiegel ein Scheibchen einer weißen Zwiebel in ungesalzner Butter, nehme es heraus und thue Brodstückchen, nebst etwas Honig hinein, lasse sie tüchtig braten, und bestreue sie beim Abnehmen mit wenig gestoßenem Kampfer. Ueber das Tellereisen hängt man lieber frisches Hasengescheide. Um den Marder nach dem Eisen hinzulocken, schleppt man ein Stück des Anbisses an einem Faden vom Eisen aus nach verschiedenen Richtungen auf der Erde hin. Auch in Schlagbäumen fängt er sich sehr gut. Zwei knapp auf einander der Länge nach passende, am dünnen Ende zusammengebundene starke Stangenenden auf ein paar Pfähle gelegt und zwischen den nicht verbundenen Enden derselben ein Stellholz geschoben, das 15 Zoll lang ist und einen ebenso langen Seitenast hat, an dem der Köder festgemacht wird. Eine mit jener Wittrung beriebene Auflaufstange stemmt man in die Erde und befestigt sie an das dicke Ende der untern Stange des Schlagbaums. Wenn nun der Marder hinaufklettert, so muß er zwischen die beiden Stangen an das Stellholz gelangen, wenn er zum Köder will, sobald er diese berührt, schlägt die obere Stange nieder und er wird eingeklemmt. Auch ein Häring, in Butter gebraten und mit Zucker oder Honig bestreut, ein frisches oder gebratnes Eichhörnchen oder ein kleiner Vogel dienen ebenfalls als Köder. Das Auswerfen oder Befestigen an Bäumen von in Fett gebratenen und unter den wieder zusammengelegten Flügeldecken mit Aetzsublimat vergifteten Maikäfern, ist weder in der Nähe von Wohnungen noch im Walde anzuempfehlen, da das Gift häufiger dahin wirkt, wohin es nicht sollte.

316 — 317. **Der ostindische Baummarder.** Mustela flavigula. Boddaert.

Franz.: Marte à gorge jaune, à gorge dorée Desmar. — Engl. the white-cheeked Marten. — Gelbkehliger Marder. — Viverra quadricolor —

Kennz. der Art. Braunschwärzlich, Kehle gelb, Kinn und Wange weiß, Schwanz cylindrisch, ziemlich so lang als der Leib. Länge 2′, Schwanz fast ebensolang. —

Diese Art ist unter den eigentlichen Mardern die größte, sie ist noch außerordentlich selten und deshalb wenig bekannt. Pennant sahe sie zum erstenmale im J. 1774. und beschrieb sie in der ersten Ausgabe seiner History of Quadrupeds im J. 1781. Später kamen erst die oben aufgeführten Benennungen zur Kenntniß des Publicums. Die Zoologische Gesellschaft erhielt endlich wieder ein lebendes Exemplar. Die Haare der Schultern haben gelbliche Spitzen. Die Pupillen sind rund, die Ohren lang, die Wimpern mäßig lang, die Vorderpfoten breit und dunkel gefärbt, die Krallen alle weiß. Das Gebiß ist das der Marder. Das Thier ist äußerst zahm, heiter und zuthulig. Es verbreitet nur wenig unangenehmen Geruch. Der Kapitän Shore erhielt es von der ostindischen Compagnie und verehrte es der Zoologischen Gesellschaft.

318. **Hardwicke's Baummarder.** Mustela Hardwickii. Horsf.

Franz.: Mart Hardwicke. — Engl. Hartwickes Marten.

Kennz. der Art. Gelblich, Kopf und Hals, oben, Schwanz und Beine castanienbraun, Länge 2′ 2″, Schwanz ziemlich gleichlang, cylindrisch.

General Hardwicke erhielt das Fell aus Nepaul, und verehrte es dem Museum der zoo-

Digitized by Google

logiſchen Geſellſchaft. Es ſcheint keine von vorigem verſchiedene Art zu bilden, ſondern nur in einem blaſſern oder vielleicht verbleichten Zuſtande ſich zu befinden.

319 — 321. **Der Huronenmarder.** Mustela Huro. Fr. Cuv.

Franz: La Marte des Hurons.

Kennz. der Art. Farbe veränderlich, gelblich und bräunlich mit blaßerer Kehle, Ohren weiß gerandet, Beine und Schwanz nach dem Ende zu braun, Zehen unterſeits behaart.

Dieſer Marder iſt unſerm Steinmarder ziemlich ähnlich, gewöhnlich etwas kleiner, 15 bis 16 Zoll lang, der Schwanz 8 bis 9 Zoll. Bei der Veränderlichkeit der Farbe des Pelzes ſcheint doch der weißliche Rand um die Ohren ſtandhaft zu ſein. Die Felle kommen häufig im Pelzhandel vor, unter ihnen auch ganz weiße. Ob Mustela leucopus Kuhl, M. Goodmanni Fisch. M. rufa Geoffr. M. vulpina Rafin. Abänderungen dieſer Art ſind, wie es wahrſcheinlich iſt, muß noch näher unterſucht werden. Die Art kommt in Nordamerika insbeſondere in Ober-Canada vor und iſt der Canadiſche Marder der Pelzhändler.

631. (Taf. 78.) **Der weißöhrige Marder.** Mustela leucotis Temm. u. Hamilt. Sm.

Franz: La Marte aux oreilles blanca. — Engl. the white-eared Weasel.

Kennz. der Art. Glänzend kaſtanienbraun, Innenſeite der Ohren weiß.

Dieſer Marder iſt 20 engl. Zoll lang, und zur Zeit nur durch die von Griffiths gegebene Abbildung bekannt. Man kennt ſein Vaterland nicht.

322 — 323. **Der Pekan.** Mustela canadensis Schreb.

Franz: Le Pekan. Buff. — Engl. Pekan Weasel. Penn.

Kennz. der Art. Kopf, Schultern und Oberrücken graubraun; Naſe, Kreuz, Schwanz und Lenden ſchwärzlichbraun, bisweilen ein weißer Fleck an der Kehle.

Größer als unſre Marder, findet er ſich 1½ bis 2 Fuß lang, der Kopf hält 5 Zoll, der Schwanz iſt dann 1 Fuß bis 1 Fuß 4 Zoll. Schnautze und Schwanz ſind geſtreckter als bei den einheimiſchen Mardern. Seine Stirnlinie iſt gerader und das Wollhaar braungrauliſch, das Seidenhaar hat die oben angegebenen Schattirungen, während alle Haare an ihrer Baſis eine reinbraune Farbe haben, übrigens ſind ſie an den graubraunen Stellen ihrer Länge nach weißlichgelb und haben ſchwarze Spitzen, an der ſchwärzlichen Stelle ſind ſie kaſtanienbraun und laufen in ſchwarze Spitzen aus. Die Schnurren um die Oberlippe und über den Augen ſind ſchwarz. An den dunklen Stellen des Pelzes finden ſich unter den Seidenhaaren einzelne weiße. Die Klauen ſind graugrünlich oder hornfarbig. Lebt in Nordamerika nach Art unſerer Marder.

423. **Der Zobel.** Mustela Zibellina L.

Franz.: La Zibeline, Marte-Zibeline. Buff. — Engl.: the Sable Penn. — Holl.: Sabel, Sabeldier. — Dän.: Zobel. — Schwed.: Sabeldjur, Sabel. — Ital.: Zibellino. — Span.: Cebellina. — Portug.: Zebelina, Zibelina. — Ruſſ.: Sóbol. — Tatar. in Sibir. und im Kaſanſchen: Kyech; Türk.: und Krimm. Tatar. Samur (armeniſcher Name). — Mongol. Balaghan; Kalmuck Bulgan; Burät.; Bula. — Tunguſ. am Obatanga: Deuka od. Dynke; am Baikal: Schegew Lamut: Schup. — Permienſ.: Nyech; Werdyan.: Wetbatscha; Tſchermniſſ. Luhmusch; Wotjäk: Nyisch; Wogul: Njuchse oder Njokusl; Oſtjäk. Ijukus, anderwärts Nogos; am Jeniſei: Oedh. — Samojed.: Tos; Jurák: To; Turuchemienſ. Sind, Narymenſ. Schig; am Fluße Keta: Si, Bergſamej; Ki; Tawginz: Lidin ka, Keibal, Sollias; Kamaſch. Schill. — Irtiz. Khirgaiſchk. Kotewz. und Iſſaner, Ya. Indaſkienſ. Eede; Pumpokolienſ. Hiju. — Kammtſchadal. Hymrehim; weſtl. Kymchym; am Fl. UK: Kymichym. Kuril. Kyttihym od. Ojana, Aufagiten: Nogtacha. — Armen. Samur. (Name, welcher mit der Waare an die Türken übergegangen iſt, mit der Benennung, welche die Kaſanſchen Tartaren dem Zibel beilegen, zuſammenfällt.

Kennz. der Art. Kaſtanienbraun, Stirn weißlich, Kehle aſchgrau, Pfoten bis an die Nägel behaart.

Digitized by Google

Wird 15—18 Zoll lang, der Schwanz 15 Zoll*). Wohnt in den Waldungen Sibiriens und Mittelasiens, und wie es scheint, heut zu Tage dort allein. Er hält größere Kälte aus als der Marder und hält sich in den rauhesten Gegenden auf, nur als Ueberläufer hat man ihn in den westlichen Gegenden, diesseits des Ural gefangen, wo er sich im Lande der Baschkiren in den Werchoturischen Gebirgen vorfindet. Merkwürdig ist es, daß die Stein- oder Edelmarder in Sibirien, wo die Zobel leben, nicht vorkommen, dagegen in den Werchoturischen Gebirgen beiderlei Thiere untereinander vorhanden sind. Seinen Wohnsitz nimmt er an sonnigen von den menschlichen Wohnungen möglichst entfernten Orten, besonders in Bergwäldern. Bei heiterm Himmel, besonders zur Nachtzeit streift er unermüdet herum und sucht seinen Raub, bei stürmischem Wetter dagegen liegt er im Lager in tiefem Schlafe. Auch gezähmte Zobel empfanden eintretende Stürme voraus, sie wurden traurig und verfielen endlich in den tiefsten Schlaf, welcher während des Sturmes sie so unempfindlich machte, daß sie sich mehrmals herum kollern ließen, bevor sie erwachten. Von den Füchsen und Wölfen weiß man, daß sie gerade während der Stürme am thätigsten sind. Ihr Lager schlagen jene gern in hohlen Baumwurzeln auf, seltner wird auch wohl eine Höhle unter den Wurzeln eingegraben und an höhern Bergen zwischen verwachsenen Stämmen und Wurzeln der Zirbel-Kiefern und Lärchenbäume, ein mit Nadelreisig verdecktes Versteck bereitet, dem die Jäger kaum beizukommen vermögen. Bisweilen hat man auch bemerkt, daß sie von einem Eichhornneste auf einem Baume Besitz genommen. Das Lager wird mit dem reinsten und zartesten Mooſe ausgefüllet und setzt sich in zwei ziemlich entfernte Ausgänge fort, in einem hebt er die übrigbleibende Nahrung für Tage ungünstiger Wittrung auf, den andern benutzt er als Kloake. Sowohl nach den Erzählungen der Jäger als auch nach den Beobachtungen, welche Pallas an gezähmten Zobeln anstellte, sollen sie immer die überflüssige Nahrung fern von ihrem Neste sorgsam verbergen, und besondere Löcher graben, um ihren Unrath abzusetzen, beides sind aber Eigenschaften, die wir auch an unsern Mardern und Iltissen beobachten können. Die Zobel paaren sich im Januar und April, das Weibchen bringt 2, 3, selten 4 und sehr selten 5 Junge auf weichem Bett zur Welt; die Zahl der Jungen soll nach dem Alter der Mutter zunehmen. Nimmt man diese Jungen aus dem Neste und nährt sie mit Milch, so werden sie sehr zahm, im Alter eingefangen bleibt das Thier wild und sehr beißig. Es nimmt seine Nahrung aus beiden organischen Reichen, weßhalb auch die Bewohner Sibiriens sein Fleisch sehr schmackhaft finden. Er liebt die Beeren der Ebereschen, Heidelbeeren und Loniceren, Steinbrombeeren, weßhalb er sich auch nicht selten in den Schlingen fängt, welche für die Waldhühner gestellt sind. Die Erdbeeren liebt er so sehr, daß die Mogulen dieselben Zobelbeeren (Njuchse-laeme) nennen. Wo die Zürbelkiefer vorkömmt, fressen sie die Zürbelnüsse gierig auf, und werden davon so fett, daß ihr Pelz schlechter ist. Gezähmt nehmen sie auch Brot an, aber nach Zuckergebackenem und Lebkuchen oder Zucker sind sie überaus lüstern. Sie nehmen immer mehr davon an und verbergen dergleichen, sobald sie satt sind, im Heu ihres Lagers oder in einem Winkel. Alle Arten von Fleisch vierfüßiger Thiere und Vögel nehmen sie gern, fressen auch gierig Fische, die sie immer am Kopfe fassen und nicht nehmen, wenn man sie ihnen so darreicht, daß sie sie bei dem Schwanze berühren. Sowie der Zobel an Schönheit des Pelzes seinen Verwandten übertrifft, so ist er auch an Behendigkeit, List und Verschlagenheit, durch Muth und Instinct vor diesem ausgezeichnet. Er geht gewöhnlich auf Eichhörnchen und Mäuse aller Art, auf Hasel- und Schneehühner, Rebhühner, aber auch auf Auerhühner, welche er nächtlicher Weile sehr

*) in Rchb. Regnum animale p. 27 ist das Verhältniß der Schwanzlänge zu corrigiren.

Digitized by Google

vorſichtig beſchleicht, ſowie er auch Vögel aus den Neſtern hohlt, er macht ſich aber auch an Haſen, er überwältigt ſie, obwohl dieſe weit größer ſind, als er ſelbſt; er ſoll auch den ſibiriſchen Frettchen und Hermelinen gefährlich werden, ſie tödten oder auffreſſen. Ein gezähmter tödtete ſogar eine Katze. Diejenigen, welche Pallas gezähmt hielt, betrugen ſich indeſſen ſanft, ſpielten mit bekannten Perſonen, liefen wie Eichhörnchen an ihnen empor und verſteckten ſich gern im Buſen, ſie ließen ſich nur nicht gern feſthalten, und biſſen dann bisweilen, wenn man ſie anfaßte. Steller erzählt ein ausgezeichnetes Beiſpiel von Zahmheit vom Zobel des damaligen Erzbiſchoffs von Tobolsk. Derſelbe lief frei in der Stadt herum und merkte ſich die Häuſer wo er einmal Nahrung erhalten, rettete ſich dort auf die Dächer, wenn ihn die Hunde verfolgten, und kehrte treulich zurück in ſeine Wohnung. Die Jäger, insbeſondere die Tunguſen glauben, der Zobel habe keine Feinde unter den größeren Thieren, dieſe Vermuthung rührt vielleicht daher, weil man beobachtet, daß er den Fährten der Bären, Vielfraße, Wölfe und Füchſe folgt, er thut dies aber um ſich davon zu nähren, was dieſe von ihrer Mahlzeit übrig gelaſſen.

Unter die Eigenheiten des Zobels gehört noch ſein ſtarker Biſamgeruch, womit er leicht das ganze Haus, in dem man ihn hält, zu erfüllen vermag, weshalb man ihn, obwohl er ſonſt ein artiges und reinliches Thier iſt, nicht wohl im Zimmer halten könnte; denn ſowohl der Geruch vom Thiere ſelbſt als noch vielmehr der des Urins und des ſchwarzen Kothes iſt ſo durchdringend, daß er kaum nach einem Monate ſich wieder verliert und heftigen Kopfſchmerz erregt. Zur Nachtzeit wachten die zahmen Zobel meiſt und hüpften leiſe herum, Am Tage lagen ſie meiſt zuſammengeknäult und ſchliefen auf Heu. Wenn ſie ſatt waren, ſpielten ſie, richteten ſich auf und tanzten wie Bären. Die Pärchen ſpielten zuſammen und betrugen ſich ſehr ſanft gegeneinander. Hatten ſie Unruhe, oder auch während des Spiels ſtreckten ſie ſich auch auf dem Bauche aus und wedelten mit dem Schwanze. Näſſe können ſie nicht an ſich leiden; wenn ſie während des Trinkens ſich benetzten oder ſonſt den Pelz verunreinigten, ſo wälzten ſie ſich auf dem Heue, um ſich zu trocknen, überhaupt ſcheint es, als ob ſie den Werth ihres Pelzes kennten, indem ſie denſelben ſorgfältig ſchonen. Aufgereizt knurren ſie wie ein Iltis und bellen wohl auch wie ein junges Hundchen, bisweilen hört man ſie gecken faſt wie eine Elſter. Der Pelz war bei den Jungen im Sommer ſchwärzer und dünner, wurde gegen Ende Auguſt und im September glänzendbraun mit Schwarz gemiſcht und ſchien im November am ſchönſten zu ſein. Die Jagd auf den Zobel wird geſellſchaftlich betrieben. Die Jäger ziehen mit den nöthigen Nahrungsmitteln, mit Inſtrumenten und Waffen auf kleinen mit Hunden beſpannten Schlitten aus, wobei ſie durch Führer über die in dieſer Zeit etwa einen Fuß hoch mit Schnee bedeckten Gefilde geleitet werden. Sie nehmen ihren Weg beſonders an den Flüſſen aufwärts, wo ſich der Weg nicht leicht verliert. So gelangen ſie in entlegene Bergwälder, entfernt von aller Cultur. Hier werden nun die Schlagbäume geſtellt, denen ähnlich, die wir bei der Jagd des Marders kennen gelernt. Anderwärts ſucht man die Thiere nach der Fährte in ihren Höhlen und Lagern auf oder läßt ſie durch Hunde ausſpüren, legt ein Netz in einem Halbkreiſe um das Lager und ſucht den Zobel mit Rauch auszutreiben, oder bleibt mit dem Hunde auf dem Anſtande bis er von ſelbſt heraus und in das Netz geht. Geht der Zobel einmal durch, ſo iſt ihm ſchwer beizukommen, er klettert nicht wie der Marder auf Bäume, ſondern läuft ſchnell und immer im Zickzack eine weite Strecke fort, duckt ſich bald und ſucht auf alle Weiſe zu täuſchen, bis er endlich unvermerkt in der Ferne am ſicheren Baume eilig emporklettert. Nur ungern ſchießt man in ſolchem Falle mit Bolzen nach dem Thiere, da man immer alle Vorſicht anwendet, irgend einen Blutverluſt zu vermeiden, wodurch der Pelz

Digitized by Google

leidet. Die Bolzen haben entweder eine ſtumpfe eiſerne Kuppe, oder die der Tunguſen führen einen Knochenkern an der Spitze, mit dem dieſe geſchickten Jäger den Kopf des Thieres zu treffen wiſſen, ſowie ſie auf dieſelbe Weiſe auch Eichhörnchen ſchießen. Die Ruſſen fällen ſogar den Baum, auf dem ſich ein Zobel befindet, und ſtellen das Netz dahin, wohin deſſen Gipfel zu fallen kömmt.

Der Pelz iſt eigentlich erſt im vollkommnen Winter ganz gut. Die Jagd beginnt bald nach dem erſten Schnee, und die vor der guten Zeit gefangenen Zobel heißen Nedosoboli unvollkommene Zobel und werden noch weniger geſchätzt. Der Fang gelingt am beſten in den Jahren, wo die Zürbelnüſſe mißrathen ſind; denn gaben dieſe eine gute Aerndte, ſo ſättigten ſich die Zobel davon und gingen nicht in die Schlagbäume und Schlingen. Eben ſo befördert auch das Gedeihen der Beerenfrüchte keineswegs die Güte der Zobel und die Leichtigkeit ihres Fanges, denn ſo oft Jahre eintreten, wo die Thiere ſich mäſten können, ſo oft leidet die Ausbildung der Haare des Pelzes. Die günſtigſte Jagd bieten deßhalb die unfruchtbarſten Jahre, welche die Vegetation unterdrückten; je zeitiger der Winter eintritt und je heller die Tage ſind und je öfter ſie neuen Schnee geben, welcher die friſche Fährte der Thiere verräth, um deſto bedeutender wird die Ausbeute. Wie ſchwierig aber dieſer Fang unter dieſen Umſtänden ſey, um ſo mehr da die Thiere nur in den alpiniſchen Gegenden hauſen, aus denen ſie nur bei größter Hungersnoth in die Ebenen herabſteigen, das bedarf wohl kaum angedeutet zu werden. Es ſind die von Natur als Jäger gebornen Vogulen, Oſtjäken, Tunguſen, Jakuten, Buräten in Sibirien, dann die Völker am Jeniſei und am Kusnetzkiſchen Gebirge, die Kamtſchadalen und die ruſſiſchen Anſiedler, welche verpflichtet ſind, die Felle dieſes Thieres als Tribut (Jasaschnye) an die Krone zu liefern. Von jeder Perſon wird jährlich nur der Werth von zwei geringeren Fellen gefordert, von den Tunguſen mehr, doch iſt auch geſtattet dieſen Tribut durch Geld oder andere edle Felle abzulöſen. Den größten oder beſten Theil der Zobelfelle kaufen die in den Städten Sibiriens wohnenden Kaufleute oder die fremden, welche Sibirien bis an die chineſiſche Grenze durchziehen. Dieſe Felle machen den Reichthum Sibiriens aus. Die Felle ſind von ſehr verſchiedenem Werthe, wobei allerdings auch individuelle Liebhaberei ins Spiel kömmt. Schon zu Pallas Zeit hatte man deßhalb Felle in Sibirien um den Preis von 1 bis 80, in Rußland von 2 bis 170 Silberrubel. Der Werth richtet ſich 1) nach der Größe, daher die Felle der Männchen denen der Weibchen vorgezogen werden; 2) nach der Schönheit des Seidenhaares (Oss), daſſelbe muß dicht, glatt, lang und zwar von gleicher Länge ſein; 3) nach dem Wollhaar (Pod-oss), daſſelbe ſei ganz dunkelbraun, wie die terra Semlja. Bei den edelſten Fellen ſind beide Haarſchichten faſt ſchwarz. Die beſten Zobelfelle gehen nach der Türkei und ſonſt nach Polen. Auch in mehreren deutſchen Reſidenz- und Handelsſtädten findet man gute Zobelpelze käuflich. Die geringern gehen nach China. Erfahrene Kürſchner ſind im Stande zu unterſcheiden, aus welcher Provinz Sibiriens oder aus welchem Flußgebiete dieſes großen Landes ein vorgelegtes Fell ſeinen Urſprung genommen. Die erſte Sorte, zugleich die größten, kommen aus der Gegend des Willim, eines Nebenfluſſes der Lena; ſie haben das meiſte lange Haar, ſind ſehr ſchwarz und zart. Die Jakuten verkaufen bei ſich zu Hauſe das Paar um 10 bis 60 Rubel, in Moskau um den doppelten Preis. Die zweite Sorte kommt vom Oron-See mit dem Urſprunge der Kirenga. Kleiner ſind die von Olekminskoi aus dem Gouvernement Irkuzk an der Lena. Dann folgen die am Kolyma in demſelben Gouvernement, die zwiſchen dem Uth und Tugir gefangenen und die von Bargu im öſtlichen Theile der Wüſte Kobi in der kleinen Bucharei um dem Baunt-See und den Urſprung des Witim. Etwas geringere kommen von der obern Angara und

Digitized by Google

noch geringere von Judoma und Ochotsk sowie aus Kamtschatka, das Paar kostet dort 6 20 Rubel. Hierzu kommen noch die in Tunguska, und die in den Sajanschen Alpen in das Städtchen Kansk gebrachten Felle, unter denen bisweilen auch edlere vorkommen. Die geringsten sind die vom Altai, von Kusmzk, Krasnojarsk im Gouvernement Tomsk und die vom Flußgebiete des Ob und aus den Werchoturischen Gebirgen, an Werth etwa eines Rubels. — Im mittlern Sibirien, wo bei den Verhältnissen der Lokalität die Gebirge und Wälder sich um den Jenisei vereinen, finden sich die meisten Abänderungen vor, die man besonders an der Menge von Fellen, welche in Krasnojarsk zusammen kommen, beobachten kann. Die schönsten sind fast schwarz, oder wenigstens über dem Rücken und nach hinten schwarz. Das Fell ist nach innen aus dem Gelbgraulichen castanienbraun, mit langen und häufigen, schwarzen Haaren schattirt, das innerste Wollhaar aschgrau. Die Kehle ist verloschen, die Halsseiten aber deutlicher röthlichkastanienbraun, der Kopf oben aus dem Dunkelbraunen, an den Seiten aus dem Gelbgrauen aschgraulich, die Schnauze schwarz und grau melirt, die Ohren gelbgrauweißlich oder erloschen braun, am Rande blaß. Auch die Felle der edlen Sorten sind oft mit weißlichen oder graulichen Haaren unterlaufen, welche ihren Werth bedeutend verringern, weßhalb auch die Pelzhändler diese Haare mit einer Zange geschickt herausziehen. Am Jenisei kommt eine geringere Sorte vor, deren Kehle rothgelb oder von dieser Farbe gefleckt ist. Am obern Jenisei und durch den Sajanskischen Alpenzug sowie im Altai, kommt ein kleinerer Zobel vor, dessen Haar kürzer und straffer ist, aber meist ganz schwarz mit braunem innerem Wollhaar und sehr rauhen Beinen. Dieser hat immer einen unregelmäßigen hoch- oder blaßrothgelben Kehlfleck. Besonders unter den geringeren Fellen bietet sich immer eine so große Verschiedenheit dar, daß dieselbe kaum einzeln zu beschreiben ist. Unter diesen Umständen wird es schwer, den Zobel nach der Färbung zu unterscheiden, und man kann auch hier wie überall in der Natur nur den Typus durch Worte bezeichnen. Sichrer ist die Unterscheidung des Thieres nach gewissen Verhältnissen seiner Theile. So ist nämlich der Schwanz kürzer als die ausgestreckten Hinterbeine, bei dem Marder länger, die Beine auch bei jenem rauher behaart. Schon Pallas vermuthet indessen, daß auch beide so nahe verwandte Thierarten sich mit einander paaren und Bastarde erzeugen, wodurch sich vielleicht manche Mittelformen erklären. So z. B. in den Werchoturischen Gebirgen der Mittelschlag, den man dort Kidoss nennt. Was unter dem Namen des Zobels aus Nordamerika kömmt, dürfte zum Huronenmarder und zum Vison gehören, welcher folgt.

325. Der Vison. Mustela Vison I.

Franz.: Le Vison Buff. — Engl.: Vison. — Bei den Amerikanern: Minx.

Kennz. der Art. Castanienbraun, Unterlippe weiß, Schwanz keulenförmig, nach der Spitze hin schwärzlich.

Vom schlanken Wuchse des Iltis und im Gebiße mit ihm übereinstimmend, d. h. oben mit 2 und unten mit 3 Lückenzähnen. Der Vison erreicht 14 Zoll Länge mit einem Schwanze von 8 Zoll. Wuchs und Lebensweise, so wie die Schwimmhäute zwischen den Zehen, (die jedoch Cuvier dem Thiere abspricht), zeigen die nächste Verwandtschaft des Vison mit dem Nörz. Er ist etwas größer als dieser, von der Größe des Iltis, wohnt in Canada und den vereinigten Staaten, überhaupt an Flußufern, nährt sich von Fischen und Amphibien, und bietet ein sehr geschätztes, dem des Zobels ähnliches Pelzwerk dar, wovon im Jahre 1822 die Hudsonsbaigesellschaft 4600 Felle abführte. Ein ähnliches Thier ist M. lutrocephala *Harlan* aus Maryland, der weiße Vison der Pelzhändler.

Digitized by Google

326 — 327. **Der Nörz. Mustela Lutreola** *Pall.*

Franz.: Le Mink, Noerz. — Engl.: the Mink, Lesser Otter Penn. — Schwed.: Mänk. — Finnisch: Tuheuri. — Polnisch: Nurek. — Russisch: Norka. — Malerussisch.: Nortschik. — Kasan.: Tatar und Baschkir.: Schaeschkae. — Lett.: Duppuris, Dukkeris. — Esth.: Nirk, Saarmas. — Morduan.: Paatscha. — Wotjäk.: Zel oder Tschaju. — Permienisch.: Puisness. — heißt noch: Nerz, Minx, Mink, Nörzwiesel, Krebsotter, Sumpfotter, Wasserwiesel, Ottermarder, kleine Fischotter, Steinhund.

Kennz. der Art. Kastanienbraun, Schwanz ziemlich walzig, nach der Spitze hin schwärzlich. Unterlippe und Kehle (und bisweilen auch die Brust), weiß.

Ganz vom Wuchs des Bison, aber kleiner, nur 1 Fuß lang, der Schwanz 6 Zoll. Findet sich im Norden und Osten von Europa, vom Eismeer bis hinab an das schwarze Meer, in ganz Rußland von Petersburg an bis in die Uralgebirge, und an dem Flusse Cama nicht selten, fehlt aber in Sibirien, und jenseits des Ural, wo die Krebse fehlen. In Schlesien ist er nicht ungewöhnlich und soll auch in Brandenburg, Pommern, Meklenburg und Hannover einzeln erlegt worden sein. Er hält sich am liebsten um Bäche und Flüße herum auf, um welche es viele Frösche und Krebse giebt, von denen er sich vorzüglich nährt, findet sich aber auch in großen und mäßiggroßen Sümpfen. Er verbirgt sich in seinen Gängen am Ufer. Die Felle sind geschätzt, und dem Zobel zunächst geachtet; sie führen auch im Handel den Namen Nörz. In den nördlichen Gegenden der Kasanschen Tatarei sollen bisweilen weiße vorkommen.

228 — 330. **Der Iltis. Mustela Putorius.** *L.*

Franz.: LePutois Buff. — Italienisch: Puzolo, Puzzolente. — Spanisch.: Putoro. — Engl.: the Polecat, Fitcher. — Cambrisch: Ffwibard. — Dänisch: Ilder, in Schonen: Iller — Lappländisch: Boitta, Goa. — Ige das Männchen und Gadse, das Weibchen. — Polnisch: Tchors. — Russ.: Chor, Chorjek, in der Ukräne: Tcher. In Sibirien mit dem tunguisischen Namen: Soloncha, Kasan. und sibir. Tatarn: Kusém, Saaasse-Kusén. Kirgis. Tartar.: Sasskoesen. Krimmisch: Keneltochik. Kalmuck.: Kurnae. — Teleut.: Schergalak. — Tunguf.: Scholongò (uneigentlich). Lett.: Seaks. Esth.: Tahkar. — Tscheremiss.: Pchàra. Ostjäk. Kas. — Caregaffisch. Samoj.: Kungrju. — Heißt noch Ellkatze, Ellthier, Ilk, Ilbte, Iltnis, Illing, Raß, Stinkraß, Stänker, Stinkmard, Stänkmarder, Stinkthier, Stinkwiesel, Binsing, Buntfink, Nölling, Ulk und Illing, Hausunke.

Kennz. der Art. Wollhaare gelblich, Seidenhaare lang mit schwarzen Spitzen, Maul und ein Fleck über jedem Auge blaß, Unterhals und Brust nebst Extremitäten fast schwarz.

Gewöhnlich 16 Zoll lang, der Schwanz 7 — 8 Zoll. Vom schlankem Baue, wie die vorigen, der Kopf kürzer, die Schnautze dicker. Ein paar Stinkdrüsen unter dem Schwanze entwickeln den eigenthümlichen, moschusähnlichen, aber unangenehmeren Geruch, durch den sie in geängstetem Zustande, nach Art der Stinkthiere, sich bemühen, den Feind von sich zu entfernen. Der Iltis ist in Europa und in ganz Rußland das am meisten verbreitete, häufigste Raubthier, nur den höhern Norden berührt er nicht. Er lebt gern in Wäldern an sumfigen Oertern, hält sich daselbst auf grasigen, trocknen Flächen auf, wo er einen Gang bewohnt, welcher etwa ein paar Fuß oder weniger tief ist, meist von Zieseln und andern Thieren früher bewohnt. In menschenreichern Gegenden hält er sich gern in der Nähe der Häuser auf, wohnt unter Holzhaufen, oder verbirgt sich im Winter in Scheunen und Ställen, während er den Sommer in Löchern von Kaninchen, Ratten und Hamstern zubringt. Pallas fand am Ende des schiefen Eingangs einen Kessel mit dem weichsten Gras ausgestopft, von ihm aus ging eine tiefere Grube von einem besondern Gange aus, welcher als Kloake diente, und eine dritte mit schiefem, sehr langen Canale, zur Aufnahme der Beute während des Frostes in der Erde und zum Zufluchtsorte. Der Iltis kommt häufiger in die Häuser als daß er innerhalb

Digitized by Google

ihrer Räume wohnt. Er ist wohl ziemlich behende, doch springt und klettert er bei weitem nicht so geschickt als der Marder. Seine Nahrung besteht in kleinen Säugethieren und Vögeln, die er sich selbst tödtet, am liebsten Mäusen, Ratten und Hamstern, demnächst Amphibien, unter denen er auch die Kreuzotter mit ihren Giftdrüsen, wie Lenz beobachtet hat, ohne sich zu schaden, verzehrt. Fische genießt er sehr gern, und findet sich deshalb häufig bei den Fischereien am Caspischen und Mäotischen Meere. Die geraubte Beute schleppt er fort und Eier trägt er mit den Zähnen weg, um sie dann am ruhigen Orte auszuschlürfen. Der Iltis ist zornig, beißig und zählebig. Er zischt, knurrt, geckert und beißt tüchtig zu, lebt, nachdem er ziemlich lange unter dem Wasser gehalten und erdrosselt, oder heftig verwundet worden, wieder auf. — Die Paarung geschieht zu Ende Februar, das Weibchen hat 8 Bauchzitzen und gebiert im Mai meist 5, oder 3 — 6 Junge, welche sich leicht zähmen lassen, so daß sie sogar nachlaufen wie ein Hund. Einer, welchen ich lebendig besaß, hielt sich immer in seinem Verstecke auf, und nach einem Jahre waren ihm die Nägel bis einen Zoll lang gewachsen. Alt, werden sie oft wieder beißig.

Der Iltis soll durch Wetzen eiserner Instrumente oft gereizt und aus seinem Aufenthalte gelockt werden können. Ich habe dies so wenig, als Lenz, bestätigt gefunden. Der Iltis flüchtet sich leicht in Spalten und Löcher, welche nur der Größe seines Kopfes entsprechen, und wird den Taubenschlägen und Hühnerhäusern nachtheilig; doch ist es unwahr, daß er alles aufwürge wie der Marder, im Gegentheil trägt er die erste gewonnene Beute fort, um in Ruhe sie verzehren zu können, oft schleppt er nur ein Ei zwischen den Zähnen von dannen. Man stellt ihm demnach, sowohl um seiner Schädlichkeit willen, als auch seines Pelzes wegen, ernstlich nach. Hunde gehen ungern an den Iltis und stutzen oft, wenn er sich gegen sie zur Wehre setzt und sie mit seinem stinkenden Urine empfängt. Seltner und nur gelegentlich schießt man ihn, kann ihn auch bisweilen mit Wasser aus seiner Höhle austreiben. Sonst fängt man ihn in Schlagbäumen wie den Marder, auf seinem Wechsel mit Tellereisen, welche mit Erde, Spreu oder Tannnadeln bedeckt werden. Das Eisen muß mit heißem Wasser gereinigt seyn oder mit einer Wittrung bestrichen, welche Lenz folgendermaßen anzubereiten empfiehlt: 2 Fingerhüte voll gestoßene Kamillen, ebensoviel zerriebenes **Marum verum**, soviel als eine halbe Bohne Bibergeil, ½ Eßlöffel voll Fischthran, 4 Loth reines Gänsefett, das Ganze wird gebraten bis es gelb wird, dann 10 Tropfen weißer Terpentin zugesetzt. Als Köder auf dem Teller dient ein mit einem Faden mittelst einer langen Nadel durchgezogenes Ei, oder ein Vögelchen, am besten ein Häring oder andrer Fisch, in Gänsefett gebraten und mit Zucker überstreut. Mit demselben Anbiße kann man ihn vorher ein paar Nächte kirren. Da das Tellereisen im Hause für andere Thiere gefährlich wird, so fängt man ihn lieber in der Kastenfalle oder in der Bretterfalle. Der Balg ist ein gutes aber nicht sehr geachtetes Pelzwerk.

331 — 332. Iltis, die Eversmannische Abart. **Mustela Putorius Var. Eversmanni Fisch.**

Kennz. d. Abart: Weißlich, Rücken und Beine nebst Brust schwarz. Schwanz einfarbig. — Länge 16 Zoll,

Schon Pallas sagt: im Winter und in Sibirien zeichnen sich alle Iltisse durch einen blassen, weißlichen Leib aus, auf dem nur die Rückenhaare schwarz sind, die Beine sind aber immer und die vordern zugleich nebst der Brust schwarz, die Kehle gelblich, der Kopf mehr braun, Umkreis um das Maul und der Rand der Ohren ist bei allen weiß, der Schwanz

Digitized by Google

an der Spitze schwarz. Jene ähnliche Abart wurde von Ebersmann zwischen Orenburg und Buchara angetroffen.

333 — 334. Das Frett. Mustela Furo L.

Franz.: Le Furet. — Ital. Furetto. — Span. Huròn. — Portug. Furaõ. — Barbar. Nimse. — Engl. the ferret. — Schwed. Fret. — Dän. Fritt. — Holl. fret — Frätte, Frettchen, Frette, Frettel, Fredel, Furette, Furettel, Fritt, Frettel, Frettwiesel, Kaninchenjäger, Kaninchenwiesel.

Kennz. d. Art. Weißlichgelb, Wollhaar graulich, die Augen roth, Nase fleischfarbig, Krallen weißlich. Länge 15 Zoll, der Schwanz noch 8 Zoll.

Ganz vom Wuchs des Iltis und wie es gewöhnlich vorkömmt, gleichsam ein Kakerlak desselben. Es ist wenigstens wahrscheinlich, daß das rothäugige Frettchen durch eine lange Cultur in Afrika und Südeuropa zur Abart geworden und darum sich gleichmäßig fortgepflanzt. Indessen ist zu bemerken, daß bisweilen auch Individuen mit schwarzbraunen Haarspitzen seltner mit dergleichen Flecken vorkommen. Fr. Cúvier bildet sogar sein Exemplar ganz braun ab, mit schwarzbraunen Augen. Diese Form dürfen wir deshalb als die Grundart ansehen. Der Geruch des männlichen Frettchen, welches ich lebendig hatte, war stark bisamartig,, allerdings ein etwas anderer als der unangenehmere, den der Iltis verbreitet. Das Frettchen ist wie alle Thiere mit rothen Augen, mehr auf ein Leben im Dunklen angewiesen, tappt in sehr hellen Räumen ängstlich herum und wird erst munter und schneller beweglich in der Dämmerung, während es am Tage meist schläft oder, dem Lichte ausgesetzt, sich Augenentzündung zuzieht. In seinem Naturell gleicht es dem Iltis, obwohl es fast immer als gezähmtes Thier vorkömmt, behält es doch seine natürliche Raubgier und Mordlust gegen kleine Thiere. Von den Sitten des Thieres im wilden Zustande weiß man nichts, und da die Nachricht, daß dasselbe aus Afrika herstamme, wie der Geograph Strabo zur Zeit um Chr. Geb. bemerkt, auch so viel heißen könnte, als daß man eben dort Frettchen zuerst zu erziehen pflegte und sie von da nach Südeuropa gebracht hat, so würde es noch erlaubt sein, daran zu zweifeln, ob überhaupt in Afrika wilde Frettchen vorkämen, welche so beschaffen sind, wie die zahmen, besonders in Beziehung auf die Organisation des Auges. Sehr wahrscheinlich würde das wilde Thier aussehen müssen, wie das von Cúvier abgebildete. Shaw sagt blos man nenne es in Afrika Nimse, ohne von seiner Lebensweise etwas anzugeben. Durch Ehrenberg kennen wir aber den Nims oder Nems als ein anderes Thier, (vgl. unsre 294. 295.) so daß Shaw entweder das Thier verwechselt hat, oder die Afrikaner mehrere ähnliche so nennen. Ungeachtet der langen Cultur ist doch die Zahmheit des Frettchen so gering, daß es nicht einmal seinen Herrn von andern Personen unterscheidet, überhaupt thut es, sich selbst überlassen, kaum mehr als schlafen und fressen. Es bemüht sich sogar, ohne die Freiheit zu kennen, aus seinem Behälter zu entkommen, und wird darum gewöhnlich von Hunden oder Katzen todtgebissen. — Der Zweck, weshalb man schon in der alten Zeit das Frettchen in Afrika erzog, ist die Kaninchenjagd, und zu gleichem Zwecke hält man dasselbe auch im Süden von Europa, in den nördlichen Gegenden selten, weil es gegen Kälte ziemlich empfindlich ist. Man hält die Frettchen am liebsten paarweise in einem Kasten oder einer Tonne mit einem warmen Lager. Auch gesättigt beißen sie noch Kaninchen, Hühner und Tauben todt. Sie beißen die wüthend überfallene Beute ins Genick und lecken gierig deren Blut und Gehirn. Man

Digitized by Google

füttert sie mit Kleie, mit Semmel und Milch, muß ihnen aber mitunter auch Fleisch geben. Bei gekochtem Fleisch werden sie zahmer, sie fressen aber vorzüglich gern Säugthiere, auch Mäuse, selbst Amphibien aller Art, nur mit vorsichtiger Unterscheidung der giftigen Otter. Die Stimme des Frettchens ist nur im höchsten Affecte, besonders im Schmerze, kreischend, gewöhnlich ein schwaches Knurren. Die Jagd auf Kaninchen findet statt vom October bis Ende Februar. Man trägt dabei die Fettchen in einem Korbe mit Moos, treibt die Kaninchen in ihren Bau, verstopft die Eingänge, welche wenig gebahnt sind, legt oben auf die gangbarsten ein Decknetz und stellt Garne um den Bau. Man läßt ein Frett in die Hauptröhre einfahren, worauf die Kaninchen herauskommen und sich in den Netzen fangen oder geschossen werden. Kommt das Frettchen heraus, so muß man es sogleich wieder aufnehmen, außerdem kriecht es in den Bau und legt sich darin zur Ruhe, was überhaupt oft geschieht, wenn es ein Kaninchen darin erwürgt oder angefressen hat. Dieser Umstand macht diese Jagd oft sehr langweilig. Es ist schwer, das Thier so weit zum Gehorsam zu bringen, daß es auf den Pfiff oder Ruf folgt, bleibt es also drin, so hat man nur noch die Hoffnung, es durch ein an einen biegsamen Zweig festgebundenes Kaninchen herauszuziehen, welches man in den Gang einschiebt und das Frettchen anbeißen läßt. Man sucht auch das Erwürgen der Kaninchen dadurch zu verhindern, daß man dem Frettchen die Fangzähne mit der Zange abkneipt und dann glatt feilt. Die Paarung der Frettchen geschieht mit vielem Affecte und die Weibchen sterben bisweilen in dieser Zeit ohne Männchen. Jährlich zweimal bekommen sie 5 — 8 Junge, dann entfernt man das Männchen, da es dieselben gern auffrißt.

336. Das nacktsöhlige Frettchen. Mustela nudipes F. C v.

Kennz. d. Art. Rothgelb glänzend, Kopf und Schwanzspitze ochergelblich, Sohlen nackt. Länge $10\frac{3}{4}$ Zoll. Kopf 2 Zoll 2 L. Schwanz 6 Zoll.

Obwohl Bewohner des heißen Java, doch mit einem sehr dichten Pelz versehen. Das Seidenhaar ist an der Basis gelblich, wie das Wollhaar durchaus. Mr. Diard (bei Cuvier steht durch Druckfehler Diaud) besuchte nach Aufenthalt in Bengalen auch Sumatra und Java und unter seinen zahlreichen Entdeckungen fand sich diese hübsche Art, welche seitdem auch bei Naturalienhändlern vorkommt.

336. Das sibirische Frettchen. Mustela sibirica Pallas.

Franz.: Le Furet de Siberie. — Russ. — Sibir. Kolonnók b. Jassnewskoi Otreg. Krasnik. — Tatar am Jenisei: Kulòn od. Cholon, Berabensi. Jelelak. — Mongol. Saolongcha, Burät. Cholongò. — Tunguf. Nonno. Ostjak. Sojuk. — Keibal. Kusaen; Kamaschin. Kungos; Irinj. Sooosche. — Chines. Ssolò.

Kennz. d. Art. Gelblich-röthlichgelb, unterseits heller, Schnauze schwärzlich, Nase weiß, Sohlen behaart. Länge 1 Fuß, Schwanz $\frac{1}{2}$ Fuß.

Im jenseitigen Sibirien, vom Jenisei nach Osten bis zum Ocean; geht aber nicht über den 60° N.B. hinaus, daher nicht in Kamtschatka und nicht im Lande der Tschuktschen Der Winterpelz sieht sehr hübsch aus, die Priester oder Zauberer der Buräten bedienen sich desselben besonders zu Zauberkleidern, während ihrer Beschwörungen, da sie keine gewöhnlichen Marderpelze tragen dürfen und Zobel für sie zu theuer ist. Das sibirische Frettchen wurde zu Pallas Zeit als Pelz wenig geschätzt und ist erst in neuerer Zeit beachtet worden,

Digitized by Google

wo man es sowohl als Besatz wie auch zur Fütterung der Damenmäntel theuer bezahlt. Der Kürschnername ist: sibirischer oder schwedischer Iltis. Die Felle sind sehr electrisch.

337. 338. Der Tigeriltis. Mustela sarmatica Pall.

Franz.: Le Péruasca Buff., Putois de Pologne Cuv. — Russ. Perewjaeska, Weißruss. Pereguanae und Perewisnik. — Pohln. Przeviaska. — Kalmukk. Tschócha. — Mustela Peregusana Güldenst. —

Kennz. d. Art. Dunkelbraun, über den Rücken und die Seiten gelblich gefleckt, Beine und Schwanzspitze schwarz, eine Binde über die Stirn und die Ohren weiß. Länge 13 — 14 Zoll. Schwanz 6 Zoll.

In Vollhynien, Südrußland, Kleinasien, in der Krimm nicht häufig. Lebt ganz so wie der Iltis und verbreitet auch, aufgereizt, einen ähnlichen Geruch. Er hat ein feines, kurzhaariges Pelzchen, welches die russischen Kürschner Perevoßtschik nennen, und das man häufig zu Mänteln und Kragen benutzt.

339. Das Zügelwiesel. Mustela frenata Lichtenst.

Franz.: Belette à bride blanche. — Mexic. Comadreija, Urunzito, Onzito. —

Kennz. d. Art. Oberseits nebst Schnauze und Schwanz — dessen äußerste Spitze schwarz ist — braun, Stirnbinde und Unterseite weiß. Länge 9 — 11 Zoll. Schwanz 6 — 7 Z. 1⁰ L.

Von der Größe und dem schlanken Baue des Hermelins; der Schwanz ist indeß länger und nur sein äußerster Haarbüschel ist schwarz. Nase, Scheitel und Ohren sind schwarz, letztere sind schmaler und länger als an unsrer einheimischen Art. Die weiße Stirnbinde besteht eigentlich aus einem herzförmigen Stirnfleck, welcher noch einen größeren jederseits zwischen Auge und Ohr berührt. Die Unterseite beginnt rein weiß und verliert sich nach hinten unter ockergelbem Ueberzug. Es findet sich in der Nähe von Mexico, von wo es F. Deppe zuerst mitbrachte.

340 — 344. Das Hermelin, große Wiesel. Mustela Erminea L.

Franz.: L'Hermine, Rosselet. — Engl. the Stoat, im weißen Kleide: the Ermine. — Holl. Hermyn. — Dän. Laekat, Vaesel. — Schwed. Hermelin, Lekat. — Ital. Armellino, Ermellino, Span. Armino. — Port. Arminho. — Russ. Gornostoi. — Tatarisch, auch bei den Sibir. Aass; Bochar. Iiten; Baschkir. Aasz. und Kara, Kujerok, Kirgis. Aktjil. — Mongol. Ujaen od. Ojaen; Burät. Ijing. Kalmukk. Wgin. od. Uejin. — Tunguf. am Jenisei: Daholóki; am Baikal: Jelek; Lamut. Deliki; Jukagirisch: Lukipondscha. — Esth. Nerk; Sirjän. Sjoetbosch; Permines. Tschuschmar; Tschuwasch. Schishejus; Wotjak. Soedbushe od. Teeshmaer; Wogul. Schols, Scholsa, Schaldshi; Ostjak. am Ob: Sass, Ssóss od. Zass. — Samoj. Pije u. Piéku; am Jenisei: Pütschu; Keibal. Kyrroe; Kamaschinz. Kurroe; Laak-Ostjak. Kurre; Samojed. um Turachansk: Pydsku; am Jenisei und die Berg Samojed. Húne u. Chunni; Motor. Hudja. — Kring. am Jenisei: Chullep. — Kamtschadal. Idetsch; westl. Dyitschitsch. — Korák. Imaechtsckak. — Kuril. Tannerüm od. Dahn-Armu (d. h. lange Maus) — Georg. Karkumi (wo jedoch das Thier nach Güldenstädt nicht vorkommen soll). — Mustela Ermineum Pall.

Kennz. d. Art. Schwanz länger als die Beine, gegen das Ende hin schwarz. Länge 9½ — 10 Zoll. Schwanz 3 — 4 Zoll, die Endhaare 1 Zoll.

Ein überaus zierliches, schlank gebautes Thier von veränderlicher Färbung. Im Sommer oberseits schönhell kastanienbraun, unterseits gelblich weiß, Zehen und Ohrensaum weiß; Schwanz so braun wie der Rücken, etwa das letzte Drittheil glänzend schwarz:

Digitized by Google

340. 341. Im Winter wird der ganze Pelz weiß und nur das Schwanzende bleibt unveränderlich ſchwarz: 344. Im Uebergangskleide im Herbſt und Frühling trifft man den Pelz über den Rücken mit bräunlichem Haar gemiſcht oder das Braun über die Rückenlinie zu einem ſchmalen Streifen zuſammengezogen: 342. 343. Man findet aber auch im Sommerpelze Abänderungen, ſo daß ſie in den ſüdlichen und gemäßigten Gegenden mehr röthlichbraun, in den nördlichen mehr dunkelſchwarzbraun vorkommen. Das Hermelin iſt ziemlich weit verbreitet, nicht nur über ganz Europa, ſondern auch über ganz Aſien, vom arktiſchen Ocean bis nach Indien, angeblich auch, im Fall keine Verwechſelung mit ähnlichen Thieren ſtatt fand, auf Java und Borneo. Sichrer findet es ſich auf Kamtſchatka und bis nach Armenien. Pallas erhielt auch Felle von der Inſel Kadiak, bei dem amerikaniſchen Vorgebirge Alaska und aus Amerika ſelbſt, obwohl es auf den näher gelegenen Aleuten und Fuchsinſeln fehlt, ſo daß es vielleicht durch den Beerings-Buſen nach Amerika gekommen ſein dürfte. Die amerikaniſchen werden kleiner angegeben, indeſſen findet ſich auch in Davurien eine kleinere Abart, kaum über ſpannenlang. In den Steppen Rußlands und dem dieſſeitigen Sibirien bis zum Fluſſe Ob ſind ſie ziemlich groß, 7 — 8 Loth ſchwer. Die chineſiſchen Kaufleute nehmen ſie vorzüglich gern, und am Fluſſe Kovyma findet man die größten, ſo ſind auch die, welche die Tſchuktſchen aus Nordamerika bringen. Das Thierchen hält ſich ſowohl in Wäldern auf, als in ſonnigen Steppengegenden, auch um Gewäſſer, in denen es auch nicht ungern ſeine Beute ſucht, da es ſehr gut ſchwimmt. Das Hermelin iſt äußerſt wild, furchtſam, beißig und nicht leicht zähmbar. Die Augen blitzen im Zorne goldgrün und die Stinkdrüſe unter dem Schwanze verbreitet dann den durchdringenden Knoblauchgeruch. Seine Beweglichkeit iſt außerordentlich behende im Laufen, Hüpfen, Springen und Klettern. In Zimmern laufen ſie dann leicht an alle Gegenſtände hinan und ſchlüpfen nur endlich in ein Verſteck, wo man ſie wieder erhalten kann. Die Nahrung, beſteht vorzüglich aus Mäuſen, Ratten, Hamſtern, Kaninchen und jungen Haſen, aus Geflügel und aus Eiern. Ein Hühnerei trägt das Thier unter dem Kinne weg. Auch Amphibien und Fiſche dienen ihm zur Nahrung, ſelten vegetabiliſche Koſt, Obſt und Beeren. Es faßt die Beute bei dem Kopfe und frißt dieſen bei kleinen Vögeln zuerſt, dann den Rumpf ſammt den Federn. Es paart ſich im März und niſtet in Gängen unter der Erde, etwa ſolchen, die es Mäuſen oder andern kleinen Säugthieren abgejagt hat, oder in hohlen Bäumen, wo das Lager einen engen Eingang hat, und mit vielen künſtlichen Fächern ausgezimmert iſt. Pallas fand in einem Fache ganze Mäuſe und Spitzmäuſe aufgehäuft, zwei andre gegenüber, enthielten Mäuſefelle mit Schwänzen und Beinen, und in jeder dieſer beiden Kammern befanden ſich zwei Junge, die etwa 10 — 12 Tage alt ſein mochten, grau und unten weiß ausſahen. Die Excremente der Jungen lagen innerhalb der Kammer, daher ein übler Geruch ſich aus ihr verbreitete. Ihr Geſchrei war dem der jungen Kätzchen ähnlich. Die Alten laſſen ſelten Töne hören, nur etwa wenn ſie gefangen ſind ein Gezwitſcher, ähnlich dem der Ratten. Das Weibchen gebiert 4 — 8 Junge, und begiebt ſich nicht weit vom Neſte hinweg, bemüht ſich auch, einen herbeikommenden Menſchen irre zu leiten, nimmt man aber die Jungen aus, ſo folgt die Mutter ihnen weit nach. Gegen den Herbſt hin beginnt die Härung und der oben beſchriebene Farbenwechſel. Das braune Kleid entwickelt ſich in wärmern Gegenden, wie am kaſpiſchen Meer, ſchon im März, in Sibirien kaum in der Mitte oder zu Ende des Monat Mai. Der Fang geſchieht in Schlingen vor den Gängen oder in Quetſch- oder Schnellfallen; man kann die gewöhnliche Bretterfalle benutzen oder kleine Tellereiſen ſetzen. Der braune Pelz wird nicht ſehr geachtet,

Digitized by Google

dagegen der geschätzte weiße Winterpelz das Thier im Norden zum Gegenstande häufiger Nachstellungen macht. In Rußland machen die Hermelinfelle einen bedeutenden Handelsartikel aus, da dieselben insbesondere für die Ceremonial-Costüme fürstlicher Personen und hoher Beamter verbraucht werden. Das Fleisch ist aber ungenießbar, sogar die Jakuten und Kalmuken, welche sonst das stinkendste genießen, werfen es weg, denn die Stinkmaterie aus den Afterdrüsen durchzieht es sehr bald.

345—349. **Das Wiesel, kleine Wiesel.** **Mustela vulgaris Briss.**

Fronz.: La Belette. — Engl. the weesel, common weesel. Nordengl. Wreasel, Yorkschir. Fitchet, Foumart. Schott. Whitured, Whitret; Whitrick. Angelsächs. Wesle. Welsch. Bronwen; Llosennan Gallt. Neas, Nias, Easog Gernisch: Codna-gwidan; Louennan. — Ital. La donnola; bellora; belloro, ballotula, benula. — Span. Comadreia. Port. Donnha. — Russ. Laska, Lassotschka. — Kasanische Tatar. Lahtschae; Kirgis. Astar; am Jenisei: Zurza u. Tschoel-ass.-(d. h. Wegwiesel., Hermelin.) — Baschkir. Jaeza. Jakut. Mugur Ujen (d. h. Stumpfwiesel Ermineum muticum) od. Kyrr nuss. — Mongol. u. Burät. Unaegin u. Ochotonol; Kalmukk. Tschin u. Kolajosch. — Tunguf. Dsholo. Kitko od. Hulaku-Dshelóki. Jukagir. Alatschawó. — Lappländ. Seibsch; Lett. Schehrus od. Sehrmulis; Esth. Nirk; Permienf. Lassiza; Sirjän. Laschira; Mordvan. Akaskae; Ascheremiss. Kolejuo; Wotjäk. Puhrmak od. Schatko. Wogul. Chorni (Dünnhaarig) od. Charnipui, Ussjak. Charni-Sass; am Flusse Kassi: Tokulab; Surgut. Lyg-pägul u. Kur; Jugan. Lyglykasss; am Flusse: Ketai: Kuaeka; Estell. Tschurum. — Samojeden. Kamaschinz. u. Meter. Aksagas. — Armz. Chulep. Georgian. Dedopala (Königin). — Gemeines Wiesel, Wieselchen, Wieselein, Hauswiesel, Speicherwiesel, rothbraunes, röthliches Wiesel, Heermännchen, Hermiken. — M. Gale Pall.

Kennz. d. Art. Schwanz nicht länger als die Beine, einfarbig (nur einzelne schwarze Haare an der Spitze). Länge 7 Zoll. Schwanz 1½ Zoll.

Das kleinste Raubthier aus dieser Verwandtschaft, auch verhältnißmäßig ist sein Kopf noch kleiner und länglicher gestreckt, die Schnauze weniger abgestumpft, etwas spitzig. Die Schnurren bilden 4 Reihen und sind auch auf dem Winterpelze schwarz. Im Sommer ist der Pelz röthlichbraun, nur die Unterseite gelblich. In einigen Gegenden scheint sich diese Farbe gar nicht zu ändern, in andern wird indessen der Pelz im Winter ganz weiß: 349. und die Uebergänge dazu finden sich wie bei voriger Art: 346. 348. Auf den Warzen über den Augen und am Mundwinkel stehen etwa 4 Haare, auf den an der Kehle 3, alle Warzen sind mit weißlichen Borstchen besetzt (bei dem Hermelin ist eine Borste über jedem Augenlied schwarz). Die Augenliederränder, besonders am vordern Winkel, sind schwarz. Die Augendecke schließt das Auge kaum halb (bei dem Hermelin ganz). Die Iris ist gelbbräunlich, dunkel. Die Lippe ist neben der Nase und unter dem Schnurrbarte weiß, eben so die Innenseite der Beine und ein breiter Längsstreif über dem Bauch. Die Ohren sind kürzer als am Hermelin, fast im Pelze versteckt, an der Oeffnung stehen kreuzweis sich durchflechtende, steifliche Haare bei beiden Arten. An den Halsseiten ist die Nath deutlicher. Der Leib ist sehr dünn und walzig, die Gliedmaßen noch kürzer als am Hermelin. Drei weißliche Borstchen in der Mitte des Oberarms ragen von hinten aus dem Pelze heraus, wie bei dem Hermelin; die Sohlen sind behaarter und die Nägel ganz im Zottenhaar verborgen. — Ebenfalls über Europa und Asien verbreitet, auch bis in die arktischen Gegenden. Man findet es mehr in der Nähe menschlicher Wohnungen, es kommt auch gern in die Häuser und vertilgt die Mäuse in Vorrathskammern und Scheunen, verjagt selbst Ratten aus seinem Revier. Im Käfig gehalten, kann man es zähmen, doch verläßt das beißige Naturell und die Sehnsucht nach Freiheit das Thierchen niemals und es ist so geschmeidig und listig, durch sehr enge Oeffnungen auf eine fast unglaub-

Digitized by Google

Das Thierreich.

Erſter Band.

Säugthiere. Raubthiere.

Erſtes Heft.

1. 2. Der Löwe. Felis leo Linn. *Le lion.*
Mit ſechs Figuren. Race aus der Barbarei.

3. Der Tiger. Felis tigris Linn. *Le Tigre royal.*
Zwei Figuren. Aſien: Bengalen bis Sibirien.

4. Der Löwen-Tiger-Baſtard. Felis leo tigris. *Métis de lion et de tigresse.*
Fünf Figuren. Zucht-Baſtarde.

5. Der Jaguar, amerikaniſche Unze. Felis onça Linn. *Le Jaguar.*
Acht Figuren, im Hintergrunde ein Anfall auf Winſelaffen. Südamerika.

6. Der Panther, Parder. Felis pardus Linn. et G. Cuv. *La panthère.*
Afrika, Weſtaſien bis zum Kaukaſus, Armenien, zum Ararat.

7. Der Leopard. Felis leopardus Schreb. *Le léopard.*
Oſtindien, ſundiſche Inſeln, Afrika.

8. Der Nimr. Felis Nimr H. et E. *Le Nimr.*
Syrien, Arabien, Dongola, Habeſſinien.

9. Der Melas. Felis melas Peron. *Le Mélas.*
Schwarze Abänderung des Leoparden. Sundiſche Inſeln.

10. Der Schildpatt-Tiger. Felis nebulosa Sm. et Griff. *Tigre ondulé.*
Sumatra.

Zweites Heft.

11. Der Ozelot. Felis pardalis Linn. *L'ocelot.*
Südamerika.

12. Die Halsbandkatze. Felis armillata. F. Cuv. *Le chat à collier.*
Südamerika.

13. Die braſilianiſche Katze. Felis brasiliensis F. Cuv. *Le chat du Brésil.*
Braſilien.

14. Die langſchwänzige Katze. Felis macroura Max. N. W. *Le chat tigre à longue queue.*
Braſilien

15. Der Marguai, amerikaniſche Tigerkatze. Felis tigrina Schreb. *Le Marguai.*
Südamerika.

Digitized by Google

16. Der Stahlpanther. Felis chalybeata. Herm. *Panthère chalybé.*
Java, Bengalen.

17. Der Gepard, Jagdleopard, Jagd-Unze. Felis jubata Schreb *Le Guépard, Tigre-chasseur.*
Im Hintergrunde die Jagdabrichtung.
Afrika, Südasien bis an das kasp. Meer und in die Kirgisensteppe.

18. Der Serval, afrikanische Tigerkatze. Felis Serval Schreb. *Le Serval, Chat-tigre.*
Südafrika.

19. Der Chati, die sanfte Katze. Felis mitis Fr. Cuv. *Le Chati.*
Südamerika.

20. Der Kuwud, Javanische Katze. Felis javanensis Horsf. *Chat de Java.*
Java.

21. Der Puma, Kuguar. Felis concolor Linn. *Le Couguar.*
Zwei Figuren und im Hintergrunde die Jagd mit Schlingen. Südamerika und Canada.

22. Die dunkle Katze vom Vorgeb. d. g. Hoffnung. Felis obscura Desmar. *Le Chat noir du Cap de bonne espérance.*
Südafrika.

23. Der Jaguarondi. Felis Yaguarondi La Cep. *Le Yagouarondi.*
Südamerika.

24. Die Nepaulische Katze. Felis nepalensis Horsf. *Chat du Népaul.*
Nepaul.

25. Die kleinpfötige Katze. Felis maniculata Rüpp et Cretzschm. *Chat à pétites pattes.*
Nubien.

26. Die Hauskatze. Felis domestica Briss. *Chat domestique.*
Sechs Figuren. Zucht-Varietät.

27. 28. Die wilde Katze. Felis Catus Linn. *Le chat sauvage.*
Gebirge Europa's.

29. Die bengalische Katze. Felis bengalensis Desmar. *Chat du Bengale, chat du Nepaul* Geoff. et Fr. Cuv.
Bengalen, Nepaul.

30. Die Caffern-Katze. Felis caffra Desmar. *Chat de Cafrérie.*
Caffernland.

31. Der Colocollo. Felis colocollo Molina. *Le colocolo.*
Chili, Surinam.

Drittes Heft.

32. 33. Der Manul, die Steppenkatze. Felis Manul Pall. *Chat Manul.*
In der tartarisch-mongolischen Steppe, südlich am Ural und Altai, Baikal und Mittelasien.

Digitized by Google

34. Der Rimau-bulu, ſumatraniſche Katze. Felis sumatrana Horsf. *Chat de Sumatra.*

Sumatra.

35. Der Hirſchluchs. Felis cervaria Temm. *Le Lynx-cervier.*

Im Norden von Europa, Aſien, und Amerika.

36. Der Fuchsluchs. Felis rufa Güld. *Chat-cervier des fourreurs ou du Canada.*

Im Norden von Amerika und von Schweden.

37. Der mexikaniſche Luchs. Felis maculata Horsf. et Vigors. *Lynx de Mexique.*

Mexico.

38. 39. Der Rothluchs. Felis lynx L. *Le Lynx, Loup-cervier.*

Mitteleuropa.

40. 40b. Der Parderluchs. Felis pardina Ok. *Le lynx-leopard.*

Südeuropa, beſ. Portugall u. Sardinien.

41. Der Caracal. Felis caracal Schreb. *Le caracal.*

Perſien, Arabien, Senegal.

42. 43. Der Stiefelluchs. Felis caligata Bruce. *Le lynx botté ou aux oreilles rouges.*

Afrika, Südaſien.

44. Der nordiſche Luchs. Felis borealis Tem. *Le lynx du nord.*

Im Norden von Europa u. Sibirien.

45. 46. Der Kirmyſchak oder Sumpfluchs. Felis Chaus Güld. *Le lynx des marais.*

Am Kaukaſus, in Perſien, Aegypten.

47. Die Fuchskatze. Felis planiceps Horsf. et Vig. *Chat à tête applatie.*

Sumatra.

48. Der Fennek. Canis Zerda Zimmerm. *Le Renard-Fenec.*

Zwei Figuren. Nordafrika, Nubien (Ambukol, Wüſte-Korti) Dongola.

49. Der großöhrige Fuchs. Canis megalotis Desmar. *Le Renard de Lalande.*

Caffernland.

50—52. Der Nilfuchs. Canis niloticus Geoffr. *Le Renard d' Egypte.*

Weibchen mit Jungen, Männchen ſitzend. Aegypten.

52b. Der Blaßfuchs. Canis pallidus Rüpp. et Cretzschm. *Le Renard paille.*

Afrika: Darfur, Cordofan, Dongola.

53. Der Schmalfuchs. Canis famelicus Rüpp. et Cretzschm. *Le Renard grêle.*

Afrika: Nubien, Cordofan, Dongola.

54—60. Der Birkfuchs. Canis vulpes Linn. *Le Renard ordinaire.*

Digitized by Google

54—57. ein Pärchen mit den Jungen im Felde. 58. 59. ein Pärchen aus der Höhle kommend, das Männchen ſucht Wind. 60. der franzöſiſche Fuchs. —
Europa, Aſien, Amerika.

61. Der Brandfuchs. Canis alopex Linn. *Le Renard charbonnier.*
Europa.

62. 63. Der Pudelfuchs, Steppenfuchs. Canis melanotus Pall. *Le Renard-barbet.*
Südl. Kirgiſenſteppe, Soongarei, am obern Jeniſei.

64. 67. Der Rothfuchs. Canis fulvus Desmar. *Le Renard rouge d' Amérique septentrionale.*
Männchen u. Weibchen mit zwei 30 Tage alten Jungen. Virginien.

68—70. Der Kreuzfuchs. Canis decussatus Geoffr. *Le Renard croissé.*
Ein Paar im guten Pelz, ein drittes Individuum im ſchlechten Sommerpelz. — Nordamerika.

71. Der Grisfuchs, dreifarbige Fuchs. Canis cinereo-argenteus Schreb. *Le renard gris ou tricolor.*
Nord- u. Südamerika.

97. 98. Azara's Fuchs. Canis Azarae Max. Pr. N. W. *Le Renard d' Azara.*
Braſilien und Paraguay.

72. 73. Der Kithfuchs. Canis microtus Rchb. *Le Renard-Kith.*
Hundsbai in Nordamerika.

Viertes Heft.

74—77. Der Eisfuchs, Blaufuchs. Canis lagopus Linn. *Le Renard blanc, bleu.*
Im weißen und im braungrauen Pelz, nebſt zwei Jungen. Im höchſten Norden von Europa.

78. 79. Der Iſatis. (Canis) Isatis J. G. Gmel. *Le Renard Isatis.*
Im höchſten Norden von Europa u. Aſien.

80. 81. Der Silberfuchs. Canis argentatus Schaw. *Le Renard argenté.*
Norden von Aſien u. Amerika.

82. 83. Der Korſak. Canis Corsac Pall. *Le Renard Corsac.*
Tatarei, Mittelaſien.

84. 85. Der Schakal, Goldwolf. Canis aureus Linn. *Le chacal.*
Am Kaukaſus, in Perſien, bis Dalmatien.

86—89. Der Schakal vom Senegal. Canis Anthus F. Cuv. *Le Chacal du Sénégal.*
Die Fig. 87. ähnelt auch 96. Die Jungen ſind Baſtarde mit 92. — Senegal.

90. 91. Der Schakal vom Kap. Canis mesomelas Schreb. *Le chacal du cap de b. esp.*
Südafrika.

Digitized by Google

92. Der bengaliſche Schakal. Canis microurus Rchb. *Le chacal de l' Inde.*

Bengalen.

93. Der ſyriſche Schakal. Canis syriacus H. E. *Le Chacal de la Syrie.*

Syrien.

94. Der Dib oder Sib. Canis lupaster H. E.? *Le chacal Dib.*

Aegypten, Senegal.

95. Der geſcheckte Schakal. Canis variegatus Rüpp. Cretzschm. *Le Chacal tacheté.*

Nubien, Oberägypten.

96. Der Koupara. Canis cancrivorus Desm. *Le chien de bois ou sauvage.*

Im franzöſiſchen Guiana.

97. 98. ſiehe oben nach 71.

Fünftes Heft.

99. Der Mähnenwolf. Canis jubatus Desmar. *Le loup rouge.*

Südamerika.

100. 101. Der ſchwarze Wolf. Canis Lycaon Schreb. *Le loup noir.*

Scheint Abänderung vom gemeinen Wolf. — Pyrenäen, Norden von Aſien und Amerika.

102. 103. Der gewölkte Wolf. Canis nubilus Say. *Le loup pommelé.*

Nordamerika, am Miſſuri.

104. Der ſumatraniſche Wolf. Canis sumatrensis Hardw. *Le loup de Soumatra.*

Im Innern von Sumatra.

105—109. Der gemeine Wolf. Canis lupus Linn. *Le loup.*

Weibchen mit Jungen, Männchen jagend. — Europa, Aſien, Nordamerika.

110. 111. Der Dingo. Canis Dingo Blumenb. *Le chien de la Nouvelle Hollande.*

Neuholland.

Der Hund. Canis familiaris L. *Le chien.*

Die Racen folgen in vier Abtheilungen*). — Cultur-Erzeugniß.

a. Spitzhunde, C. famil. orthotus. *Les chiens-loups.*

112. 113. Der Zigeunerhund. C. zingariorum Walth. *Le chien des Bohémiens.*

Mit den Zigeunern wandernd.

114—116. Der Heide-Spitz. C. campestris Beust. *Le chien champêtre.*

Dabei 116 Baſtard mit Dachshund? — Zuchtvarietät aus dem nördlichen Deutſchland.

*) Einige wenige Hunde welche ich früher ungeachtet aller Bemühung nicht erhalten konnte, ſind zum Theil für eine Supplementtafel zuſammengeſtellt.

Digitized by Google

117—119. Der Pommer, große Spitz. C. pomeranus Gm. *Le chien Pomérien.*
Vgl. 242. 243. Climatische Varietät aus Rußland.

120—121. Der nordische Hund. C. borealis Desmar. *Chien des Esquimaux ou de la Baie de Baffin.*
Climat. Varietät an der Baffinsbai.

122—124. Der sibirische Spitz. C. sibiricus Gm. *Le chien de Sibérie.*
Dazu 124 ein Bastard mit dem Pommer. — Climat. Varietät aus Sibirien.

125—129. Der Hund vom Makenziefluße. C. lagopus Vigors. *Chien de la rivière Makenzie.*
Am Makenziefluße bei den Hasen-Indianern.

130. Der grönländische Hund. C. groenlandicus Bchst. *Le chien de Groenlande.*
Climat. Varietät in Grönland.

131. Der Wolfshund. C. luparius R. *Le chien Loup.*
Zucht-Varietät in Ungarn u. Polen.

132. Der Haußhund, Schäferhund. C. domesticus L. *Le chien de Berger.*
Climatische Varietät vom nördl. Europa ausgegangen.

133. Der Fiaarhund, isländischer Hund. C. islandicus Gm. *Chien d'Islande.*
Uebergangsglied. Climatische Varietät in Europa's Nord-Westen.

Sechstes Heft.

b. Seiden- u. Pudelhunde. C. famil. lasiotus. *Les Epagneuls et barbets.*

134. Der kurzhaarige Seidenhund, Carlshund. C. brevipilis Gm. *Le Gredin.*
Zucht-Varietät aus Frankreich.

135. Der Pyrame. C. (brevipilis) flammeus Bchst. *Le Pyramé.*
Zucht-Varietät aus England.

136. Der kleine Seidenhund, span. Wachtelhund. C. hispanicus Bchst. *Le petit Epagneul.*
Zucht-Varietät aus Spanien.

137. 138. Der Bologneser- oder Maltheserhund. C. melitaeus Linn. *Le Bichon.*
Zucht-Varietät aus Malta.

139. Das Löwenhündchen. C. leoninus Gm. *Le chien-lion.*
Einst aus span. Seidenhund u. Pudel? — Zucht-Varietät aus Südeuropa.

140. Der Zwergpudel. C. aquaticus minor Gm. *Le petit barbet.*
Zuchtvarietät aus dem Süden.

141. 142. Der rauche Pinscher. C. gryphus Desmar. *Le Griffon.*
Aus Mopshund u. Pudel. Zuchtvarietät.

Digitized by Google

143. 144. Der Pudel. C. aquaticus Linn. *Le barbet.*
Hierher noch 247 – 249. Climatiſche Varietät aus der Barbarei.

145. Der orientaliſche Hirtenhund. C. pastoreus Calmuccorum Walth. *Chien de Bercail de l'orient.*
Climatiſche Varietät aus dem Orient.

146. Der deutſche Hirtenhund. C. pastoreus germanicus Walth. *Chien de Bercail allemand.*
Zucht-Varietät aus Deutſchland.

147. 148. Der Calabreſiſche Hund. C. pastoreus calabricus Fitzg. *Chien berger de Naples.*
Zucht-Varietät aus den Abbruzzen.

149. Der Neufoundländer Hund. C. terrae-novae Blumenb. *Le chien de terre neuve.*
Hierher noch 237. 238. Climatiſche Varietät in Neu-Foundland.

150. Der große Wachtelhund, große ſpan. Seidenpudel. C. extrarius L. *L'Espagneul.*
Uebergangsglied. — Climat. Varietät aus Südweſteuropa u. Nordweſtafrika (Spanien Barbarei). Vgl. 245.

c. Wind- und Bluthunde. C. famil. laniarius. *Les levriers et mâtins.*

151—153. Der ägyptiſche od. türkiſche Hund. C. aegyptius Linn. *Le chien turc.*
Climat. Varietät des nordöſtl. Afrika, Aegypten u. Barbarei.

154. Der gemähnte ägypt. od. türk. Hund. C. aegyptius subjubatus. *Le chien turc mêlis.*
Blendling des vorigen mit dem kleinen däniſchen oder Windſpiele.

155. Der zottigöhrige ägypt. od. türk. Hund. C. aegyptius lasiotus. *Le chien turc-gredin.*
Blendling mit dem Carlshunde.

156—158. Das Windſpiel, italiän. Windhund. C. leporarius. *Le levron.*
Climatiſche Varietät aus Italien.

159. 160. Der Irländiſche Windhund. C. grajus hibernicus Bchst. *Le Levrier d'Irlande.*
Climatiſche Varietät aus Irland.

161. Der türkiſche, rauchöhrige Windhund. C. grajus turcicus Gm. *Le Levrier turc.*
Blendling vom vorigen mit dem großen Seidenpudel oder Wachtelhunde.

162. Der ſchottiſche oder rauche Windhund. C. grajus hirsutus s. scoticus Gm. *Le levrier velouté.*
Climatiſche Varietät aus Schottland.

Siebentes Heft.

163. 164. Der ruſſiſche od. zottige Windhund. C. grajus villosus s. rossicus Desmar. *Le levrier russe.*
Climatiſche Varietät aus dem aſiatiſchen Rußland.

Digitized by Google

165. Der Harlekin od. kleine däniſche Hund. C. variegatus Gm. *Le petit Danois.*
Climat. Varietät des nördl. Mitteleuropa, aus Dänemark.

166. 167. Der große däniſche Hund. C. danicus Bchst. *Le grand Danois.*
Climatiſche Varietät aus Dänemark.

168. Der Laufhund, Rennhund, leichte Curshund. C. cursorius Gm. *Le Courant.*
Blendlingsrace vom großen däniſchen und großen Windhunde.

169. Der Irländiſche Hund. C. iricus. *Le mâtin d'Irlande.*
Zucht-Varietät in Irland.

170—172. Der Fleiſcherhund, Metzgerhund, Hofhund, Bauernhund. C. laniarius Gm. *Le Mâtin.*
Climatiſche Varietät des ſüdweſtlichen Europa, und Frankreich.

173. 174. Der Saurüden. C. aprinus Gm. *Le Mâtin-Cochon.*
Zucht-Varietät aus Deutſchland.

175. Der Saufinder, Saubeller. C. suillus Gm. *Le Mâtin-cochonnier.*
Zucht-Varietät aus Deutſchland.

d. Jagdhunde. Can. famil. sagax. *Les Dogues.*

176. Der Dachshund. C. vertagus Ray. *Le Basset. The Turnspit.*
Echte Race mit krummen Beinen u. dickem Schwanz.

177. 178. Der Dachshund mit dem Schweinsſchwanze. C. vertagus syosurus. *Le Basset à queue de cochon.*

179. Brauner Dachshund. C. vertagus brunneus. *Basset brun.*

180. Geſtreifter Dachshund. C. vertagus striatus. *Basset strié.*
Baſtard vom engl. Hund (No. 225.) und Dachshund.

181. Bunter Dachshund, Porzellanſchecke. C. vertagus varius. *Basset varié.*
Baſtard vom Hühnerhund u. Dachshund.

182. Langhaariger Dachshund. C. vertagus longipilis. *Basset vélu.*
Baſtard vom Pudel u. Dachshund.

183. Zottiger Dachshund. C. vertagus villosus. *Basset touffu.*
Baſtard vom Seidenhunde u. Dachshunde. Vgl. No. 246. —

184. 185. Geradbeiniger Dachshund. C. vertagus rectipes. *Basset à jambes droites. Turnspit with the fore legs straights.*

186. Bärtiger Dachshund. C. vertagus barbatus. *Le Terrier. The Terrier.*
Baſtard aus Schäferhund und Dachshund. Engliſche Race.

187. 188. Der glatte Pinſcher. C. vertagus gracilis. *Basset grêle.*
Baſtard aus Mops u. Dachshund.

Digitized by Google

Achtes Heft.

189. 190. Der dünnſchnautzige Jagdhund. C. venaticus conirostris. *Le chien de chasse, chien courant. The Hound.*
Urſprünglich engliſche Zugt.

191. Der ſchottiſche Jagdhund, Schweißhund. C. venat. conir. scoticus. *The scotish Hound, Bloodhound.*
Schottiſche Zucht.

192. Der engliſche Fuchshund. C. venat. conir. vulpicapus. *The Fox-hound.*
Schlankere engliſche Raçe.

193. 194. Der Waſſer-Jagdhund. C. venat. conir. aquatilis. *The water-hound.*
Zuchtvarietät aus Pudel oder großem Wachtelhunde und Jagdhunde aus England.

195. Der dickſchnautzige Jagdhund, Hühnerhund, vorſtehende Hund. C. venat. crassirostris major. *The setter.*
Deutſche Zuchtvarietät. Der Dreſſur nach kann dieſer ſo wie mehrere der benachbarten auch Hühnerhund ſeyn.

196—203. Die Bracke. C. venat. bracca. *Le braque. The Harrier, Dalmatian Hound.*
Zuchtvarietät. 196 die corſikaniſche Bracke. 198 und 200 die raguſaniſche oder dalmatiniſche Bracke, fälſchlich ſog. bengaliſcher Hund. 197, 199, 201 und 202 franzöſiſche Bracken.

204—208. Der eigentliche Hühnerhund. C. venat. crassir. avicularius s. medius. *The pointer.*
Zucht aus dem nördlichen Italien entſprungen.

209. 210. Der Stöberhund. C. venat. crassir. irritans s. minor. *Le chien de quête, requerant.*
Zucht aus Dachshund und Hühnerhund.

211—213. Der engliſche Parforçehund und **213** der Leithund. C. venat. crassir. anglicus. *Le chien de chasse parforce anglais. The english Hound.*
Zuchtvarietät vom engliſchen Hunde (226) und Jagdhunde (189—90).

214—216. Der Mops, Mopſel, Steindogge. C. fricator. *Le doguin. The Pug Dog.*
Baſtard des kleinen däniſchen Hundes und Bullenbeißers, jetzt ſelten geworden.

217. Der Baſtardmops, Rocket. C. hybridus. *Le roquet. The Bastard-pug.*
Aus Mops mit kleinem däniſchen Hund.

218. Der Bullenbeißer, Bärenbeißer, Wachthund. C. molossus. *Le dogue. The Bull Dog.*
Nordweſtlich-europäiſch, aus England.

219. Die Doppelnaſe, Haſenſcharte. C. molossus nasica. *Le double nez.*
Zuchtvarietät.

220. 221. Der rundköpfige Bullenbeißer, Rundkopf. C. molossus orbicularis. *Le dogue à tête ronde.*
Deutſche Zucht.

Digitized by Google

222—224. Der thibetaniſche Bullenbeißer. C. molossus thibetanus. *Le dogue de Thibet. The Thibetan Dog.*
Aus Diggarſchee, der Hauptſtadt von Thibet, von Broderip an Wallich, von dieſem an den König von England, von dieſem an die zoologiſche Geſellſchaft in London gegeben.

Neuntes Heft.

225. Der engliſche Hund, engliſche Dogge, ſchwerer Hetzhund. C. mastivus. *Le dogue de forte race. The Mastiff, Mastive or Bande Dog.*
Engliſche Zucht, ſoll vom Bullenbeißer und Fleiſcherhund oder Bullenbeißer und großen däniſchen Hunde abſtammen.

226. Der alt-engliſche Hund, alt-engliſche Dogge. C. mastiv. albionensis. *The Old-english Dog.*
Zucht in Alt-England.

227. Der däniſch-engliſche Blendling. C. danico-mastivus. *The danish-english Dog.*
Zuchtvarietät aus dem großen däniſchen und engliſchen Hunde.

228. 229. Der Cuba-Hund, cubaniſche Dogge. C. mastiv. cubanus. *Le dogue de Cuba. The Cuban mastiff.*
Von der Inſel Cuba, wahrſcheinlich aus Bullenbeißer und engliſcher Dogge entſtanden.

230—236. Der engliſche Kampfhund, Box-Hund. C. mastiv. gladiator. *The Box Dog.*
Engliſche Zucht (wölfte in Dresden).

237. 238. Siehe oben 149.

239—241. Der St. Berhardshund. C. Sancti Bernhardi. *Le dogue de St. Bernard. The Dog of St. Bernhard.*
Vormalige Zucht im Kloſter auf dem St. Bernhard.

242. 243. Siehe oben 119. b.

244. — — 133. b.

245. — — 150. b.

246. — — 183. b.

247. — — 144. b.

248. 249. — — 144. c. d.

250. 251. Der Simir, Hyänenhund. Lycaon pictus Ehrb. *Le chien hyénoide* G. Cuv.
Am Vorgebirge der guten Hoffnung, in den Wüſten Corti und Cordofan.

252. Die braune Hyäne. Hyaena brunnea Thnb. *Hyène brune* Fr. Cuv.
H. villosa Smith. In Strandgegenden am Vorgebirge der guten Hoffnung.

253. Die röthliche gefleckte Hyäne. Hyaene crocuta var. rufa Fisch. *Hyène tachetée rouge.* Südafrika.

254. Die bräunliche gefleckte Hyäne. Hyaene crocuta Zimmerm. *Hyène tachetée* G. Cuv. Südafrika.

Digitized by Google

255—257. Die geſtreifte Hyäne. Hyaena striata Zimmerm. *Hyène rayée* G. Cuv.

Weſtliches Aſien, nördliches Afrika.

Zehntes Heft.

258. 259. Die Zibeth-Hyäne. Proteles Lalandii Is. Geoffr. *Le Protele de Delalande, Civette hyénoïde ou Genette hyénoïde.*

Im Caffernlande.

260—262. Die Civette, afrikaniſche Zibethkatze. Viverra Civetta Schreb. *La Civette.*

Männchen: 261. Weibchen 260 und 262. Südafrika.

263. Der Zibeth, die oſtindiſche Zibethkatze. Viverra Zibetha Linn. *Le Zibeth.*

Oſtindien: Malabar, Siam, Java, Sumatra, Philippium.

264—266. Die Raſſe, oſtindiſche Genette. Viverra indica Geoffr. *Genette Rasse.*

266: ein Junges. Oſtindien, Java.

267—269. Die gemeine Genette, Genetkatze. Viverra Genetta Linn. *Genette de Barbarie ou Genette commune.*

269: ein Junges. Barbarei, Südfrankreich, Spanien.

270. Die dünnſchwänzige Genette. Viverra leptura Rchb. *Genette à queue grêle.*

Senegal.

271. Die ſenegaliſche Genette. Viverra senegalensis Fr. Cuv. *Genette du Sénégal.*

Senegal.

272. 273. Die Panther-Genette. Viverra pardina Is. Geoffr. *Genette panthérine.*

272 iſt eine graue Abänderung. Senegal.

274. Die Foſſane. Viverra Fossa Schreb. *La Fossane.*

Madagaskar.

275. Die Genette von Malacca. Viverra malaccensis Linn. *Genette de Malacca.*

Malacca.

276. Die ſchwarzgeſchwänzte Genette. Viverra melanura Rchb. *Viverre à queue noire* Cuv.

Uebergang zu **Paradoxurus**, vgl. No. 304 – 306. Oſtindien.

277. Die getiegerte Viverre. Viverra tigrina Schreb. *Viverre tigrée.*

Das Schreberſche Thier. Südafrika.

278. Die geſtreifte Viverre. Viverra fasciata Gmel. *Genette rayée de l'Inde.*

Küſte Koromandel.

279. 280. Das liſtige Katzenfrett. Bassaris astuta Lichtenst. *Bassare rusée.*

Mexico.

Digitized by Google

281. 282. Der Zorill vom Cap. Mephitis Zorilla Lichtst. *La Zorille.*

Südafrika.

283. 284. Der Zorill vom Senegal. Mephitis Zorilla? senegalensis. *La Zorille du Sénégal.*

Senegal.

285. Der Conepatl. Mephitis Conepatl Fisch. *Le Conepatl.*

Buenos-Ayres, Chile, Patagonien.

286. Der Chinche. Mephitis Chinche Tiedem. *Le Chinche, Mouffette.*

Chili, Louisiana bis Nordamerika.

287. Der Chinche, Abänderung. Mephitis Chinche, varietas. *Mouffette de l'Amerique septentrionale, variété.*

Luisiana.

288. Das chilesische Stinkthier. Mephitis chilensis Geoffr. *Moufette du Chili* Buff.

Chili.

289. Der Mapurito. Mephitis Mapurito Less. *Le Mapurito.*

Neu Granada, bei Pamplema und St. Fé de Bagota.

290. Der Skunk, Polekat. Mephitis Putorius Tied. *Le Polécat.*

Nordamerika.

291. Der graue Ichneumon. Mangusta grisea Fisch. *Ichneumon gris.*

Ostindien, Ost-Afrika.

292. Der egyptische Ichneumon. Herpestes Ichneumon Illig. *Ichneumon.*

Egypten.

293. Der Ichneumon von Malacca. Herpestes malaccensis Fr. Cuv. *Mangouste de Malacca* Desmar.

Malacca, bei Pondichery.

294. 295. Der Nims, weißgeschwänzte Ichneumon. Herpestes leucurus. H. E. *Mangouste à queue blanche.*

295 ist das junge Thier. Nubien: Dongola.

296. Der Ichneumon aus Java. Herpestes javanicus Desmar. *Mangouste de Java.*

Ostindien, Java.

297. Der Mungo. Herpestes Mungo Desmar. *Mangouste de l'Inde* Buff. *Mangouste à bandes* F. Cuv.

Ostindien.

298. Der Vanfire. Herpestes (Atilax Fr. Cuv.) Galera Desmar. *Vansire.*

Madagaskar, Isle de France.

299. Der Mangue. Crossarchus obscurus Fr. Cuv. *Mangue.*

Westküste von Afrika.

300. Der Coase. Crossarchus? Coase (Schreb.) *Coase* Buff.

Zweifelhaftes Buffon-Schreberſches Thier, vielleicht eins mit 325? — Vaterland ungewiß.

Digitized by Google

301—303. Der Zenik, die Surikate. Ryzaena Zenik Linn. *Zenik, Suricate.*

Südafrika.

Zehntes Heft. *)

304—306. Das Rollschwanzthier, Palmenmarder. Paradoxurus typus Fr. Cuv. *Le Paunougou-Pouné, Pougouné, la Martre des Palmiers.*

Java, Sumatra, Pondichery.

307—309. Der Steinmarder, Hausmarder. Mustela Foina Linn. *La Fouine.*

In Europa und Asien bis zur Provinz Jsek.

310—315. Der Baummarder. Mustela Martes Linn. *La Marte commune.*

In Europa und Asien bis zu den werchotur. Gebirgen und der Provinz Jsek.

316—318. Der gelbkehlige Marder. Mustela flavigula Bodd. *Marte à gorge jaune.*

318. blaße Varietät: *M. Hardwikii* Horsf. Ostindien, Nepaul.

319—321. Der Huronen-Marder. Mustela Huro Fr. Cuv. *La Marte des Hurons.*

321. in weißlichgelbem Winterpelze. Hierher vielleicht *M. leucopus* Kuhl., *Goodmani* Fisch., *rufa* Groffr., *vulpina* Rafin. als Varietäten dieser wandelbaren Art. **)

Canada, Pennsylvanien.

322. 323. Der Pekan. Mustela canadensis Schreb. *Le Pekan.*

Nordamerika.

324. Der Zobel. Mustela Zibellina Linn. *La Zibéline, Marte Zibéline.*

Sibirien und Mittelasien, nur als Ueberläufer diesseits des Ural.

325. Der Biſon. Mustela Vison Linn. *Le Vison.*

Canada, Nordamerika überhaupt.

326. 327. Der Nörz, Mink. Mustela Lutreola Linn. *Le Noerz, Mink.*

Norden von Europa und Asien, ganz Rußland bis zum Ural, Schlesien.

328—330. Der Jltis. Mustela Putorius Linn. *Le Putois commun.*

Im gemäßigten Europa.

331. 332. Der Eversmannsche Jltis. Mustela Putorius *β.* Eversmanni Fisch. *Le Putois Eversman.*

Rußland, im Gouvernement Orenburg und Bucharei.

333. 334. Das Frett, Frettchen. Mustela Furo Linn. *Le Furet.*

Nordafrika.

335. Das nacktsohlige Frettchen. Mustela nudipes Fr. Cuv. *Le Furet de Java F. C.*

Java.

---

*) Zu der Gattung der Stinkthiere, *Mephitis*, vergleiche man die Nachträge.

**) *Mustela leucotis* findet sich schon auf den Supplementtafeln.

Digitized by Google

336. Das ſibiriſche Frettchen. Mustela sibirica Pall. *Le Furet de Sibérie.*

Sibirien, jenſeits des Jeniſei.

337. 338. Der Tigeriltis, das ſarmatiſche Wieſel. Mustela sarmatica Pall. *Le Perouasca Buff. Le Putois de Pologne Cuv.*

337. das junge Thier. Süd-Rußland: Bithynien, zwiſchen der Wolga und dem Don.

339. Das Zügel-Wieſel. Mustela frenata Lichtst. *Belette à bride blanche.*

Mexico.

340—344. Das große Wieſel, Hermelin. Mustela Erminea Linn. *L'Hermine* ou *le Roselet.*

340. 341. Sommerkleid. 342. 343. Uebergangskleid im Herbſt und Frühling. 344. Winterkleid. Im nördlichen und gemäßigten Europa und Aſien bis Indien.

345—349. Das kleine Wieſel, Heermännchen. Mustela vulgaris Briss. *La Belette.*

345. 346. 347. gewöhnliches Kleid. 348. Uebergangskleid. 349. M. nivalis Linn. weiße Varietät.

350—352. Die gemeine Fiſchotter. Lutra vulgaris Erxl. *La Loutre commune* ou *d'Europe.*

Europa und Aſien.

353. 354. Die canadiſche Fiſchotter. Lutra canadensis Fr. Cuv. *Loutre du Canada.*

354. das Junge. Canada.

355. Die braſilianiſche Fiſchotter. Lutra brasiliensis Raj. *Loutre du Brésil, d'Amerique G. Cuv.*

Braſilien, Guiana.

356. Die Brillen-Fiſchotter. Lutra leptonyx Horsf. *Le Simung, Loutre à lunettes.*

Sumatra.

357. Die Meer-Fiſchotter. Lutra lutris Fr. Cuv. *La Loutre du Kamtschatka.*

Kamtſchatka und nordamerikaniſche Inſeln.

358. Die Nirnaier-Fiſchotter. Lutra Nair Fr. Cuv. *La Loutre Nirnaier* ou *Nir-Nayie.*

Pondichery.

359. Die gefleckthalſige Fiſchotter. Lutra maculicollis Lichtst. *La Loutre à gorge tachetée.*

Südafrika.

360. Die krallenloſe Fiſchotter. Lutra inunguis Fr. Cuv. *Loutre dépourvue des ongles, Aonyx Delalande.*

Südafrika.

Eilftes Heft.

361. Steller's Seeotter. Enydris Stelleri Fisch. *La Loutre de Steller.*

An den Küſten und auf den Inſeln zwiſchen Aſien und Amerika, 50—56° N. B.

Digitized by Google

362. 363. Forſter's Ohrenrobbe, Forſter's Seebär. Otaria Forsteri Less. *Otaire Forster.*

In den antarctiſchen Meeren.

364. Der Bärenrobbe, Seebär. Otaria ursina Desmar. *Otaire ours marin.*

Kamtſchatka.

365. Der Bullenbeißer-Ohrenrobbe. Otaria molossina Lesson. *Otaire Molosse.*

Maluinen-Inſeln.

366. 367. Der kleine Ohrenrobbe. Otaria pusilla Desm. *Petite Otaire.*

Am Vorgebirg der guten Hoffnung.

368. 369. Der gemähnte Ohrenrobbe, Seelöwe. Otaria jubata Desm. *Otaire Lion marin Buff.*

Im ſtillen Meere, Küſte von Patagonien, Beeringsſtraße.

370—372. Der Elephantenrobbe, See-Elephant. Macrorrhinus proboscideus Fr. Cuv. *Macrorhin éléphant marin, Phoque à trompe.*

Auf wüſten Inſeln am antarctiſchen Pol.

373. 374. Der Mönchsrobbe, Seemönch. Phoca Monachus Herm. *Phoque à ventre blanc Buff. Phoque moine Fr. Cuv.*

Im mittelländiſchen Meere.

375. Der weißkrallige Robbe. Phoca leucopla Thien. *Phoque à ongles blancs.*

Island.

376. 377. Der Bartrobbe. Phoca barbata Müll. *Phoque à barbe, grand phoque Buff.*

In den arctiſchen Meeren und Amerika.

378—382. Der grönländiſche Robbe. Phoca groenlandica Müll. *Phoque de Grönlande, Phoque à croissant.*

Im nördlichen Ocean und Amerika.

383. 384. Der Greif-Robbe. Phoca Gryphus Fabr. (hispida Schreb.) *Phoque Neitsoak Buff.*

Grönland, Island, am baltiſchen Meere.

385—388. Der Seehunds-Robbe, Seehund, Seekalb. Phoca vitulina Linn. *Veau marin, Phoque commun.*

An den nördlichen Küſten von Europa und Amerika.

389—392. Der Ringel-Robbe. Phoca annelata Nilss. *Phoque annelé.*

Oſtſeeküſten, Grönland, Island, Norwegen, Schweden.

393. Der zweifarbige Robbe. Phoca discolor Fr. Cuv. *Phoque discolor.*

Küſte von Frankreich.

Digitized by Google

Zwölftes Heft.

394. Der Eilands-Robbe. Phoca scopulicola Th. *Phoque scopulicole.*

Eilande bei Island.

395. Der dünnkrallige Robbe. Phoca leptonyx Blaino. *Phoque leptonyx.*

Maluineninseln, Neugeorgien.

396. Der Klappmützen-Robbe. Phoca cristata Erxl. *Phoque à bonnet.*

Küsten Grönlands.

397—401. Das Wallroß. Trichecus Rosmarus Linn. *Morse* ou *la Vache marine* Buff.

Eismeer.

402—404. Der gemeine Bär. Ursus arctos Linn. *L'ours brun d'Europe.*

Auf hohen Waldgebirgen Europa's.

405. Der sichelkrallige Bär. Ursus falciger Rchb. *L'ours aux ongles en faucille.*

Pyrenäen?

406. Der Halsbandbär. Ursus collaris Fr. Cuv. *L'onrs à collier, l'ours de Sibérie.*

Sibirien.

407. Der Pyrenäen-Bär. Ursus pyrenaicus Fr. Cuv. *L'ours des Asturies, des Pyrenées.*

Pyrenäen.

408. 409. Der Cordilleren-Bär. Ursus ornatus Fr. Cuv. *L'ours des Cordilières du Chili.*

Cordilleras in Südamerika.

410. Der amerikanische schwarze Bär, Baribal. Ursus americanus Pall. *L'ours noir d'Amérique.*

Nordamerika.

411. Der wilde Bär. Ursus ferox Lew. et Clark. *L'ours feroce.*

Nordamerika, am Missuri.

412. Der thibetanische Bär. Ursus thibetanus Fr. Cuv. *L'ours du Thibet.*

Sylhet-Gebirge in Ostindien.

413. Der syrische Bär. Ursus syriacus H. E. *L'ours du Syrie.*

Libanon.

414. 415. Der Eisbär. Ursus maritimus Linn. *L'ours polaire, de la mer glaciale.*

Eismeer.

416. Der malayische Bär. Ursus malayanus Raffl. *L'ours des Malais.*

Sumatra, Borneo, Java, Malacca.

Digitized by Google

417. Der Ringkragen-Bär. Ursus euryspilus Horsf. *L'ours de Borneo.*
Nach Horsfield nicht Abänderung des vorigen. Borneo.

418. Der Lippenbär. Ursus labiatus Blainv. *Le Jongleur, Bateleur, Ours aux grandes lèvres.*
Ostindien.

419. 420. Der labradorische Dachs. Meles labradoria Sab. *Le Blaireau du Labrador, le Carcajou.*
Labrador.

421. 422. Der gemeine Dachs. Meles Taxus Schreb. *Le Blaireau.*
Europa, Asien.

Dreizehntes Heft.

423. 424. Der Stinkdachs. Mydaus meliceps Fr. Cuv. *Le Télagon.*
Java, Sumatra.

425. Der Balisoar. Arctonyx collaris Fr. Cuv. *Le Bali-soar.*
Baracpour in Ostindien.

426. 427. Der Honigvielfraß. Gulo capensis Desm. (Ratelus mellivorus Vigors.) *Le Ratel, le blaireau puant.*
Südafrika, Cap.

428. Der Grison. Gulo vittatus Desm. *Le Grison.*
Südamerika.

429. Der Taira. Gulo barbarus Desm. (*falso* barbatus). *Le Taïra.*
Brasilien, Paraguay.

430. 431. Der nordische Vielfraß. Gulo arcticus Desm. *Le glouton, wolverene.*
Norden von Europa, Asien und Amerika.

432. 433. Der Waschbär. Procyon lotor Storr. *Le Raton.*
Nordamerika.

434. Hernandez's Waschbär. Procyon Hernandezii Wagl. *Le Raton Hernandez.*
Mexico.

435. Der Krabbenfresser. Procyon cancrivorus Illig. *Le Raton crabier, l'Agouara popé d'Azara.*
Südamerika.

436—440. Das dunkelbraune Nasenthier. Nasua fusca Desm. *Le Coati brun.*
Südamerika.

441—443. Das rothbraune Nasenthier. Nasua rufa Desm. *Le Coati roux.*
Südamerika.

444. Der schwarze Bärenmarder. Arctitis atra Temm. *Le Benturong noir.*
Malakka.

Digitized by Google

445. Der graue Bärenmarder. Arctitis albifrons Temm. *Le Benturong gris.*

Malakka, Sumatra, Java.

446. Der Katzenbär. Ailurus fulgens Fr. Cuv. *Le Panda, Chitwa.*

Himalaia.

447. 448. Der Kinkajou, Poto. Cercoleptes caudivolvulus Illig. *Le Kinkajou Buff. Le Poto* ou *Manivari du Rio Negro.*

Brasilien.

449. Der Tupaja. Tupaia ferruginea Raffl. *Le Tupaia Press, le Press.*

Sumatra.

450. Der Tana. Tupaia Tana Raffl. *Le Tana.*

Sumatra.

451. Der Banxring. Tupaia javanica Horsf. *Le Banxring, Sinsring* ou *Cerp.*

Java.

452. 453. Der Igel. Erinaceus europaeus Linn. *L'hérisson commun.*

Europa.

454. 455. Der Ohr-Igel. Erinaceus auritus Pall. *L'herisson à longues oreilles.*

Astrakan, am Baikal, Aegypten.

456. Der ungeschwänzte Borstigel. Centetes ecaudatus Illig. *Le Tanrec Buff. Tenrec Desmar. Tendrac Cuv.*

Madagaskar.

457. Der geschwänzte Borstigel. Centetes setosus Illig. *Le Tendrac Buff. Tenrec Cuv.*

Madagaskar.

458. Der gestreifte Borstigel. Centetes semispinosus Illig. *Le Tenrec rayé.*

Madagaskar.

Vierzehntes Heft.

459. Der Rafflesische Nacktschwanz. Gymnura Rafflesii Less. *Gymnure Raffles.*

Malakka.

460. Smith's Zartrüssel. Macroscelides typus Sm. (Dipus?) *Macroscélide type Less.*

Rhinomys jaculus Lichtst. Vorgebirg der guten Hoffnung.

461. Der Desman, russische Moschusratte. Myogalea moschata Fisch. *Le Desman.*

Südrußland.

462. Die pyrenäische Moschusratte. Myogalea pyrénaica Fisch. *Le Desman des pyrenés.*

Bei Tarbes am Fuße der Pyrenäen.

Digitized by Google

463. Der dünnschwänzige Sternrüssel. Condylura cristata Desm. *Condylure (Taupe) à museau étoile du Canada* Cuv. Rhinaster Wagl. Nordamerika.

464. Der dickschwänzige Sternrüssel. Condylura macrura Harl. *Condylure à museau étoile et à queue grosse.* New-Jersey.

465—467. Der grünliche Goldmaulwurf. Chrysochloris aurata Cuv. *Chrysochlore doré du Cap.* Vorgebirg der guten Hoffnung.

468. Der gelbliche Goldmaulwurf. Chrysochloris holosericea Lichtst. *Chrysochlore à soie.* Caffernland.

469. Der Wassermaulwurf. Scalops aquaticus Fisch. *Scalope du Canada.* Canada bis Virginien.

470. 471. Der gemeine Maulwurf. Talpa europaea Linn. *La Taupe commune.* Europa.

472. 473. Gelbliche Abänderung des gemeinen Maulwurfs. Talpa europaea flavescens. *La taupe, variété jaunâtre.* Aus Sachsen.

474. 475. Der blinde Maulwurf. Talpa coeca Savi. *La taupe aveugle.* Toskana, Unteritalien, Südfrankreich, Griechenland? —

476. 477. Die weißzähnige Spitzmaus. Sorex leucodon Herm. *Musaraigne aux dents blanches, le leucode.* Deutschland, Frankreich.

478—480. Die gemeine Spitzmaus. Sorex araneus Linn. *Musaraigne commune, Musette.* Europa.

481. Die hetruriſche Spitzmaus. Sorex hetruscus Savi. *Musaraigne de Toscana.* Toskana.

482. Die Zwerg-Spitzmaus. Sorex pygmaeus Laxm. Pall. (minutus Linn.) *Musaraigne naine.* Asiat. Rußland, Schlesien, Mecklenburg.

483. Die kantenschwänzige Spitzmaus. Sorex tetragonurus Herm. *Musaraigne carrelet* ou *à queue tetragone.* Deutschland, Frankreich.

484. 485. Die plattschwänzige Spitzmaus. Sorex constrictus Herm. *Musaraigne à queue applatie, le Plaron.* Deutschland, Frankreich.

486—488. Die Ruder-Spitzmaus. Sorex remiser G. St. Hil. *Musaraigne porte-rame.* Deutschland, Frankreich.

Digitized by Google

489. 490. Die Waſſerſpitzmaus. Sorex Dauventonii Erxl. (fodiens Pall.) *Musaraigne d'eau.*

Europa.

491. Varietät der Waſſerſpitzmaus. Sorex Dauventonii Var. *Musaraigne d'eau, variété.*

Sachſen.

492. Die Maulwurf-Spitzmaus. Sorex talpoides Gapp. *Musaraigne taupe.*

Ober-Canada.

493. Die hübſche Spitzmaus. Sorex pulchellus Lichtst. *Musaraigne jolie.*

Kirgiſenſteppe: Bucharei.

494. Forſter's Spitzmaus. Sorex Forsteri Gapp. *Musaraigne Forster.*

Ober-Canada.

495. Die Masken-Spitzmaus. Sorex personatus G. St. Hil. *Musaraigne masquée.*

Nordamerika.

496. Die Mausſchwanz-Spitzmaus. Sorex myosurus Pall. *Musaraigne à queue de souris.*

Vaterland?

497. Güldenſtädt's Spitzmaus. Sorex Güldenstaedtii Pall. *Musaraigne Güldenstaedt.*

Caucaſien, Georgien.

498. Die wohlriechende Spitzmaus. Sorex suaveolens Pall. *Musaraigne parfumée.*

Krimm.

499. Gmelin's Spitzmaus. Sorex Gmelini Pall. *Musaraigne Gmelin.*

Perſien.

Fünfzehntes Heft.

500. Die Cap-Spitzmaus. Sorex capensis G. St. Hil. *Musaraigne du Cap de bonne ésperance.*

Cap.

501. Die gelbliche Spitzmaus. Sorex flavescens G. St. Hil. *Musaraigne blonde.*

Cap.

502. Die Rieſenſpitzmaus. Sorex giganteus G. St. Hil. *Musaraigne géant.*

Oſtindien, balſamirt in Aegypten.

503. 504. Die zimmtbraune Spitzmaus. Sorex cinnamomeus Lichtst. *Musaraigne couleur de canelle.*

Caffernland.

505. Die dickſchwänzige Spitzmaus. Sorex crassicaudus Lichtst. *Musaraigne à queue grosse.*

Aegypten.

Digitized by Google

Es folgen die zur Vervollständigung nothwendigen Supplementplatten.

506. Der Löwe vom Senegal. Felis leo var. Senegalensis. *Le lion du Sénégal.*
Vgl. Naturgeschichte S. 2. Senegal.

507. Der asiatische Löwe. Felis leo var. asiaticus. Jard. *Le lion d'Asie.*
Vgl. „der Löwe in Persien" Naturg. S. 2. Arabien, zwischen dem Indus und Persien, Bengalen.

508. Der Löwe von Guzarat. Felis leo Guzaratensis. *Le lion du Guzarat.*
Vgl. „Löwe ohne Mähne" Naturgesch. S. 29. Guzarat.

509. 510. Löwentigerbastarde. Felis leo-tigris. *Metis de lion et tigresse.*
Vgl. Naturgesch. S. 28. und Abb. 4. — 509. ein Männchen starb in Leipzig 1834, 510 ein Weibchen, lebte in Atkins Menagerie in London.

511. Weißer Tiger. Felis tigris var. alba. *Le tigre blanc.*
Vgl. Naturgesch. Nachtrag. Lebte in der Menagerie zu Exeter Change.

512. Der Irbis, die persische Unze. Felis Irbis Müll. (F. uncia Buff. Schreb. ex parte.) *L'Irbis, l'Once.*
Vgl. S. 40 und Nachtrag. Persien. Sibirien.

513. Der gewölkte Tiger. Felis nebulosa Smith. *Le tigre pommelé.*
Vgl. S. 42 und Nachtrag. China.

514. Der Nimr. Felis Nimr H. E. *Le Nimr.*
Vgl. S. 38. Supplement zu Abb. 8.

515. 516. Der wahre Leopard. Felis leopardus Schreb. *Le Leopard.*
Vgl. S. 37. Characteristische Abbildungen von Griffith und Fr. Cuvier, letztere von diesem als Panther gegeben.

Sechszehntes Heft.

517. Der eigentliche Ozelot. Felis pardalis Linn. *L'Ocelot Linnée.*
Vgl. Naturg. S. 42 und Nachtrag. Mexico.

518. Hamilton's Ozelot. Felis Hamiltoni Fisch. *L'Ocelot Hamilton.*
Vgl. Naturg. Nachtrag. Brasilien.

519. Griffith's Ozelot. Felis Griffithii Fisch. *L'Ocelot Griffith.*
Vgl. Naturg. Nachtrag. Mexico.

520. Der Chibiguazu. Felis Chibiguazu Griff. *Le Chibiguazu.*
Vgl. Naturg. Nachtrag. Südamerika.

521. Lesson's Ozelot. Felis elegans Less. *Le chat. tigre élégant.*
Vgl. Naturg. Nachtrag. Brasilien.

522. Der Kettel-Ozelot. Felis catenata Hamilt. *Sm. L'Ocelot aux chainettes.*
Amerika.

Digitized by Google

523. Die kleinfleckige Katze. Felis celidogaster Temm. *Le chat aux petites taches.*
Vgl. Nachtrag, zugleich F. chalybeata Griff. u. Hermann? Chili.

524. 525. Diard's Katze. Felis Diardi Desmoul. *Chat Diard.*
Männchen und Weibchen. Vgl. Naturg. S. 83 u. Nachtrag. Java.

526. 527. Die javanische Katze, der Kuwuk. Felis javanensis Horsf. *Chat du Java.*
Vgl. Naturgesch. S. 50 und Nachtrag. Java.

528. Der Rimau-butu, die Sumatranische Katze. Felis sumatrana Horsf. *Chat du Soumatra.*
Vgl. Naturgesch. No. 34. junges Thier. S. 72 u. Nachtrag. Sumatra.

529. Die Himalaia-Katze. Felis himalaiana W. Jard. *Chat du Himalaia.*
Vgl. Naturgesch. S. 83 u. Nachtrag. Ostindien, Gegend des Himalaia.

530. Die zierliche Katze. Felis venusta Rchb. *Chat galante.*
Vgl. Naturgesch. Nachtrag. (F. macroura Tem. et Griff. nicht Pr. N. W.) Brasilien?

531. Die winkelfleckige Katze. Felis angulifera Rchb. *Chat aux angles aigues.*
Vgl. Naturgesch. Nachtrag. (F. bengalensis Mus. Edinb.) Bengalen?

532. Der schwarze Puma. Felis nigra Griff. *Chat nigre d'Azara.*
Vgl. Naturgesch. S. 50 u. Nachtrag. Südamerika.

533. 534. Der Jaguarondi. Felis Jaguarundi Az. *Le Jagouarondi.*
Vgl. Naturgesch. No. 23. S. 52 und Nachtrag.

535. Der Eyra. Felis Eyra Desmar. *Chat-Eyra.*
Vgl. Naturgesch. Nachtrag. Paragay, inneres Brasilien.

536—541. Die Karthäuserkatze, Wehkatze. Felis domestica coerulea Bchst. *Le Chat des Chartreux.*
Vgl. Naturgesch. No. 26. Var. 2. S. 55. Nach meinen lebendigen Exemplaren.

542. Die wilde Karthäuserkatze? Felis Catus var. coerulescens. *Le Chat des Chartreux sauvage?*
Vgl. Naturgesch. Nachtrag. Cumberland, Westmoreland, Irland, Schottland.

543. 544. Forster's Capkatze. Felis capensis Forst. *Le chat du Cap de bonne espérance.*
Vgl. Naturgesch. Nachtrag. Vorgebirge der guten Hoffnung.

545. Marderbastardkatze. Felis Foina-domestica. *Chat métis de Fouine.*
Vgl. Naturgesch. S. 56. 12.

546. Die Pampakatze. Felis pajeros Desmar. *Chat-pampa ou Chat pajeros.*
Paraguay.

547—549. Die angorische Katze. Felis Manul angorensis. *Chat d'Angora.*
Vgl. Naturgesch. S. 56 u. 71. Im Orient als Hausthier.

Digitized by Google

Siebenzehntes Heft.

550. Die Servaline. Felis ornata Gray. *Chat Servaline.*
Vgl. Naturgesch. S. 83 und Nachtrag. Indien.

551. Der Canadische Luchs. Felis canadensis G. St. Hil. *Le Lynx du Canada.*
Vgl. Naturgesch. S. 83 u. Nachtrag. Im höchsten Norden von Amerika u. Asien.

552. Der Hirschluchs. Felis cervaria Temm. *Le Lynx-cervier.*
Vgl. Naturgesch. S. 73 u. Nachtrag. Norden von Europa, Asien und Amerika.

553. 554. Der Caracal. Felis Caracal Güldenst. *Le Caracal.*
Vgl. Naturgesch. S. 77. No. 41. u. S. 83. — 554 das bengalische Thier.

555. Der Molossus der Alten. Canis Molossus antiquorum. *Le Molosse des anciens.*
Nach dem großen Gypsabgusse des Mengsischen Museums in Dresden.
Vgl. Naturgesch. S. 150 und 164.

556. Der Haushund der Alten. Canis domesticus antiquorum. *Le chien berger des anciens.*
Nach einer schönen Mosaik „CAVE CANEM" welche sich in der Casa Omerica fand.
Vgl. Naturgesch. S. 134 und 138.

557. Der Lyciscus oder Wolfshund der Alten. Canis Lyciscus antiquorum. *Le chien-loup des anciens.*
Nach einem Pompejanischen Gemälde. Vgl. Naturgesch. S. 134. 136 und 119.

558. 559. Der Alopecides oder Fuchshund der Alten. Canis alopecides antiquorum. *Le chien-renard des anciens.*
Nach einem Pompejanischen Gemälde. Vgl. Naturgesch. S. 145.

560. Der Jagdhund der Alten. Canis venatorius antiquorum. *Le chien de chasse des anciens.*
Nach einem Pompejanischen Gemälde. Vgl. Naturgesch. S. 134. 166—179.

561. Der Pudel der Alten. Canis aquaticus antiquorum. *Le chien barbet des anciens.*
Nach einem Pompejan. Gemälde. Vgl. Naturgesch. S. 134.

562. Der Dingo, zu N. 110.
Vgl. Naturgesch. S. 147. N. 110.

563. Der Dhole. Canis Dhole s. aequinoctialis. *Le chien Dhole.*
Vgl. Naturgesch. S. 146. Indien.

564. Der Canadische Hund. Canis canadensis. *Le chien du Canada.*
Vgl. Naturgesch. S. 146. Canada.

565—568. Der antarktische oder Malouinenhund. Canis antarcticus Penn. *Le chien antarctique.*
Vgl. Naturgesch. S. 147. Malouinen.

569. 570. Der Spartaner, Dianahund. Canis spartanus s. laconicus Aristot. *Le chien du Sparta.*
Vgl. Naturgesch. S. 145. Von Griechenland aus verbreitet.

571. 572. Der Schäferhund von Algier. Canis domesticus var. Algeriensis. *Le chien berger algerien.*
Vgl. Naturgesch. S. 133 und 138. Algier. Nordafrika.

Digitized by Google

573—575. Der Otaheiter Hund. Canis otahitensis.
Vgl. Naturgesch. S. 141. Otaheite.

576. 577. Der Salzburger Alpenhund. Canis salisburgensis.
Vgl. Naturgesch. S. 150. Salzburger und benachbarte Alpen.

Achtzehntes Heft.

578—580. Der Allko. Canis Allco.
Vgl. Naturgesch. S. 139. Südamerika.

581. Der Alikante Hund. Canis alicantensis.
Vgl. Naturgesch. S. 162. Zuchtvarietät von Alikante.

582. Der Itzcuinteporzotli oder Buckelhund. Canis gibbosus.
Vgl. Naturgesch. S. 154. Mexico.

583. Der Retter oder Ritter. Canis solicapus.
Vgl. Naturgesch. S. 159. Zuchtvarietät.

584—588. Der türkische Windhund zu No. 161.
Vgl. Naturgesch. S. 156. Türkei.

589—591. Der ächte Otterhund. Canis platyurus Rchb.
Vgl. Naturgesch. S. 134 und 166. Auf den kleinen Antillen.

592. 593. Die Steinbrakke. Canis bracca minor.
Vgl. Naturgesch. S. 174.

594. 595. Die bengal. oder ragusanische Brakke. Canis bracca bengalensis s. ragusanus.
Vgl. Naturgesch. S. 172.

596. Der zottige oder Wasserhühnerhund. Canis avicularius aquatilis.
Vgl. Naturgesch. S. 171.

597—599. Der französische Parforcehund. Canis gallicus.
Vgl. Naturgesch. S. 173.

600. Das weißrückige Stinkthier. Mephitis leuconota Lichtst. *La Mouffette à dos blanc.*
Vgl. Nachtrag. Am Rio Alvarado in Mexico.

601. Das halbweiße Stinkthier. Mephitis mesoleuca Lichtst. *La Mouffette demi-blanche.*
Vgl. Nachtrag. Chiko in Mexico.

602. Der Chinga. Mephitis Chinga Tiedem. *La Mouffette Chinga.*
Vgl. Nachtrag. An den Küsten Südamerikas.

603. Das halbschwarze Stinkthier. Mephitis mesoleuca. *La Mouffette demi-noire.*
Vgl. Nachtrag. Louisiana.

604. 605. Das langgeschwänzte Stinkthier. Mephitis macroura Lichtst. *La Mouffette à queue longue.*
Vgl. Nachtrag. Gebirge nordwestlich von Mexico aus.

606. 607. Das schleierstreifige Stinkthier. Mephitis vittata Lichtst. *La Mouffette à bandes.*
Vgl. Nachtrag. San Matteo al Mar an der Südwestküste von Mexico.

Digitized by Google

608. Der Yagouaré. Mephitis suffocans Illig. *Le Yagouaré.*
Vgl. Nachtrag. Braſilien.

609. Die canadiſche Fiſchotter. Lutra canadensis Fr. Cuv.
Vgl. Naturgeſch. No. 353. 354. Canada.

610. Die Meer-Fiſchotter. Lutra Lutris Fr. Cuv. *La Loutre du Kamtschatka.*
Vgl. No. 357. Kamtſchatka und Nordam. Inſeln.

611. Der braune Wieſeldachs. Melogale fusca G. St. Hil. *Melogale brune.*
Vgl. Nachtrag. Pegu.

612. 613. Der graue Ohrenrobbe. Otaria cinerea Peron et Lesueur. *Otaire cendré.*
Vgl. nach 367. An der Küſte der Inſel Decrès, zwiſchen 36° ſüdl. Breite und 135° öſtl. Länge.

614. Der auſtraliſche Ohrenrobbe. Otaria australis Quoyet Gaimard. *Otaire australe.*
Vgl. nach 367. Südküſte von Neuholland.

615. Choris's Robbe. Phoca Chorisii Lesson. *Phoque de Choris.*
Vgl. nach 394. Küſten von Kamtſchatka.

616. Der Simir, bunte Hyänenhund. Lycaon pictus (Brook.) Ehrnb. *Le Simir, Chien hyénoide.*
Vgl. No. 250 und 251.

617. Der Dib oder Sib. Canis lupaster H. et E. *Le Chacal Dib.*
Vgl. No. 94.

618. Wolfs-Haushund. Canis lupino-domesticus.
Vgl. Beſchreibung des Hundes.

619—25. Wolfs-Fleiſcherhund. Canis lupino-laniarius.
Vgl. Beſchreibung des Hundes. 619 Männchen und 620 Weibchen der erſten Generation. 621 Männchen und 622 Weibchen der zweiten. 623 Weibchen der dritten. 624 Männchen und 625 Weibchen der vierten.

626. Der wilde Kleinbeutler. Cryptoprocta ferox Bennet. *Le Cryptoprocte feroce.*
Madagaskar.

627. Das goldgelbe Rollſchwanzthier. Paradoxurus aureus Fr. Cuv. *Le Pougouné doré.*
Vaterland unbekannt.

628. Der Linſang Viverra Linsang Hardw. *La Cirette grêle.*
Java. Blambangam.

629. Der numidiſche Ichneumon. Herpestes numidicus Fr. Cuv. *La Mangouste d'Alger.*
Numidien.

630. Steadmans Hundsfrett. Cynictis Steadmani Ogilby. *Le Cynicte de Steadman.*
Caffernland, an der Grenze von Uitenhagen.

Digitized by Google

631. Der weißöhrige Marder. Mustela leucotis Temm. et Hamilt. *Le marte aux oreilles blancs.*

Vaterland unbekannt.

632. Der maskirte Vielfraß. Gulo larvatus Temm. et Hamilt. *Le Glouton à masque.*

Vaterland unbekannt.

633. Der roſtbraune Vielfraß. Gulo ferrugineus Hamilt. Sm. *Le Glouton ferrugineux.*

Vaterland unbekannt.

Nachträglich zu bemerken iſt, daß:


46. Der Rüppelſche Luchs. Felis Rueppelii Brandt. *Chat Ruppel.*

Naturgeſch. S. 81. unter dieſem richtigeren Namen beſchrieben worden iſt.

276. Die ſchwarzgeſchwänzte Genette. Viverra melanura Rchb. *Genette à queue noire Fr. Cuv.*

iſt ſpäter in den Act. Leopold. Carolin. XVII. II. von Otto für *Viverra hermaphrodita Pall.* gehalten und unter dem Namen Platyschista Pallasii aufgeführt; doch iſt daſelbſt die nächſte Verwandtſchaft mit Paradoxurus, welche ich andeutete, nicht berückſichtigt worden.

Digitized by Google





Digitized by Google

Digitized by Google





3.




4

Digitized by Google









Digitized by Google

Digitized by Google



8.




9.



11


Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google




Digitized by Google

Digitized by Google




21.




22.

23.




24.

Digitized by Google



Digitized by Google


Digitized by Google




Digitized by Google


Digitized by Google












Digitized by Google


Digitized by Google











Digitized by Google

Digitized by Google











Digitized by Google

Digitized by Google







Digitized by Google

Digitized by Google









Digitized by Google

Digitized by Google










Digitized by Google

Digitized by Google










Digitized by Google


Digitized by Google





Digitized by Google

Digitized by Google



110 111.



112. 113



114. 115. 116.

Digitized by Google

Digitized by Google



119. 118. 117.



120. 121.



122.



123.



124.

Digitized by Google

Digitized by Google



125 - 129.



130.




131.





132. 133

Digitized by Google

Digitized by Google







Digitized by Google

Digitized by Google







Digitized by Google

Digitized by Google



151 152 153.



154.




155



158 157. 156.

Digitized by Google

Digitized by Google






Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google


Digitized by Google






Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google




Digitized by Google

Digitized by Google



196.



198. 197.



199. 200. 201. 202.

Digitized by Google

Digitized by Google



204. 205. 206 207. 208.



209. 210.

212. Gedruckt v. C. Schurr. 213.

214.


Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google



225. 226.



227.

229. 228.



230. 232. 231.

Digitized by Google


Digitized by Google





Digitized by Google

Digitized by Google



242. 43. (119 ℔)



244. (133 ℔)

245. (150 ℔)



246. (166. ℔)




247. (144 ℔)

248. 49. (144 ℔).

Digitized by Google

Digitized by Google



250 – 251 252





253. 254.




255 256 257

Digitized by Google










Digitized by Google

Digitized by Google










Digitized by Google

Digitized by Google









Digitized by Google

Digitized by Google






294 – 295.




Digitized by Google

Digitized by Google




Digitized by Google

Digitized by Google



321






Digitized by Google

Digitized by Google











Digitized by Google


Digitized by Google



354.



353.




351.

352.

350.


Digitized by Google






Digitized by Google


Digitized by Google






Digitized by Google


Digitized by Google






Digitized by Google


Digitized by Google


386.
387.
388.
388.



389.
390.
391.
392.



Digitized by Google



394.



395.



396.




397. 398. 399-400-401.

Digitized by Google

Digitized by Google


402.
403.
404.


405.
406.



Digitized by Google







Digitized by Google

Digitized by Google



416.



418.



417



419.

420.



421.

422.


Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google


Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google





448



449

Digitized by Google

Digitized by Google



452 453



454 455



456



458



457


Digitized by Google



159



160



161

62




161


163

Digitized by Google

Digitized by Google










Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google


Digitized by Google



492



493




494



495



496



497

498

499


Digitized by Google

Digitized by Google













Digitized by Google

Digitized by Google




Digitized by Google

Digitized by Google










Digitized by Google

Digitized by Google


513.



514



515.

516.

Digitized by Google

Digitized by Google







Digitized by Google

Digitized by Google











Digitized by Google

Digitized by Google








Digitized by Google


Digitized by Google




Digitized by Google

Digitized by Google










Digitized by Google

Digitized by Google



Hunde der Antiken

Tab. 17ª


Digitized by Google














Digitized by Google

Digitized by Google



571

572



573

574–575




576

577

Digitized by Google



578 — 580



582




584 — 588

Digitized by Google

Digitized by Google











Digitized by Google

Digitized by Google




Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google








Digitized by Google

Digitized by Google


626.


627.


628.


629.


630.


631.


632.


633.

Tab. 33.

Digitized by Google

Digitized by Google